



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE** – CAT. D.

**13/04/2022**

**PROVA SCRITTA C**

**TIPO TEST 3**

### 1. Cosa si intende per Audit di Eventi Significativi

- a riesame sistematico e dettagliato di casi singoli nei quali si è verificato un evento significativo, per stabilire quanto si può apprendere sulla qualità generale dei servizi erogati e per indicare i cambiamenti volti a miglioramenti futuri
- b metodo di analisi quantitativo che prevede una misura delle performance a livello aziendale
- c segnalazione spontanea e volontaria di eventi significativi per la sicurezza dei pazienti da parte degli operatori sanitari che può essere utilizzata come una delle fonti per mappare e analizzare i rischi all'interno della struttura sanitaria

### 2. La codeina è

- a un oppioide "debole"
- b un oppioide "forte"
- c un farmaco adiuvante

### 3. Quale fra queste scale può essere utilizzata per la valutazione del dolore in un bambino

- a scala di CHEOPS
- b scala VAS
- b scala NIPS

### 4. La prevalenza è una misura di frequenza utilizzata in epidemiologia e

- a si riferisce ai nuovi casi
- b prende in considerazione i casi esistenti
- c considera i casi di guarigione per una determinata malattia

### 5. Lo stile di vita rientra tra

- a indicatori dei fattori di rischio
- b indicatori dello stato di salute
- c indicatori di copertura da parte dei Servizi Sanitari

### 6. A quale tipologia di obbligo è ascrivibile il segreto professionale

- a deontologico e morale
- b giuridico e deontologico
- c giuridico e morale

### 7. Se durante una trasfusione di emazie il Paziente manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore, è necessario

- a diminuire la velocità di trasfusione e rivalutare la situazione dopo 10 – 15 minuti
- b sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e informare il medico
- c sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica e informare il medico

### 8. Il difetto del setto interventricolare è una anomala comunicazione tra

- a atrio sinistro – ventricolo sinistro
- b atrio destro – ventricolo destro
- c ventricolo sinistro – ventricolo destro



**9. Quale strumento garantisce il maggior livello di personalizzazione dell'assistenza infermieristica**

- a piano di assistenza infermieristica
- b protocollo
- c PDTA

**10. Il termine nicturia**

- a descrive un incremento della produzione notturna di urine con aumento della frequenza della minzione nelle ore di sonno
- b indica genericamente la difficoltà della minzione che può originare da fenomeni irritativi della mucosa urinaria
- c descrive la minzione dolorosa che spesso arresta l'atto mintorio

**11. Un restringimento dell'orifizio prepuziale è detto**

- a peniena
- b fimosi
- c prostatite

**12. Cosa si intende per fistola**

- a una comunicazione patologica solo tra due organi cavi
- b una comunicazione patologica tra due strutture o cavità dell'organismo o tra esse e l'esterno
- c una soluzione di continuo della cute e della membrana mucosa

**13. Il supporto dell'Evidence Based Nursing nella pratica clinica quotidiana**

- a favorisce l'accREDITAMENTO professionale
- b determina i migliori risultati assistenziali in campo infermieristico
- c differenzia l'assistenza infermieristica da quella delle altre figure professionali

**14. Indicare la Teorica dell'Assistenza Infermieristica che parla del concetto di "Self Care"**

- a Virginia Henderson
- b Nancy Roper
- c Dorothea Orem

**15. Identificare la descrizione corretta di ulcera da pressione non stadiabile**

- a ulcera aperta con un letto della ferita rosso/rosa senza tessuti devitalizzati
- b ulcera aperta con grasso sottocutaneo visibile, il tessuto devitalizzato non oscura la profondità della perdita di tessuto
- c perdita di tessuto a spessore totale in cui la base è coperta da tessuto devitalizzato e/o escara nel letto della ferita