



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA  
DI 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**

**OSTETRICA – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

**PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA  
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA E  
DELL'AZIENDA USL DI IMOLA**

**29/02/2024**

**PROVA PRATICA C**

PR S/ R/ S/

1. Quali tra le classi di Robson identificano donne con minor rischio di distocia al parto?
  - a. **La prima e la terza**
  - b. La seconda e la quinta
  - c. L'ottava e la decima
  
2. Secondo la Linea Guida Istituto Superiore di Sanità dell'Emorragia post partum (EPP) 2016, quali azioni fanno parte del monitoraggio nella valutazione dell'EPP
  - a. Stima della perdita ematica, valutazione e registrazione parametri vitali, mantenimento termico della paziente, predisposizione di due accessi venosi di grosso calibro, prelievo ematico (gruppo sanguigno e prova di compatibilità, emocromo, coagulazione, elettroliti funzionalità epatica e renale, emogas), tamponamento con balloon intrauterino
  - b. **Stima della perdita ematica, valutazione stato di coscienza, valutazione delle vie aeree e della frequenza respiratoria, valutazione e registrazione parametri vitali, mantenimento termico della paziente, predisposizione di due accessi venosi di grosso calibro, prelievo ematico (gruppo sanguigno e prova di compatibilità, emocromo, coagulazione, elettroliti funzionalità epatica e renale, emogas), richiesta sangue**
  - c. Stima della perdita ematica, valutazione stato di coscienza, valutazione delle vie aeree e della frequenza respiratoria, valutazione e registrazione parametri vitali, mantenimento termico della paziente, prelievo ematico (gruppo sanguigno e prova di compatibilità, emocromo, coagulazione, elettroliti funzionalità epatica e renale, emogas), somministrazione uterotonici di I e II linea.
  
3. Quando si esegue lo screening dell'infezione da streptococco beta-emolitico gruppo B con tampone vagino-rettale in gravidanza?
  - a. 32-34 settimane
  - b. **36-37 settimane**
  - c. 30- 32 settimane
  
4. Secondo le linee guida SIEOG 2021, è raccomandata la valutazione tramite ecografia office della falda massima nella gravidanza post-termine?
  - a. No, è raccomandata la valutazione tramite ecografia office dell'AmnioticFluid Index (AFI)
  - b. **Si, è raccomandata**
  - c. L'ecografia office non prevede la valutazione della Falda Massima
  
5. Secondo le Raccomandazioni sulla Cardiotocografia Antepartum di ottobre 2021, quali farmaci interferiscono nella lettura del Non Stress Test:
  - a. Corticosteroidi, solfato di magnesio
  - b. Nifedipina somministrata per via sublinguale
  - c. **Tutte le precedenti**

ER Gh An BB

6. Quali sono i reperi anatomici del diametro trasverso dello stretto inferiore?
  - a. **Le due tuberosità ischiatiche**
  - b. Le due spine degli ischi
  - c. L'articolazione sacro iliaca e l'imminenza ileo-pettinea
  
7. Secondo le Linee Guida dell' American Heart Association il target di Saturazione O<sub>2</sub> preduztale nel neonato a 10 minuti di vita è:
  - a. **85% -95%**
  - b. 90% - 95%
  - c. 80% - 90%
  
8. Il trattamento medico chirurgico dell'Emorragia Post Partum (EPP) prevede, secondo la Linea Guida dell'Istituto Superiore di Sanità 2016:
  - a. Osservazione della paziente e registrazione parametri vitali, svuotamento vescicale, somministrazione di uterotonici di I e II linea, tamponamento con balloon intrauterino, considerare solo procedure e/o interventi chirurgici conservativi
  - b. Correzione di eventuale difetto coagulativo, somministrazione di uterotonici di I e II linea tamponamento con balloon intrauterino, considerare isterectomia senza ricorrere a uno o più procedure e/o interventi conservativi
  - c. **Svuotamento vescicale, somministrazione di uterotonici di I e II linea, correzione di eventuale difetto coagulativo, eventuale trasferimento della paziente in sala operatoria, tamponamento con balloon intrauterino, considerare procedure e/o interventi chirurgici conservativi, considerare isterectomia senza ricorrere a uno o più procedure e/o interventi conservativi o dopo loro fallimento**
  
9. L'UNICEF e l'OMS hanno redatto un decalogo di misure che ogni struttura sanitaria deve dimostrare di rispettare prima di poter essere riconosciuta «Ospedale Amico dei Bambini», quali fra queste è prevista ?
  - a. Mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la nascita per almeno un'ora e incoraggiare le madri a comprendere quando il neonato è pronto per poppare, offrendo aiuto se necessario
  - b. Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre ( rooming-in ), in modo che trascorrono insieme ventiquattr'ore su ventiquattro durante la permanenza in ospedale
  - c. **Tutte le precedenti**
  
10. Secondo le Raccomandazioni sulla Cardiotocografia Antepartum di ottobre 2021, l'esecuzione del Tracciato Cardiotocografico in gravidanze senza fattori di rischio è indicata:
  - a. Dalla 41° settimana compiuta con valutazione del profilo biofisico
  - b. **2 volte a settimana al compimento della 42° settimana**
  - c. **Tutte le precedenti**