SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N) 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

INFERMIERE

AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

12/10/2026

PROVA SCRITTA B

1. Durante l'accesso in PS di un paziente politraumatizzato, si osserva gorgoglio respiratorio con sangue nel cavo orale e SpO_2 88%) Qual è la priorità assistenziale?
   A) Valutare la scala Glasgow
   B) Posizionare accesso venoso periferico
   C) Garantire la pervietà delle vie aeree

2. Quale dei seguenti parametri rappresenta un indicatore di ipoperfusione tissutale nella sepsi?
   A) INR
   B) Lattato sierico
   C) Emoglobina

3. Un paziente presenta: PA 80/45 mmHg, FC 130 bpm, cute fredda e sudata,oliguria. Quale tipo di shock è più probabile?
   A) Neurogeno
   B) Cardiogeno
   C) Ipovolemico

4. Quale alterazione ECG è tipica di un infarto miocardico STEMI?
   A) Onde U prominenti
   B) Sopraslivellamento ST
   C) PR allungato

5. Una fibrillazione atriale è caratterizzata da:
   A) Ritmo regolare e onde P presenti
   B) Assenza di attività elettrica
   C) Ritmo irregolarmente irregolare e assenza di onde P

6. Un'emogasanalisi mostra: pH 7,30, $PaCO_2$ 60 mmHg, PaO_2 55 mmHg Il quadro indica:
   A) Alcalosi respiratoria
   B) Acidosi metabolica
   C) Acidosi respiratoria

7. In un paziente con BPCO riacutizzata, la saturazione target raccomandata è:
   A) 100%
   B) 98-100%
   C) 88-92%

8. Un paziente diabetico riceve accidentalmente una dose doppia di insulina rapida. Quale complicanza deve essere monitorata prioritariamente?
   A) Ipernatremia
   B) Ipoglicemia

C) Ipertermia

9. Durante terapia con eparina sodica continua quale parametro deve essere monitorato?
   A) INR
   B) PT
   C) aPTT

10. Dopo somministrazione di morfina EV un paziente presenta: FR 7/min, sonnolenza marcata, miosi. Quale farmaco antagonista deve essere disponibile?
    A) Vitamina K
    B) Protamina
    C) Naloxone

11. Quale affermazione sul potassio endovena è corretta?
    A) Può essere somministrato in bolo EV rapido.
    B) Non richiede monitoraggio
    C) Deve essere infuso diluito e controllato

12. Quale delle seguenti rappresenta una diagnosi infermieristica NANDA?
    A) Polmonite lobare
    B) Infarto miocardico
    C) Scambio gassoso compromesso

13. Nel linguaggio NNN il NOC identifica:
    A) Diagnosi infermieristiche
    B) Procedure tecniche
    C) Risultati assistenziali attesi

14. Quale tra le seguenti rappresenta un intervento NIC?
    A) Integrità cutanea conservata
    B) Mobilità migliorata
    C) Prevenzione delle cadute

15. Un paziente anziano, allettato, incontinente e malnutrito deve essere valutato con:
    A) Glasgow
    B) Braden
    C) Barthel

16. Paziente: Apertura occhi al dolore = 2, Risposta verbale incomprensibile = 2, Risposta motoria localizza il dolore = 5 Qual è il punteggio GCS?
    A) 7

B) 8
C) 9

17. La scala CAM è principalmente utilizzata per:
    A) Rischio lesioni da pressione
    B) Delirium
    C) Dolore

18. Secondo Henderson l'obiettivo dell'assistenza infermieristica è:
    A) Curare la malattia
    B) Favorire l'indipendenza della persona
    C) Ridurre i costi sanitari

19. Un paziente appena sottoposto a intervento chirurgico è totalmente dipendente dagli operatori. Secondo Orem il sistema assistenziale applicato è:
    A) Educativo-supportivo
    B) Adattativo
    C) Totalmente compensatorio

20. Paziente di 72 anni ricoverato per polmonite: FR 34/min, SpO_2 86%, PA 85/50 mmHg, lattati 5 mmol/L, GCS 13. Quale problema deve essere riconosciuto prioritariamente dall'infermiere?
    A) Rischio di lesioni da pressione
    B) Deficit di autocura
    C) Shock settico con insufficienza respiratoria

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

INFERMIERE

AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

12/10/2026

PROVA SCRITTA C

1. Quale tra i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI) è indispensabile indossare per primo durante le precauzioni standard, prima di qualsiasi contatto con il paziente?

A) I guanti sterili
B) Il camice monouso
C) I guanti puliti (non sterili)

2. Quale dei seguenti parametri NON fa parte della valutazione dell'indice di Apgar nel neonato?

A) Frequenza cardiaca
B) Pressione arteriosa
C) Tono muscolare

3. Qual è il valore normale indicativo della saturazione di ossigeno (SpO_2) in un adulto sano che respira aria ambiente?

A) 70-80%
B) 80-89%
C) 95-100%

4. Un paziente apre gli occhi spontaneamente, è orientato nelle risposte ed esegue i comandi motori. Qual è il suo punteggio totale alla Glasgow Coma Scale (GCS)?

A) 10
B) 15
C) 5

5. L'utilizzo dei guanti puliti durante l'assistenza al paziente:

A) Sostituisce completamente la necessità di eseguire l'igiene delle mani.
B) Non sostituisce l'igiene delle mani, che deve essere comunque effettuata nei momenti appropriati.
C) È obbligatorio solo se si eseguono manovre chirurgiche.

6. La posizione di Fowler (o semi-Fowler) prevede che il paziente si trovi con:

A) Il tronco sollevato rispetto agli arti inferiori di circa 45°-60°
B) Il corpo completamente disteso in posizione prona
C) Gli arti inferiori sollevati sopra il livello della testa

7. In un adulto a riposo, si definisce "tachicardia" una frequenza cardiaca:

A) Inferiore a 60 battiti al minuto
B) Superiore a 100 battiti al minuto
C) Compresa tra 70 e 80 battiti al minuto

8. Durante la misurazione della pressione arteriosa, quale condizione provoca una sovrastima (valori falsamente più alti) dei valori pressori?

A) L'utilizzo di un bracciale troppo piccolo rispetto alla circonferenza del braccio
B) L'utilizzo di un bracciale troppo grande rispetto alla circonferenza del braccio
C) Il corretto posizionamento del braccio all'altezza del cuore

9. Nel linguaggio infermieristico e medico, con il termine "diuresi" si intende:

A) La quantità totale di liquidi assunti per via orale o endovenosa
B) La produzione e l'eliminazione di urina da parte dei reni
C) La frequenza giornaliera delle evacuazioni intestinali

10. Durante l'esecuzione di un prelievo per emocoltura, quale delle seguenti azioni NON è corretta?

A) Eseguire l'igiene delle mani prima della procedura
B) Disinfettare accuratamente la cute del sito di venipuntura
C) Palpare nuovamente il sito di venipuntura dopo l'antisepsi senza indossare nuovi guanti sterili o adottare precauzioni di asepsi

11. Quale tra i seguenti interventi è fondamentale per la prevenzione delle lesioni da pressione in un paziente allettato a ridotta mobilità?

A) Massaggiare energicamente e ripetutamente le prominenze ossee arrossate
B) Eseguire regolarmente i cambi posturali programmati in base alle condizioni cliniche
C) Utilizzare sistematicamente cuscini a ciambella sotto la regione sacrale

12. La posizione laterale di sicurezza (PLS) è indicata principalmente per una persona:

A) Incosciente, che respira normalmente e non presenta sospetto trauma
B) In arresto cardiaco in attesa del defibrillatore
C) Cosciente che avverte un forte dolore toracico

13. Durante una trasfusione di sangue, se il paziente accusa improvvisamente brividi, febbre o dispnea, l'infermiere deve:

A) Aumentare subito la velocità di infusione per terminare prima
B) Interrompere immediatamente la trasfusione e avvisare il medico
C) Attendere 10 minuti per verificare se i sintomi passano da soli

14. Un paziente presenta un valore di potassio ematico molto basso (ipokaliemia) e durante un'infusione endovenosa di potassio lamenta bruciore locale e palpitazioni. L'azione prioritaria è:

A) Interrompere temporaneamente l'infusione, valutare il paziente e avvisare tempestivamente il medico
B) Continuare l'infusione prescritta senza variazioni e informare il medico a fine turno
C) Rimuovere l'accesso venoso e riprendere immediatamente la stessa infusione sullo stesso braccio

15. Nel linguaggio sanitario, il termine "oliguria" indica nell'adulto:

A) Una ridotta produzione di urina (inferiore ai normali volumi giornalieri)
B) Un aumento della frequenza respiratoria
C) Un'eccessiva salivazione

16. In un paziente adulto con sospetto arresto cardiaco, dopo aver constatato l'assenza di respiro normale, la prima cosa da fare è:

A) Somministrare immediatamente acqua da bere per favorire la ripresa
B) Attivare i soccorsi sanitari e iniziare subito la rianimazione cardiopolmonare (RCP)
C) Posizionare il paziente seduto e attendere l'arrivo dei parenti

17. Un paziente con diabete in terapia insulinica accusa improvvisa sudorazione fredda, tremori e confusione (segni di ipoglicemia). Se è cosciente e collaborante, l'intervento immediato consiste nel:

A) Somministrare carboidrati a rapido assorbimento per via orale
B) Somministrare una dose doppia di insulina per abbassare la glicemia
C) Attendere che i sintomi scompaiano spontaneamente senza intervenire

18. Un paziente portatore di catetere venoso centrale (CVC) avverte improvvisa dispnea e dolore toracico durante un'infusione. L'infermiere rileva tachicardia e calo della saturazione (sospetta embolia gassosa). La condotta corretta è:

A) Rallentare la velocità della pompa di infusione e rivalutare dopo 15 minuti
B) Interrompere subito l'infusione, clampare il catetere e attivare il team di emergenza
C) Aspirare energicamente dal CVC per rimuovere l'aria e riprendere l'infusione

19. Qual è la principale finalità dell'igiene delle mani in ambito assistenziale?

A) Rendere la pelle completamente sterile per tutta la giornata lavorativa
B) Ridurre la trasmissione crociata di microrganismi e prevenire le infezioni correlate all'assistenza (ICA)
C) Sostituire l'uso dei guanti in qualsiasi manovra infermieristica

20. Prima di somministrare una terapia farmacologica prescritta, quale controllo preliminare fondamentale deve eseguire l'infermiere (regola delle "giuste" somministrazioni)?

A) Verificare l'identità del paziente utilizzando almeno due identificativi (es. nome, cognome e data di nascita)
B) Chiedere esclusivamente al familiare quale farmaco desidera assumere il paziente
C) Controllare solo la data di scadenza del farmaco nel cassetto dei medicinali