



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**

**INFERMIERE
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

12/10/2026

PROVA PRATICA C

1

2

3

4

5



1. Paziente con SNG in nutrizione continua. Prima della somministrazione della nutrizione è necessario:
 - A. Valutare il corretto posizionamento del sondino
 - B. Misurare la temperatura corporea
 - C. Aspirare sempre 100 ml di contenuto gastrico
2. Un paziente in Ventimask deve mantenere il FiO_2 previsto. Che cosa non deve essere fatto?
 - A. Mantenere libero il dispositivo
 - B. Ostruire le finestre laterali
 - C. Controllare il flusso prescritto
3. Durante una medicazione si osserva una lesione con perdita di tessuto a tutto spessore. A quale stadio appartiene?
 - A. Stadio I
 - B. Stadio II
 - C. Stadio III
4. Durante una trasfusione il paziente sviluppa: brividi, dispnea, tachicardia. Quale azione deve essere eseguita immediatamente?
 - A. Ridurre il flusso
 - B. Terminare la sacca
 - C. Sospendere la trasfusione
5. Un drenaggio Redon produce improvvisamente 250 ml di sangue rosso vivo in 30 minuti. Quale comportamento adottare?
 - A. Svuotare il contenitore
 - B. Rivalutare nella successiva rilevazione
 - C. Segnalare immediatamente il dato
6. Prima della somministrazione di insulina rapida è obbligatorio verificare:
 - A. Temperatura corporea
 - B. Pressione arteriosa
 - C. Glicemia
7. Paziente portatore di PEG. Quale manovra è corretta per prevenire l'occlusione?
 - A. Irrigare la sonda con acqua secondo protocollo
 - B. Utilizzare bevande gassate
 - C. Aspirare quotidianamente il contenuto gastrico



8. Paziente emiplegico da trasferire letto-carrozzina. Quale principio ergonomico è corretto?
- A. Sollevare il paziente utilizzando la forza della schiena
 - B. Mantenere il baricentro vicino al paziente**
 - C. Ruotare il tronco durante il sollevamento
9. Durante un'emogasanalisi arteriosa è fondamentale:
- A. Agitare vigorosamente la siringa
 - B. Eliminare eventuali bolle d'aria**
 - C. Conservare il campione a temperatura ambiente per diverse ore
10. Paziente ricoverato con ictus ischemico: disfagia accertata, tosse dopo assunzione di acqua, GCS 14. Quale intervento assistenziale è prioritario?
- A. Incentivare l'assunzione di liquidi
 - B. Somministrare alimentazione normale
 - C. Applicare precauzioni per rischio di aspirazione**