

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.**

24/02/2026

PROVA SCRITTA

B

TIPO TEST 1

PROVA ESTRATTA

1. Con l'entrata in vigore della L.42/99, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" è stata:
 - A. sostituita con "professione sanitaria"
 - B. limitata solo all'ambito ospedaliero
 - C. mantenuta per gli infermieri pediatrici
2. Il Codice Deontologico dell'Infermiere è:
 - A. un decreto ministeriale che definisce il campo di attività dell'infermiere
 - B. l'insieme di norme, principi etici e valori che guidano la condotta e la responsabilità professionale dell'infermiere
 - C. una legge dello Stato che disciplina le professioni sanitarie
3. Come può essere definito un evento sentinella
 - A. un danno grave o morte di un paziente, potenzialmente evitabile
 - B. un evento imprevisto che, per un caso fortuito, non ha portato danno al paziente
 - C. nessuna delle precedenti
4. La Linea Guida è:
 - A. la descrizione del percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale dell'assistito
 - B. un insieme di raccomandazioni e indirizzi strategici basati su evidenze scientifiche per supportare ed orientare l'agire dei professionisti
 - C. il regolamento organizzativo aziendale
5. Il TSO è:
 - A. l'acronimo di terapia sostitutiva ormonale
 - B. il trattamento sanitario obbligatorio introdotto dalla Legge n. 180 del 1978
 - C. il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
6. Quale scala di misurazione può essere utilizzata per il monitoraggio del dolore
 - A. scala BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening)
 - B. scala NRS (Numeric Rating Scale)
 - C. scala GCS (Glasgow Coma Score)
7. Il Glasgow Coma Scale (GCS) prende in esame i seguenti elementi:
 - A. apertura occhi, analisi della memoria, deficit di lato
 - B. apertura occhi, risposte verbali, risposte motorie
 - C. risposte verbali, deficit di lato
8. Per anuria si intende:
 - A. la presenza di sangue nelle urine
 - B. la mancata produzione di urina (inferiore 100ml/24 h)
 - C. la produzione di urina superiore a 500 ml/24 h

9. Con il termine melena si indica:
- A. l'emissione di feci con sangue di colore rosso vivo
 - B. l'emissione di feci picee
 - C. l'emissione di feci acoliche
10. Per _____ si intende la respirazione fisiologica, normale, tranquilla:
- A. Eupnea
 - B. Apnea
 - C. Dispnea
11. L'intervento di quadrantectomia è indicato per:
- A. tumore alla mammella
 - B. emorragia cerebrale
 - C. tumore renale
12. Il dolore anginoso è tipicamente localizzato in sede:
- A. fossa iliaca sinistra
 - B. emitoracica destra
 - C. retrosternale
13. Quale di questi è l'effetto terapeutico dei farmaci analgesici
- A. Riduzione del dolore
 - B. Ipertensione
 - C. Ipossiemia
14. La disinfezione è un processo:
- A. chimico o fisico atto a ridurre la carica di microrganismi patogeni su superfici, oggetti o ambienti inanimati a livello di sicurezza
 - B. di eliminazione di tutti i microrganismi e delle loro spore da oggetti e sostanze varie
 - C. entrambe le precedenti
15. Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito può determinare:
- A. alterazione elettrolitica
 - B. edemi declivi
 - C. ipertensione

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.**

24/02/2026

PROVA SCRITTA

B

TIPO TEST 2

PROVA ESTRATA

11.

1. La Linea Guida è:
 - A. la descrizione del percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale dell'assistito
 - B. un insieme di raccomandazioni e indirizzi strategici basati su evidenze scientifiche per supportare ed orientare l'agire dei professionisti
 - C. il regolamento organizzativo aziendale
2. La disinfezione è un processo:
 - A. chimico o fisico atto a ridurre la carica di microrganismi patogeni su superfici, oggetti o ambienti inanimati a livello di sicurezza
 - B. di eliminazione di tutti i microrganismi e delle loro spore da oggetti e sostanze varie
 - C. entrambe le precedenti
3. Con l'entrata in vigore della L.42/99, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" è stata:
 - A. sostituita con "professione sanitaria"
 - B. limitata solo all'ambito ospedaliero
 - C. mantenuta per gli infermieri pediatrici
4. Il Codice Deontologico dell'Infermiere è:
 - A. un decreto ministeriale che definisce il campo di attività dell'infermiere
 - B. l'insieme di norme, principi etici e valori che guidano la condotta e la responsabilità professionale dell'infermiere
 - C. una legge dello Stato che disciplina le professioni sanitarie
5. Come può essere definito un evento sentinella
 - A. un danno grave o morte di un paziente, potenzialmente evitabile
 - B. un evento imprevisto che, per un caso fortuito, non ha portato danno al paziente
 - C. nessuna delle precedenti
6. Il TSO è:
 - A. l'acronimo di terapia sostitutiva ormonale
 - B. il trattamento sanitario obbligatorio introdotto dalla Legge n. 180 del 1978
 - C. il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
7. L'intervento di quadrantectomia è indicato per:
 - A. tumore alla mammella
 - B. emorragia cerebrale
 - C. tumore renale
8. Quale scala di misurazione può essere utilizzata per il monitoraggio del dolore
 - A. scala BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening)
 - B. scala NRS (Numeric Rating Scale)
 - C. scala GCS (Glasgow Coma Score)

9. Il Glasgow Coma Scale (GCS) prende in esame i seguenti elementi:
- A. apertura occhi, analisi della memoria, deficit di lato
 - B. apertura occhi, risposte verbali, risposte motorie
 - C. risposte verbali, deficit di lato
10. Con il termine melena si indica:
- A. l'emissione di feci con sangue di colore rosso vivo
 - B. l'emissione di feci picee
 - C. l'emissione di feci acoliche
11. Quale di questi è l'effetto terapeutico dei farmaci analgesici
- A. Riduzione del dolore
 - B. Ipertensione
 - C. Ipossiemia
12. Per _____ si intende la respirazione fisiologica, normale, tranquilla:
- A. Eupnea
 - B. Apnea
 - C. Dispnea
13. Il dolore anginoso è tipicamente localizzato in sede:
- A. fossa iliaca sinistra
 - B. emitoracica destra
 - C. retrosternale
14. Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito può determinare:
- A. alterazione elettrolitica
 - B. edemi declivi
 - C. ipertensione
15. Per anuria si intende:
- A. la presenza di sangue nelle urine
 - B. la mancata produzione di urina (inferiore 100ml/24 h)
 - C. la produzione di urina superiore a 500 ml/24 h

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.**

24/02/2026

PROVA SCRITTA

B

TIPO TEST 3

PROVA ESTRATTA

1/10

1. Il Glasgow Coma Scale (GCS) prende in esame i seguenti elementi:
 - A. apertura occhi, analisi della memoria, deficit di lato
 - B. apertura occhi, risposte verbali, risposte motorie
 - C. risposte verbali, deficit di lato
2. Il TSO è:
 - A. l'acronimo di terapia sostitutiva ormonale
 - B. il trattamento sanitario obbligatorio introdotto dalla Legge n. 180 del 1978
 - C. il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
3. Il dolore anginoso è tipicamente localizzato in sede:
 - A. fossa iliaca sinistra
 - B. emitoracica destra
 - C. retrosternale
4. La Linea Guida è:
 - A. la descrizione del percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale dell'assistito
 - B. un insieme di raccomandazioni e indirizzi strategici basati su evidenze scientifiche per supportare ed orientare l'agire dei professionisti
 - C. il regolamento organizzativo aziendale
5. Con l'entrata in vigore della L.42/99, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" è stata:
 - A. sostituita con "professione sanitaria"
 - B. limitata solo all'ambito ospedaliero
 - C. mantenuta per gli infermieri pediatrici
6. La disinfezione è un processo:
 - A. chimico o fisico atto a ridurre la carica di microrganismi patogeni su superfici, oggetti o ambienti inanimati a livello di sicurezza
 - B. di eliminazione di tutti i microrganismi e delle loro spore da oggetti e sostanze varie
 - C. entrambe le precedenti
7. Il Codice Deontologico dell'Infermiere è:
 - A. un decreto ministeriale che definisce il campo di attività dell'infermiere
 - B. l'insieme di norme, principi etici e valori che guidano la condotta e la responsabilità professionale dell'infermiere
 - C. una legge dello Stato che disciplina le professioni sanitarie
8. Con il termine melena si indica:
 - A. l'emissione di feci con sangue di colore rosso vivo
 - B. l'emissione di feci picee
 - C. l'emissione di feci acoliche

PROVA ESTRATTA

9. Come può essere definito un evento sentinella
- A. un danno grave o morte di un paziente, potenzialmente evitabile
 - B. un evento imprevisto che, per un caso fortuito, non ha portato danno al paziente
 - C. nessuna delle precedenti
10. L'intervento di quadrantectomia è indicato per:
- A. tumore alla mammella
 - B. emorragia cerebrale
 - C. tumore renale
11. Per anuria si intende:
- A. la presenza di sangue nelle urine
 - B. la mancata produzione di urina (inferiore 100ml/24 h)
 - C. la produzione di urina superiore a 500 ml/24 h
12. Quale scala di misurazione può essere utilizzata per il monitoraggio del dolore
- A. scala BRASS (Blaiklock Risk Assessment Screening)
 - B. scala NRS (Numeric Rating Scale)
 - C. scala GCS (Glasgow Coma Score)
13. Quale di questi è l'effetto terapeutico dei farmaci analgesici
- A. Riduzione del dolore
 - B. Ipertensione
 - C. Ipossiemia
14. Per _____ si intende la respirazione fisiologica, normale, tranquilla:
- A. Eupnea
 - B. Apnea
 - C. Dispnea
15. Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito può determinare:
- A. alterazione elettrolitica
 - B. edemi declivi
 - C. ipertensione

PROVA ESTRATTA

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.**

24/02/2026

PROVA PRATICA

C

TIPO TEST 1

PROVA SORTEGGIATA

1. Per effettuare un prelievo di sangue da un catetere venoso centrale occorre:
 - A. interrompere le infusioni in corso e disinfettare il dispositivo medico
 - B. scartare circa 5 ml di sangue per evitare emodiluizione
 - C. entrambe le precedenti
2. Qual è l'obiettivo del BLS (Basic Life Support)
 - A. sostenere le funzioni vitali (respirazione e circolazione) di una vittima in ACR
 - B. prevenire danni anossici cerebrali fino all'arrivo dei soccorsi avanzati
 - C. entrambe le precedenti
3. I segni e sintomi tipici dell'ipoglicemia sono:
 - A. amnesia, poliuria e tachicardia
 - B. sudorazione fredda, amnesia e stato confusionale
 - C. febbre, dispnea e cianosi
4. Quali possono essere i segni e sintomi del paziente con disidratazione
 - A. secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria
 - B. bradicardia, ipotensione, poliuria
 - C. edemi declivi, dispnea
5. La vestizione chirurgica si conclude con:
 - A. il posizionamento della cuffia
 - B. il posizionamento della maschera chirurgica
 - C. la calzatura dei guanti sterili
6. Il debridement o sbrigliamento della ferita consiste:
 - A. nella rimozione di materiale necrotico, escara, tessuti devitalizzati
 - B. nel fissaggio dei due lembi della ferita senza l'applicazione dei punti di sutura
 - C. nella disinfezione della cute tramite Acqua Ossigenata al 3%
7. Quale posizione deve assumere un paziente con edema polmonare acuto:
 - A. supino
 - B. posizione laterale di sicurezza
 - C. seduto o semiseduto, possibilmente con le gambe fuori dal letto
8. Cosa comprendono le 'precauzioni standard' per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza
 - A. igiene delle mani e utilizzo dei DPI
 - B. isolamento funzionale
 - C. utilizzo di mascherina FFP2 o FFP3
9. L'igiene della colostomia deve essere effettuata:
 - A. con soluzione disinfettante non a base alcolica
 - B. con soluzione a base di iodopovidone
 - C. con acqua tiepida e sapone neutro

PROVA SOTTILEGGIATA



10. L'utilizzo del defibrillatore DAE è indicato in presenza di:

- A. fibrillazione ventricolare
- B. tachicardia atriale
- C. asistolia

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.**

24/02/2026

PROVA PRATICA

C

TIPO TEST 2

PROVA SOTTESGATA

1. L'igiene della colostomia deve essere effettuata:
 - A. con soluzione disinfettante non a base alcolica
 - B. con soluzione a base di iodopovidone
 - C. con acqua tiepida e sapone neutro
2. Quale posizione deve assumere un paziente con edema polmonare acuto:
 - A. supino
 - B. posizione laterale di sicurezza
 - C. seduto o semiseduto, possibilmente con le gambe fuori dal letto
3. Qual è l'obiettivo del BLS (Basic Life Support)
 - A. sostenere le funzioni vitali (respirazione e circolazione) di una vittima in ACR
 - B. prevenire danni anossici cerebrali fino all'arrivo dei soccorsi avanzati
 - C. entrambe le precedenti
4. I segni e sintomi tipici dell'ipoglicemia sono:
 - A. amnesia, poliuria e tachicardia
 - B. sudorazione fredda, amnesia e stato confusionale
 - C. febbre, dispnea e cianosi
5. Quali possono essere i segni e sintomi del paziente con disidratazione
 - A. secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria
 - B. bradicardia, ipotensione, poliuria
 - C. edemi declivi, dispnea
6. L'utilizzo del defibrillatore DAE è indicato in presenza di:
 - A. fibrillazione ventricolare
 - B. tachicardia atriale
 - C. asistolia
7. La vestizione chirurgica si conclude con:
 - A. il posizionamento della cuffia
 - B. il posizionamento della maschera chirurgica
 - C. la calzatura dei guanti sterili
8. Per effettuare un prelievo di sangue da un catetere venoso centrale occorre:
 - A. interrompere le infusioni in corso e disinfettare il dispositivo medico
 - B. scartare circa 5 ml di sangue per evitare emodiluizione
 - C. entrambe le precedenti
9. Il debridement o sbrigliamento della ferita consiste:
 - A. nella rimozione di materiale necrotico, escara, tessuti devitalizzati
 - B. nel fissaggio dei due lembi della ferita senza l'applicazione dei punti di sutura
 - C. nella disinfezione della cute tramite Acqua Ossigenata al 3%

10. Cosa comprendono le 'precauzioni standard' per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza

- A. igiene delle mani e utilizzo dei DPI
- B. isolamento funzionale
- C. utilizzo di mascherina FFP2 o FFP3

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.**

24/02/2026

PROVA PRATICA

C

TIPO TEST 3

PROVA SOSTEGGIATA

1. I segni e sintomi tipici dell'ipoglicemia sono:
 - A. amnesia, poliuria e tachicardia
 - B. sudorazione fredda, amnesia e stato confusionale
 - C. febbre, dispnea e cianosi
2. L'igiene della colostomia deve essere effettuata:
 - A. con soluzione disinfettante non a base alcolica
 - B. con soluzione a base di iodopovidone
 - C. con acqua tiepida e sapone neutro
3. L'utilizzo del defibrillatore DAE è indicato in presenza di:
 - A. fibrillazione ventricolare
 - B. tachicardia atriale
 - C. asistolia
4. Quale posizione deve assumere un paziente con edema polmonare acuto:
 - A. supino
 - B. posizione laterale di sicurezza
 - C. seduto o semiseduto, possibilmente con le gambe fuori dal letto
5. Per effettuare un prelievo di sangue da un catetere venoso centrale occorre:
 - A. interrompere le infusioni in corso e disinfettare il dispositivo medico
 - B. scartare circa 5 ml di sangue per evitare emodiluizione
 - C. entrambe le precedenti
6. Qual è l'obiettivo del BLS (Basic Life Support)
 - A. sostenere le funzioni vitali (respirazione e circolazione) di una vittima in ACR
 - B. prevenire danni anossici cerebrali fino all'arrivo dei soccorsi avanzati
 - C. entrambe le precedenti
7. Quali possono essere i segni e sintomi del paziente con disidratazione
 - A. secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria
 - B. bradicardia, ipotensione, poliuria
 - C. edemi declivi, dispnea
8. La vestizione chirurgica si conclude con:
 - A. il posizionamento della cuffia
 - B. il posizionamento della maschera chirurgica
 - C. la calzatura dei guanti sterili
9. Il debridement o sbrigliamento della ferita consiste:
 - A. nella rimozione di materiale necrotico, escara, tessuti devitalizzati
 - B. nel fissaggio dei due lembi della ferita senza l'applicazione dei punti di sutura
 - C. nella disinfezione della cute tramite Acqua Ossigenata al 3%

10. Cosa comprendono le 'precauzioni standard' per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza

- A. igiene delle mani e utilizzo dei DPI
- B. isolamento funzionale
- C. utilizzo di mascherina FFP2 o FFP3