



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

25/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 1

AB  

- 1 **Nella scheda di terapia viene prescritto un farmaco somministrabile sia per via intramuscolare sia per via endovenosa ma non viene indicata la via di somministrazione. L'infermiere deve:**
 - a procedere con la somministrazione
 - b chiedere al medico di completare la prescrizione terapeutica
 - c procedere con la somministrazione solo se autorizzato dal coordinatore
- 2 **Sono indicati i guanti sterili:**
 - a in qualsiasi procedura chirurgica, parto vaginale, procedure radiologiche invasive, posizionamento di accessi vascolari centrali e gestione delle linee infusive; preparazione di NPT e di agenti chemioterapici
 - b in situazioni assistenziali in cui si può venire a contatto con sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni e oggetti visibilmente sporchi di liquidi biologici
 - c nella manipolazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, nella decontaminazione dei dispositivi chirurgici, nella gestione delle enterostomie
- 3 **Ad un paziente è stata confezionata una colostomia da due giorni. Nel corso dell'ispezione quotidiana si rilevano: mucosa lucida, umida, di colore rosso/rosa. La mucosa è a livello del piano addominale. Si può affermare che:**
 - a la colostomia è retratta
 - b la colostomia è da considerarsi nella norma
 - c la colostomia è ischemica
- 4 **L'infermiere trova a terra, vicino all'unità di degenza, un paziente apparentemente privo di coscienza:**
 - a si attiva chiedendo aiuto al personale sanitario presente
 - b valuta prontamente le condizioni del paziente evitando di spostarlo, richiede aiuto al personale presente nell'unità di cura per gli interventi di assistenza necessari
 - c reperisce il carrello delle urgenze e successivamente si attiva nella richiesta di aiuto al personale presente
- 5 **I farmaci campione possono essere detenuti:**
 - a dal medico ma non possono essere conservati nell'armadio dei farmaci di reparto
 - b dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
 - c dall'infermiere nell'armadio dei farmaci di reparto come i farmaci approvvigionati dalla farmacia ospedaliera
- 6 **In caso di presenza di prodotti farmaceutici scaduti:**
 - a è sufficiente consegnarli al Coordinatore Assistenziale dell'UO
 - b è sufficiente smaltirli nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo dopo averlo comunicato al Coordinatore Assistenziale
 - c è necessario raccogliergli tempestivamente, racchiuderli in un contenitore con la dicitura "farmaci scaduti", inviarli per lo smaltimento secondo le procedure previste

AB



- 7 La prominza posteriore del tallone sostiene una intensa pressione anche quando viene utilizzata una superficie di redistribuzione della pressione. L'attenzione dell'infermiere nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni del tallone è rivolta a:**
- a utilizzare dispositivi che elevino e scarichino completamente il tallone in modo da redistribuire il peso della gamba lungo il polpaccio ed ispezionare la cute quotidianamente
 - b posizionare un sacchetto di sabbia a livello del tendine d'Achille
 - c controllare settimanalmente la cute ed eseguire massaggi con alcool saponato
- 8 In ambito pediatrico l'intensità del dolore può essere misurata solo con la mediazione dei genitori:**
- a falso
 - b vero
 - c vero, solo se il paziente è in età scolare
- 9 Da cosa può essere causata la Sindrome Compartimentale nell'avambraccio:**
- a dalla somministrazione congiunta di antinfiammatori e miorilassanti
 - b dalla diminuzione del tono muscolare, con conseguente diminuzione della circonferenza dell'avambraccio
 - c da apparecchi gessati confezionati troppo stretti o, comunque, divenuti stretti a causa dell'edema
- 10 In riferimento ai principi generali di asepsi, indicare l'affermazione NON corretta:**
- a se vi è dubbio sulla sterilità di un oggetto o superficie questi vanno considerati non sterili
 - b per gli interventi chirurgici sporchi e sporchi contaminati non è necessario mantenere i principi di asepsi
 - c dopo l'apertura della confezione sterile i bordi della confezione sono considerati non sterili

AB





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

25/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 2

AB

1 Sono indicati i guanti sterili:

- a in qualsiasi procedura chirurgica, parto vaginale, procedure radiologiche invasive, posizionamento di accessi vascolari centrali e gestione delle linee infusive; preparazione di NPT e di agenti chemioterapici
- b in situazioni assistenziali in cui si può venire a contatto con sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni e oggetti visibilmente sporchi di liquidi biologici
- c nella manipolazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, nella decontaminazione dei dispositivi chirurgici, nella gestione delle enterostomie

2 Nella scheda di terapia viene prescritto un farmaco somministrabile sia per via intramuscolare sia per via endovenosa ma non viene indicata la via di somministrazione. L'infermiere deve:

- a procedere con la somministrazione
- b chiedere al medico di completare la prescrizione terapeutica
- c procedere con la somministrazione solo se autorizzato dal coordinatore

3 L'infermiere trova a terra, vicino all'unità di degenza, un paziente apparentemente privo di coscienza:

- a si attiva chiedendo aiuto al personale sanitario presente
- b valuta prontamente le condizioni del paziente evitando di spostarlo, richiede aiuto al personale presente nell'unità di cura per gli interventi di assistenza necessari
- c reperisce il carrello delle urgenze e successivamente si attiva nella richiesta di aiuto al personale presente

4 In riferimento ai principi generali di asepsi, indicare l'affermazione NON corretta:

- a se vi è dubbio sulla sterilità di un oggetto o superficie questi vanno considerati non sterili
- b per gli interventi chirurgici sporchi e sporchi contaminati non è necessario mantenere i principi di asepsi
- c dopo l'apertura della confezione sterile i bordi della confezione sono considerati non sterili

5 I farmaci campione possono essere detenuti:

- a dal medico ma non possono essere conservati nell'armadio dei farmaci di reparto
- b dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- c dall'infermiere nell'armadio dei farmaci di reparto come i farmaci approvvigionati dalla farmacia ospedaliera

6 In caso di presenza di prodotti farmaceutici scaduti:

- a è sufficiente consegnarli al Coordinatore Assistenziale dell'UO
- b è sufficiente smaltirli nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo dopo averlo comunicato al Coordinatore Assistenziale
- c è necessario raccogliergli tempestivamente, racchiuderli in un contenitore con la dicitura "farmaci scaduti", inviarli per lo smaltimento secondo le procedure previste

AB

- 7 Da cosa può essere causata la Sindrome Compartimentale nell'avambraccio:**
- a dalla somministrazione congiunta di antinfiammatori e miorilassanti
 - b dalla diminuzione del tono muscolare, con conseguente diminuzione della circonferenza dell'avambraccio
 - c da apparecchi gessati confezionati troppo stretti o, comunque, divenuti stretti a causa dell'edema
- 8 Ad un paziente è stata confezionata una colostomia da due giorni. Nel corso dell'ispezione quotidiana si rilevano: mucosa lucida, umida, di colore rosso/rosa. La mucosa è a livello del piano addominale. Si può affermare che:**
- a la colostomia è retratta
 - b la colostomia è da considerarsi nella norma
 - c la colostomia è ischemica
- 9 La prominenza posteriore del tallone sostiene una intensa pressione anche quando viene utilizzata una superficie di redistribuzione della pressione. L'attenzione dell'infermiere nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni del tallone è rivolta a:**
- a utilizzare dispositivi che elevino e scarichino completamente il tallone in modo da redistribuire il peso della gamba lungo il polpaccio ed ispezionare la cute quotidianamente
 - b posizionare un sacchetto di sabbia a livello del tendine d'Achille
 - c controllare settimanalmente la cute ed eseguire massaggi con alcool saponato
- 10 In ambito pediatrico l'intensità del dolore può essere misurata solo con la mediazione dei genitori:**
- a falso
 - b vero
 - c vero, solo se il paziente è in età scolare

AB  

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

25/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 3

AB 


1 Sono indicati i guanti sterili:

- a in qualsiasi procedura chirurgica, parto vaginale, procedure radiologiche invasive, posizionamento di accessi vascolari centrali e gestione delle linee infusive; preparazione di NPT e di agenti chemioterapici
- b in situazioni assistenziali in cui si può venire a contatto con sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni e oggetti visibilmente sporchi di liquidi biologici
- c nella manipolazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, nella decontaminazione dei dispositivi chirurgici, nella gestione delle enterostomie

2 L'infermiere trova a terra, vicino all'unità di degenza, un paziente apparentemente privo di coscienza:

- a si attiva chiedendo aiuto al personale sanitario presente
- b valuta prontamente le condizioni del paziente evitando di spostarlo, richiede aiuto al personale presente nell'unità di cura per gli interventi di assistenza necessari
- c reperisce il carrello delle urgenze e successivamente si attiva nella richiesta di aiuto al personale presente

3 Da cosa può essere causata la Sindrome Compartimentale nell'avambraccio:

- a dalla somministrazione congiunta di antinfiammatori e miorilassanti
- b dalla diminuzione del tono muscolare, con conseguente diminuzione della circonferenza dell'avambraccio
- c da apparecchi gessati confezionati troppo stretti o, comunque, divenuti stretti a causa dell'edema

4 Nella scheda di terapia viene prescritto un farmaco somministrabile sia per via intramuscolare sia per via endovenosa ma non viene indicata la via di somministrazione. L'infermiere deve:

- a procedere con la somministrazione
- b chiedere al medico di completare la prescrizione terapeutica
- c procedere con la somministrazione solo se autorizzato dal coordinatore

5 I farmaci campione possono essere detenuti:

- a dal medico ma non possono essere conservati nell'armadio dei farmaci di reparto
- b dal medico ma non sono somministrabili dall'infermiere
- c dall'infermiere nell'armadio dei farmaci di reparto come i farmaci approvvigionati dalla farmacia ospedaliera

6 In riferimento ai principi generali di asepsi, indicare l'affermazione NON corretta:

- a se vi è dubbio sulla sterilità di un oggetto o superficie questi vanno considerati non sterili
- b per gli interventi chirurgici sporchi e sporchi contaminati non è necessario mantenere i principi di asepsi
- c dopo l'apertura della confezione sterile i bordi della confezione sono considerati non sterili

AB



- 7 In caso di presenza di prodotti farmaceutici scaduti:**
- a è sufficiente consegnarli al Coordinatore Assistenziale dell'UO
 - b è sufficiente smaltirli nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo dopo averlo comunicato al Coordinatore Assistenziale
 - c **è necessario raccogliarli tempestivamente, racchiuderli in un contenitore con la dicitura "farmaci scaduti", inviarli per lo smaltimento secondo le procedure previste**
- 8 La prominza posteriore del tallone sostiene una intensa pressione anche quando viene utilizzata una superficie di redistribuzione della pressione. L'attenzione dell'infermiere nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni del tallone è rivolta a:**
- a **utilizzare dispositivi che elevino e scarichino completamente il tallone in modo da redistribuire il peso della gamba lungo il polpaccio ed ispezionare la cute quotidianamente**
 - b posizionare un sacchetto di sabbia a livello del tendine d'Achille
 - c controllare settimanalmente la cute ed eseguire massaggi con alcool saponato
- 9 In ambito pediatrico l'intensità del dolore può essere misurata solo con la mediazione dei genitori:**
- a **falso**
 - b vero
 - c vero, solo se il paziente è in età scolare
- 10 Ad un paziente è stata confezionata una colostomia da due giorni. Nel corso dell'ispezione quotidiana si rilevano: mucosa lucida, umida, di colore rosso/rosa. La mucosa è a livello del piano addominale. Si può affermare che:**
- a la colostomia è retratta
 - b **la colostomia è da considerarsi nella norma**
 - c la colostomia è ischemica

AB

MG

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

25/09/2020

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 1

AB MB

- 1 Nella scheda di terapia viene prescritto un farmaco somministrabile sia per via intramuscolare sia per via endovenosa ma non viene indicata la via di somministrazione. L'infermiere deve:**
 - a procedere con la somministrazione
 - b chiedere al medico di completare la prescrizione terapeutica**
 - c procedere con la somministrazione solo se autorizzato dal coordinatore

- 2 Sono indicati i guanti sterili:**
 - a in qualsiasi procedura chirurgica, parto vaginale, procedure radiologiche invasive, posizionamento di accessi vascolari centrali e gestione delle linee infusive; preparazione di NPT e di agenti chemioterapici**
 - b in situazioni assistenziali in cui si può venire a contatto con sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni e oggetti visibilmente sporchi di liquidi biologici
 - c nella manipolazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, nella decontaminazione dei dispositivi chirurgici, nella gestione delle enterostomie

- 3 Ad un paziente è stata confezionata una colostomia da due giorni. Nel corso dell'ispezione quotidiana si rilevano: mucosa lucida, umida, di colore rosso/rosa. La mucosa è a livello del piano addominale. Si può affermare che:**
 - a la colostomia è retratta
 - b la colostomia è da considerarsi nella norma**
 - c la colostomia è ischemica

- 4 L'infermiere trova a terra, vicino all'unità di degenza, un paziente apparentemente privo di coscienza:**
 - a si attiva chiedendo aiuto al personale sanitario presente
 - b valuta prontamente le condizioni del paziente evitando di spostarlo, richiede aiuto al personale presente nell'unità di cura per gli interventi di assistenza necessari**
 - c reperisce il carrello delle urgenze e successivamente si attiva nella richiesta di aiuto al personale presente

- 5 Nel processo assistenziale la raccolta dati ha la principale finalità di:**
 - a conoscere il paziente e il suo stato d'animo
 - b completare l'anamnesi effettuata dal medico
 - c ottenere dati in riferimento al modello concettuale adottato, per pianificare l'assistenza infermieristica**

- 6 Quale posizione assume un paziente durante l'introduzione di un sondino nasogastrico:**
 - a semiseduta/seduta**
 - b seduta con la testa inclinata in avanti
 - c supina

AB MB

- 7 Quali sono le indicazioni per effettuare l'igiene degli occhi, nel paziente incosciente, in assenza di prescrizione medica:**
- a applicare lacrime artificiali o soluzione fisiologica e benda oculare per ridurre il rischio di ulcerazione corneale
 - b applicare una pomata antibiotica e utilizzo di benda oculare
 - c utilizzare colliri al cortisone e benda oculare
- 8 Gli indicatori di compromissione neurologica e vascolare sono:**
- a parestesie, circolazione e forza
 - b motilità, sensibilità e circolo
 - c atonia, circolazione e fascicolazione
- 9 In una Unità Operativa devono essere ricoverati due pazienti affetti da Morbillo. Nell'assegnazione dei posti letto che tipo di accorgimento è necessario prevedere:**
- a non è necessario seguire particolari accorgimenti
 - b i due pazienti devono essere ricoverati in camera singola o nella stessa stanza, avendo cura di non ricoverarvi altri pazienti
 - c i due pazienti possono essere ricoverati con altri pazienti non infetti, purché venga mantenuta la distanza spaziale di almeno un metro tra un letto e l'altro
- 10 Quale delle seguenti categorie di pazienti non può essere sottoposta a RMN:**
- a pazienti con diatesi emorragica
 - b pazienti con pregresso infarto del miocardio
 - c pazienti portatori di pacemaker

AB





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

25/09/2020

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 2

SA
AB MB

- 1 Ad un paziente è stata confezionata una colostomia da due giorni. Nel corso dell'ispezione quotidiana si rilevano: mucosa lucida, umida, di colore rosso/rosa. La mucosa è a livello del piano addominale. Si può affermare che:**
 - a la colostomia è retratta
 - b la colostomia è da considerarsi nella norma**
 - c la colostomia è ischemica

- 2 Quale posizione assume un paziente durante l'introduzione di un sondino nasogastrico:**
 - a semiseduta/seduta**
 - b seduta con la testa inclinata in avanti
 - c supina

- 3 L'infermiere trova a terra, vicino all'unità di degenza, un paziente apparentemente privo di coscienza:**
 - a si attiva chiedendo aiuto al personale sanitario presente
 - b valuta prontamente le condizioni del paziente evitando di spostarlo, richiede aiuto al personale presente nell'unità di cura per gli interventi di assistenza necessari**
 - c reperisce il carrello delle urgenze e successivamente si attiva nella richiesta di aiuto al personale presente

- 4 Gli indicatori di compromissione neurologica e vascolare sono:**
 - a parestesie, circolazione e forza
 - b motilità, sensibilità e circolo**
 - c atonia, circolazione e fascicolazione

- 5 Nel processo assistenziale la raccolta dati ha la principale finalità di:**
 - a conoscere il paziente e il suo stato d'animo
 - b completare l'anamnesi effettuata dal medico
 - c ottenere dati in riferimento al modello concettuale adottato, per pianificare l'assistenza infermieristica**

- 6 Sono indicati i guanti sterili:**
 - a in qualsiasi procedura chirurgica, parto vaginale, procedure radiologiche invasive, posizionamento di accessi vascolari centrali e gestione delle linee infusive; preparazione di NPT e di agenti chemioterapici**
 - b in situazioni assistenziali in cui si può venire a contatto con sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni e oggetti visibilmente sporchi di liquidi biologici
 - c nella manipolazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, nella decontaminazione dei dispositivi chirurgici, nella gestione delle enterostomie

AB



- 7 Quali sono le indicazioni per effettuare l'igiene degli occhi, nel paziente incosciente, in assenza di prescrizione medica:**
- a applicare lacrime artificiali o soluzione fisiologica e benda oculare per ridurre il rischio di ulcerazione corneale
 - b applicare una pomata antibiotica e utilizzo di benda oculare
 - c utilizzare colliri al cortisone e benda oculare
- 8 Quale delle seguenti categorie di pazienti non può essere sottoposta a RMN:**
- a pazienti con diatesi emorragica
 - b pazienti con pregresso infarto del miocardio
 - c pazienti portatori di pacemaker
- 9 Nella scheda di terapia viene prescritto un farmaco somministrabile sia per via intramuscolare sia per via endovenosa ma non viene indicata la via di somministrazione. L'infermiere deve:**
- a procedere con la somministrazione
 - b chiedere al medico di completare la prescrizione terapeutica
 - c procedere con la somministrazione solo se autorizzato dal coordinatore
- 10 In una Unità Operativa devono essere ricoverati due pazienti affetti da Morbillo. Nell'assegnazione dei posti letto che tipo di accorgimento è necessario prevedere:**
- a non è necessario seguire particolari accorgimenti
 - b i due pazienti devono essere ricoverati in camera singola o nella stessa stanza, avendo cura di non ricoverarvi altri pazienti
 - c i due pazienti possono essere ricoverati con altri pazienti non infetti, purché venga mantenuta la distanza spaziale di almeno un metro tra un letto e l'altro

AB MF



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

25/09/2020

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 3

AB MB

- 1 **Ad un paziente è stata confezionata una colostomia da due giorni. Nel corso dell'ispezione quotidiana si rilevano: mucosa lucida, umida, di colore rosso/rosa. La mucosa è a livello del piano addominale. Si può affermare che:**
 - a la colostomia è retratta
 - b la colostomia è da considerarsi nella norma
 - c la colostomia è ischemica
- 2 **Sono indicati i guanti sterili:**
 - a in qualsiasi procedura chirurgica, parto vaginale, procedure radiologiche invasive, posizionamento di accessi vascolari centrali e gestione delle linee infusive; preparazione di NPT e di agenti chemioterapici
 - b in situazioni assistenziali in cui si può venire a contatto con sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni e oggetti visibilmente sporchi di liquidi biologici
 - c nella manipolazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, nella decontaminazione dei dispositivi chirurgici, nella gestione delle enterostomie
- 3 **Nella scheda di terapia viene prescritto un farmaco somministrabile sia per via intramuscolare sia per via endovenosa ma non viene indicata la via di somministrazione. L'infermiere deve:**
 - a procedere con la somministrazione
 - b chiedere al medico di completare la prescrizione terapeutica
 - c procedere con la somministrazione solo se autorizzato dal coordinatore
- 4 **L'infermiere trova a terra, vicino all'unità di degenza, un paziente apparentemente privo di coscienza:**
 - a si attiva chiedendo aiuto al personale sanitario presente
 - b valuta prontamente le condizioni del paziente evitando di spostarlo, richiede aiuto al personale presente nell'unità di cura per gli interventi di assistenza necessari
 - c reperisce il carrello delle urgenze e successivamente si attiva nella richiesta di aiuto al personale presente
- 5 **Quale posizione assume un paziente durante l'introduzione di un sondino nasogastrico:**
 - a semiseduta/seduta
 - b seduta con la testa inclinata in avanti
 - c supina
- 6 **Nel processo assistenziale la raccolta dati ha la principale finalità di:**
 - a conoscere il paziente e il suo stato d'animo
 - b completare l'anamnesi effettuata dal medico
 - c ottenere dati in riferimento al modello concettuale adottato, per pianificare l'assistenza infermieristica

AB



- 7 Gli indicatori di compromissione neurologica e vascolare sono:**
- a parestesie, circolazione e forza
 - b motilità, sensibilità e circolo**
 - c atonia, circolazione e fascicolazione
- 8 Quali sono le indicazioni per effettuare l'igiene degli occhi, nel paziente incosciente, in assenza di prescrizione medica:**
- a applicare lacrime artificiali o soluzione fisiologica e benda oculare per ridurre il rischio di ulcerazione corneale**
 - b applicare una pomata antibiotica e utilizzo di benda oculare
 - c utilizzare colliri al cortisone e benda oculare
- 9 Quale delle seguenti categorie di pazienti non può essere sottoposta a RMN:**
- a pazienti con diatesi emorragica
 - b pazienti con pregresso infarto del miocardio
 - c pazienti portatori di pacemaker**
- 10 In una Unità Operativa devono essere ricoverati due pazienti affetti da Morbillo. Nell'assegnazione dei posti letto che tipo di accorgimento è necessario prevedere:**
- a non è necessario seguire particolari accorgimenti
 - b i due pazienti devono essere ricoverati in camera singola o nella stessa stanza, avendo cura di non ricoverarvi altri pazienti**
 - c i due pazienti possono essere ricoverati con altri pazienti non infetti, purché venga mantenuta la distanza spaziale di almeno un metro tra un letto e l'altro

AB MB