



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**24/09/2020**

**PROVA PRATICA A**

**TIPO TEST 1**

AB



- 1 La Scala di Braden rappresenta lo strumento per la valutazione:**
  - a del rischio di sviluppare lesioni da decubito
  - b del livello del dolore
  - c del livello di dipendenza nelle attività di vita quotidiane
  
- 2 Perché nell'assistenza ad un paziente con infezione da Clostridium Difficile è previsto il lavaggio delle mani con acqua e sapone:**
  - a perché il lavaggio con sapone e acqua corrente permette di rimuovere meccanicamente le spore dalla superficie delle mani
  - b per evitare l'uso eccessivo di soluzione idroalcolica e l'aumento dei relativi costi
  - c perché il lavaggio delle mani con acqua e sapone è sempre da preferire alla soluzione idroalcolica in tutti i setting e per tutti i pazienti; l'uso della soluzione idroalcolica va limitato alle sole situazioni in cui non è presente un lavandino
  
- 3 Tra i seguenti presidi non invasivi per la somministrazione di ossigenoterapia quale permette di erogare ossigeno ad una percentuale definita:**
  - a maschera di Venturi
  - b cannula nasale
  - c maschera "semplice"
  
- 4 Il trattamento della colostomia può necessitare di una detersione routinaria, è indicato l'utilizzo di:**
  - a disinfettante a base di iodopovidone
  - b acqua e sapone
  - c soluzione disinfettante a base alcolica
  
- 5 La valutazione al fine di identificare le persone a rischio di sviluppare lesioni da pressione deve esser condotta per:**
  - a rassicurare la famiglia sulla buona assistenza
  - b implementare un piano di prevenzione per i pazienti considerati a rischio di sviluppare lesioni da pressione
  - c assicurare una posizione di garanzia ai sanitari in caso di contenzioso
  
- 6 Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla procedura del lavaggio chirurgico delle mani, NON è esatta:**
  - a la procedura prevede il risciacquo iniziale delle mani
  - b il lavaggio comprende gli avambracci
  - c durante il lavaggio possono essere mantenuti anelli e monili
  
- 7 Nella preparazione di prodotti infusionali l'infermiere:**
  - a può evitare di attenersi a rigide regole di asepsi
  - b non deve introdurre farmaci nella stessa siringa o nello stesso flacone ad eccezione delle associazioni indicate dal produttore
  - c può chiedere al personale di supporto di aspirare i farmaci nelle siringhe
  
- 8 L'assistenza alla persona sottoposta a biopsia epatica prevede:**
  - a monitoraggio degli enzimi cardiaci e riposo in posizione prona
  - b digiuno per 48 ore e a seguire posizionamento del sondino naso-gastrico
  - c controllo della zona di incisione, monitoraggio dei parametri vitali e del dolore

AB

- 9 **Attraverso quale dispositivo l'infermiere somministra la NPT (Nutrizione Parenterale Totale):**
- a Sondino Naso Gastrico
  - b Catetere Venoso Periferico o Catetere Venoso Centrale**
  - c Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG)
- 10 **Per raggiungere una evacuazione controllata delle feci in un soggetto portatore di colostomia sigmoidea:**
- a si praticano irrigazioni della stomia per educare l'intestino**
  - b è necessaria l'assunzione di una dieta ricca di lipidi
  - c entrambe le precedenti risposte sono errate

AB





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**24/09/2020**

**PROVA PRATICA A**


**TIPO TEST 2**

AB 

- 1 **Tra i seguenti presidi non invasivi per la somministrazione di ossigenoterapia quale permette di erogare ossigeno ad una percentuale definita:**
  - a **maschera di Venturi**
  - b cannula nasale
  - c maschera "semplice"
- 2 **Il trattamento della colostomia può necessitare di una detersione routinaria, è indicato l'utilizzo di:**
  - a disinfettante a base di iodopovidone
  - b **acqua e sapone**
  - c soluzione disinfettante a base alcolica
- 3 **Nella preparazione di prodotti infusionali l'infermiere:**
  - a può evitare di attenersi a rigide regole di asepsi
  - b **non deve introdurre farmaci nella stessa siringa o nello stesso flacone ad eccezione delle associazioni indicate dal produttore**
  - c può chiedere al personale di supporto di aspirare i farmaci nelle siringhe
- 4 **Per raggiungere una evacuazione controllata delle feci in un soggetto portatore di colostomia sigmoidea:**
  - a **si praticano irrigazioni della stomia per educare l'intestino**
  - b è necessaria l'assunzione di una dieta ricca di lipidi
  - c entrambe le precedenti risposte sono errate
- 5 **La Scala di Braden rappresenta lo strumento per la valutazione:**
  - a **del rischio di sviluppare lesioni da decubito**
  - b del livello del dolore
  - c del livello di dipendenza nelle attività di vita quotidiane
- 6 **Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla procedura del lavaggio chirurgico delle mani, NON è esatta:**
  - a la procedura prevede il risciacquo iniziale delle mani
  - b il lavaggio comprende gli avambracci
  - c **durante il lavaggio possono essere mantenuti anelli e monili**
- 7 **L'assistenza alla persona sottoposta a biopsia epatica prevede:**
  - a monitoraggio degli enzimi cardiaci e riposo in posizione prona
  - b digiuno per 48 ore e a seguire posizionamento del sondino naso-gastrico
  - c **controllo della zona di incisione, monitoraggio dei parametri vitali e del dolore**
- 8 **Perché nell'assistenza ad un paziente con infezione da Clostridium Difficile è previsto il lavaggio delle mani con acqua e sapone:**
  - a **perché il lavaggio con sapone e acqua corrente permette di rimuovere meccanicamente le spore dalla superficie delle mani**
  - b per evitare l'uso eccessivo di soluzione idroalcolica e l'aumento dei relativi costi
  - c perché il lavaggio delle mani con acqua e sapone è sempre da preferire alla soluzione idroalcolica in tutti i setting e per tutti i pazienti; l'uso della soluzione idroalcolica va limitato alle sole situazioni in cui non è presente un lavandino

- 9 **Attraverso quale dispositivo l'infermiere somministra la NPT (Nutrizione Parenterale Totale):**
- a Sondino Naso Gastrico
  - b **Catetere Venoso Periferico o Catetere Venoso Centrale**
  - c Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG)
- 10 **La valutazione al fine di identificare le persone a rischio di sviluppare lesioni da pressione deve esser condotta per:**
- a rassicurare la famiglia sulla buona assistenza
  - b **implementare un piano di prevenzione per i pazienti considerati a rischio di sviluppare lesioni da pressione**
  - c assicurare una posizione di garanzia ai sanitari in caso di contenzioso

AB




CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**24/09/2020**

**PROVA PRATICA A**

**TIPO TEST 3**

AB 

- 1 **Il trattamento della colostomia può necessitare di una detersione routinaria, è indicato l'utilizzo di:**
  - a disinfettante a base di iodopovidone
  - b **acqua e sapone**
  - c soluzione disinfettante a base alcolica
- 2 **L'assistenza alla persona sottoposta a biopsia epatica prevede:**
  - a monitoraggio degli enzimi cardiaci e riposo in posizione prona
  - b digiuno per 48 ore e a seguire posizionamento del sondino naso-gastrico
  - c **controllo della zona di incisione, monitoraggio dei parametri vitali e del dolore**
- 3 **Attraverso quale dispositivo l'infermiere somministra la NPT (Nutrizione Parenterale Totale):**
  - a Sondino Naso Gastrico
  - b **Catetere Venoso Periferico o Catetere Venoso Centrale**
  - c Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG)
- 4 **Perché nell'assistenza ad un paziente con infezione da Clostridium Difficile è previsto il lavaggio delle mani con acqua e sapone:**
  - a **perché il lavaggio con sapone e acqua corrente permette di rimuovere meccanicamente le spore dalla superficie delle mani**
  - b per evitare l'uso eccessivo di soluzione idroalcolica e l'aumento dei relativi costi
  - c perché il lavaggio delle mani con acqua e sapone è sempre da preferire alla soluzione idroalcolica in tutti i setting e per tutti i pazienti; l'uso della soluzione idroalcolica va limitato alle sole situazioni in cui non è presente un lavandino
- 5 **Tra i seguenti presidi non invasivi per la somministrazione di ossigenoterapia quale permette di erogare ossigeno ad una percentuale definita:**
  - a **maschera di Venturi**
  - b cannula nasale
  - c maschera "semplice"
- 6 **La valutazione al fine di identificare le persone a rischio di sviluppare lesioni da pressione deve esser condotta per:**
  - a rassicurare la famiglia sulla buona assistenza
  - b **implementare un piano di prevenzione per i pazienti considerati a rischio di sviluppare lesioni da pressione**
  - c assicurare una posizione di garanzia ai sanitari in caso di contenzioso
- 7 **Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla procedura del lavaggio chirurgico delle mani, NON è esatta:**
  - a la procedura prevede il risciacquo iniziale delle mani
  - b il lavaggio comprende gli avambracci
  - c **durante il lavaggio possono essere mantenuti anelli e monili**
- 8 **La Scala di Braden rappresenta lo strumento per la valutazione:**
  - a **del rischio di sviluppare lesioni da decubito**
  - b del livello del dolore
  - c del livello di dipendenza nelle attività di vita quotidiane

AB




**9 Per raggiungere una evacuazione controllata delle feci in un soggetto portatore di colostomia sigmoidea:**

- a si praticano irrigazioni della stomia per educare l'intestino
- b è necessaria l'assunzione di una dieta ricca di lipidi
- c entrambe le precedenti risposte sono errate

**10 Nella preparazione di prodotti infusionali l'infermiere:**

- a può evitare di attenersi a rigide regole di asepsi
- b non deve introdurre farmaci nella stessa siringa o nello stesso flacone ad eccezione delle associazioni indicate dal produttore
- c può chiedere al personale di supporto di aspirare i farmaci nelle siringhe

AB





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**24/09/2020**

**PROVA PRATICA C**

**TIPO TEST 1**

AB

Handwritten signature and initials, including the letters 'AB' and a stylized signature.

- 1 La Scala di Braden rappresenta lo strumento per la valutazione:**
  - a del rischio di sviluppare lesioni da decubito
  - b del livello del dolore
  - c del livello di dipendenza nelle attività di vita quotidiane
  
- 2 Perché nell'assistenza ad un paziente con infezione da Clostridium Difficile è previsto il lavaggio delle mani con acqua e sapone:**
  - a perché il lavaggio con sapone e acqua corrente permette di rimuovere meccanicamente le spore dalla superficie delle mani
  - b per evitare l'uso eccessivo di soluzione idroalcolica e l'aumento dei relativi costi
  - c perché il lavaggio delle mani con acqua e sapone è sempre da preferire alla soluzione idroalcolica in tutti i setting e per tutti i pazienti; l'uso della soluzione idroalcolica va limitato alle sole situazioni in cui non è presente un lavandino
  
- 3 Tra i seguenti presidi non invasivi per la somministrazione di ossigenoterapia quale permette di erogare ossigeno ad una percentuale definita:**
  - a maschera di Venturi
  - b cannula nasale
  - c maschera "semplice"
  
- 4 Il trattamento della colostomia può necessitare di una detersione routinaria, è indicato l'utilizzo di:**
  - a disinfettante a base di iodopovidone
  - b acqua e sapone
  - c soluzione disinfettante a base alcolica
  
- 5 La cura della cute è importante nella prevenzione delle ulcere da pressione. Nell'agire quotidiano, nell'ottica della prevenzione, l'infermiere NON deve:**
  - a massaggiare energicamente la cute a rischio di lesione
  - b utilizzare presidi che riducano la pressione a ridosso delle prominenze ossee
  - c proteggere la cute dall'eccessiva esposizione all'umidità
  
- 6 Un paziente sottoposto a puntura lombare lamenta cefalea. Quale tra le seguenti azioni è indicata:**
  - a invitare il paziente a deambulare
  - b aumentare l'illuminazione della stanza e posizionare il paziente seduto
  - c posizionare il paziente supino senza cuscini
  
- 7 Attraverso il monitoraggio delle entrate e delle uscite (bilancio idrico) l'infermiere valuta:**
  - a i liquidi introdotti ad esclusione dei liquidi assunti per via orale
  - b i liquidi introdotti (assunti per via orale e parenterale) ed i liquidi eliminati
  - c i liquidi introdotti e i liquidi eliminati ad esclusione del vomito e dei liquidi di drenaggio
  
- 8 Quale tra le seguenti costituisce indicazione assoluta al cateterismo vescicale:**
  - a infezioni delle vie urinarie
  - b anuria
  - c ritenzione urinaria acuta

AB

*[Handwritten signature]*

- 9 Una adeguata cura del piede diabetico comprende:**
- a un frequente utilizzo di antisettici
  - b il controllo delle ipercheratosi e il mantenimento della cute pulita e ben idratata**
  - c l'utilizzo costante di creme
- 10 Quale delle seguenti posizioni deve assumere il paziente per essere sottoposto a toracentesi:**
- a posizione supina con gli arti superiori sollevati
  - b posizione seduta con busto in avanti e braccia appoggiate a un piano**
  - c posizione prona

✓  
AB MB



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**24/09/2020**



**PROVA PRATICA C**

**TIPO TEST 2**

AB

- 1 Perché nell'assistenza ad un paziente con infezione da Clostridium Difficile è previsto il lavaggio delle mani con acqua e sapone:**
  - a perché il lavaggio con sapone e acqua corrente permette di rimuovere meccanicamente le spore dalla superficie delle mani
  - b per evitare l'uso eccessivo di soluzione idroalcolica e l'aumento dei relativi costi
  - c perché il lavaggio delle mani con acqua e sapone è sempre da preferire alla soluzione idroalcolica in tutti i setting e per tutti i pazienti; l'uso della soluzione idroalcolica va limitato alle sole situazioni in cui non è presente un lavandino
  
- 2 Tra i seguenti presidi non invasivi per la somministrazione di ossigenoterapia quale permette di erogare ossigeno ad una percentuale definita:**
  - a maschera di Venturi
  - b cannula nasale
  - c maschera "semplice"
  
- 3 La Scala di Braden rappresenta lo strumento per la valutazione:**
  - a del rischio di sviluppare lesioni da decubito
  - b del livello del dolore
  - c del livello di dipendenza nelle attività di vita quotidiane
  
- 4 Attraverso il monitoraggio delle entrate e delle uscite (bilancio idrico) l'infermiere valuta:**
  - a i liquidi introdotti ad esclusione dei liquidi assunti per via orale
  - b i liquidi introdotti (assunti per via orale e parenterale) ed i liquidi eliminati
  - c i liquidi introdotti e i liquidi eliminati ad esclusione del vomito e dei liquidi di drenaggio
  
- 5 Il trattamento della colostomia può necessitare di una detersione routinaria, è indicato l'utilizzo di:**
  - a disinfettante a base di iodopovidone
  - b acqua e sapone
  - c soluzione disinfettante a base alcolica
  
- 6 Un paziente sottoposto a puntura lombare lamenta cefalea. Quale tra le seguenti azioni è indicata:**
  - a invitare il paziente a deambulare
  - b aumentare l'illuminazione della stanza e posizionare il paziente seduto
  - c posizionare il paziente supino senza cuscini
  
- 7 Quale tra le seguenti costituisce indicazione assoluta al cateterismo vescicale:**
  - a infezioni delle vie urinarie
  - b anuria
  - c ritenzione urinaria acuta

AB



- 8 **La cura della cute è importante nella prevenzione delle ulcere da pressione. Nell'agire quotidiano, nell'ottica della prevenzione, l'infermiere NON deve:**
- a **massaggiare energicamente la cute a rischio di lesione**
  - b utilizzare presidi che riducano la pressione a ridosso delle prominenze ossee
  - c proteggere la cute dall'eccessiva esposizione all'umidità
- 9 **Quale delle seguenti posizioni deve assumere il paziente per essere sottoposto a toracentesi:**
- a posizione supina con gli arti superiori sollevati
  - b **posizione seduta con busto in avanti e braccia appoggiate a un piano**
  - c posizione prona
- 10 **Una adeguata cura del piede diabetico comprende:**
- a un frequente utilizzo di antisettici
  - b **il controllo delle ipercheratosi e il mantenimento della cute pulita e ben idratata**
  - c l'utilizzo costante di creme

JK  
AB MB

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**24/09/2020**

**PROVA PRATICA C**

**TIPO TEST 3**

  
AB 

- 1 Tra i seguenti presidi non invasivi per la somministrazione di ossigenoterapia quale permette di erogare ossigeno ad una percentuale definita:
  - a maschera di Venturi
  - b cannula nasale
  - c maschera "semplice"
- 2 La cura della cute è importante nella prevenzione delle ulcere da pressione. Nell'agire quotidiano, nell'ottica della prevenzione, l'infermiere NON deve:
  - a massaggiare energicamente la cute a rischio di lesione
  - b utilizzare presidi che riducano la pressione a ridosso delle prominenze ossee
  - c proteggere la cute dall'eccessiva esposizione all'umidità
- 3 Un paziente sottoposto a puntura lombare lamenta cefalea. Quale tra le seguenti azioni è indicata:
  - a invitare il paziente a deambulare
  - b aumentare l'illuminazione della stanza e posizionare il paziente seduto
  - c posizionare il paziente supino senza cuscini
- 4 Attraverso il monitoraggio delle entrate e delle uscite (bilancio idrico) l'infermiere valuta:
  - a i liquidi introdotti ad esclusione dei liquidi assunti per via orale
  - b i liquidi introdotti (assunti per via orale e parenterale) ed i liquidi eliminati
  - c i liquidi introdotti e i liquidi eliminati ad esclusione del vomito e dei liquidi di drenaggio
- 5 Quale tra le seguenti costituisce indicazione assoluta al cateterismo vescicale:
  - a infezioni delle vie urinarie
  - b anuria
  - c ritenzione urinaria acuta
- 6 La Scala di Braden rappresenta lo strumento per la valutazione:
  - a del rischio di sviluppare lesioni da decubito
  - b del livello del dolore
  - c del livello di dipendenza nelle attività di vita quotidiane
- 7 Quale delle seguenti posizioni deve assumere il paziente per essere sottoposto a toracentesi:
  - a posizione supina con gli arti superiori sollevati
  - b posizione seduta con busto in avanti e braccia appoggiate a un piano
  - c posizione prona

AB



- 8 **Perché nell'assistenza ad un paziente con infezione da Clostridium Difficile è previsto il lavaggio delle mani con acqua e sapone:**
- a perché il lavaggio con sapone e acqua corrente permette di rimuovere meccanicamente le spore dalla superficie delle mani
  - b per evitare l'uso eccessivo di soluzione idroalcolica e l'aumento dei relativi costi
  - c perché il lavaggio delle mani con acqua e sapone è sempre da preferire alla soluzione idroalcolica in tutti i setting e per tutti i pazienti; l'uso della soluzione idroalcolica va limitato alle sole situazioni in cui non è presente un lavandino
- 9 **Il trattamento della colostomia può necessitare di una detersione routinaria, è indicato l'utilizzo di:**
- a disinfettante a base di iodopovidone
  - b acqua e sapone
  - c soluzione disinfettante a base alcolica
- 10 **Una adeguata cura del piede diabetico comprende:**
- a un frequente utilizzo di antisettici
  - b il controllo delle ipercheratosi e il mantenimento della cute pulita e ben idratata
  - c l'utilizzo costante di creme

AB

