

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

22/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 1


AB 

- 1 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:**
 - a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - b lo stato di salute di un neonato alla nascita
 - c lo stato di coscienza

- 2 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'utilizzo di soluzioni:**
 - a saline mediante irrigazione
 - b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi

- 3 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:**
 - a assumere pasti ricchi di grassi
 - b assumere pasti piccoli e frequenti
 - c assumere pasti abbondanti

- 4 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l'insieme degli interventi da prevedere nella gestione del drenaggio toracico:**
 - a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido drenato
 - b monitoraggio della quantità del liquido drenato
 - c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato

- 5 Quale tra i seguenti stati corrisponde al quadro clinico della disidratazione:**
 - a cute fredda, ipertensione, bradicardia, poliuria
 - b cute umida, ipertensione, bradicardia, poliuria
 - c cute secca, ipotensione, tachicardia, oliguria

- 6 L'infermiere rileva la presenza di glucosio nelle urine mediante stick. In quale circostanza è presente il glucosio nelle urine:**
 - a sempre
 - b quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl
 - c solo in caso di patologie renali

- 7 La somministrazione di ossigenoterapia è:**
 - a a discrezione dell'infermiere nei casi di BPCO
 - b assoggettata a prescrizione medica
 - c libera da prescrizioni

- 8 Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:**
 - a la scala di Likert
 - b la scala di Cheops
 - c La scala di Conley

AB

MB

9 I farmaci da ricostituire:

- a possono essere preparati fino a 48 ore prima dell'infusione
- b devono essere preparati al momento dell'impiego
- c possono essere preparati da un infermiere e somministrati da altri infermieri anche in turni diversi

10 Nel trattamento di quali fratture è utilizzata più frequentemente la trazione scheletrica:

- a femore, omero, tibia
- b bacino, tronco, astragalo
- c ileo, ischio, pube

AB





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

22/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 2

AB

Handwritten signature and initials, including the letters 'AB' and a stylized signature.



- 1 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'utilizzo di soluzioni:
 - a saline mediante irrigazione
 - b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi
- 2 Nel trattamento di quali fratture è utilizzata più frequentemente la trazione scheletrica:
 - a femore, omero, tibia
 - b bacino, tronco, astragalo
 - c ileo, ischio, pube
- 3 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:
 - a assumere pasti ricchi di grassi
 - b assumere pasti piccoli e frequenti
 - c assumere pasti abbondanti
- 4 Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:
 - a la scala di Likert
 - b la scala di Cheops
 - c La scala di Conley
- 5 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:
 - a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - b lo stato di salute di un neonato alla nascita
 - c lo stato di coscienza
- 6 Quale tra i seguenti stati corrisponde al quadro clinico della disidratazione:
 - a cute fredda, ipertensione, bradicardia, poliuria
 - b cute umida, ipertensione, bradicardia, poliuria
 - c cute secca, ipotensione, tachicardia, oliguria
- 7 L'infermiere rileva la presenza di glucosio nelle urine mediante stick. In quale circostanza è presente il glucosio nelle urine:
 - a sempre
 - b quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl
 - c solo in caso di patologie renali
- 8 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l'insieme degli interventi da prevedere nella gestione del drenaggio toracico:
 - a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido drenato
 - b monitoraggio della quantità del liquido drenato
 - c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato

AB

9 La somministrazione di ossigenoterapia è:

- a a discrezione dell'infermiere nei casi di BPCO
- b assoggettata a prescrizione medica**
- c libera da prescrizioni

10 I farmaci da ricostituire:

- a possono essere preparati fino a 48 ore prima dell'infusione
- b devono essere preparati al momento dell'impiego**
- c possono essere preparati da un infermiere e somministrati da altri infermieri anche in turni diversi

AB



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

22/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 3


AB 

- 1 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'utilizzo di soluzioni:**
 - a saline mediante irrigazione
 - b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi
- 2 Nel trattamento di quali fratture è utilizzata più frequentemente la trazione scheletrica:**
 - a femore, omero, tibia
 - b bacino, tronco, astragalo
 - c ileo, ischio, pube
- 3 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:**
 - a assumere pasti ricchi di grassi
 - b assumere pasti piccoli e frequenti
 - c assumere pasti abbondanti
- 4 Quale tra i seguenti stati corrisponde al quadro clinico della disidratazione:**
 - a cute fredda, ipertensione, bradicardia, poliuria
 - b cute umida, ipertensione, bradicardia, poliuria
 - c cute secca, ipotensione, tachicardia, oliguria
- 5 La somministrazione di ossigenoterapia è:**
 - a a discrezione dell'infermiere nei casi di BPCO
 - b assoggettata a prescrizione medica
 - c libera da prescrizioni
- 6 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l'insieme degli interventi da prevedere nella gestione del drenaggio toracico:**
 - a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido drenato
 - b monitoraggio della quantità del liquido drenato
 - c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato
- 7 I farmaci da ricostituire:**
 - a possono essere preparati fino a 48 ore prima dell'infusione
 - b devono essere preparati al momento dell'impiego
 - c possono essere preparati da un infermiere e somministrati da altri infermieri anche in turni diversi
- 8 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:**
 - a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - b lo stato di salute di un neonato alla nascita
 - c lo stato di coscienza


AB 

- 9 L'infermiere rileva la presenza di glucosio nelle urine mediante stick. In quale circostanza è presente il glucosio nelle urine:
- a sempre
 - b quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl
 - c solo in caso di patologie renali
- 10 Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:
- a la scala di Likert
 - b la scala di Cheops
 - c La scala di Conley

AB CB



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

22/09/2020

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 1


AB 

- 1 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:**
 - a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - b lo stato di salute di un neonato alla nascita
 - c lo stato di coscienza

- 2 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'utilizzo di soluzioni:**
 - a saline mediante irrigazione
 - b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi

- 3 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:**
 - a assumere pasti ricchi di grassi
 - b assumere pasti piccoli e frequenti
 - c assumere pasti abbondanti

- 4 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l'insieme degli interventi da prevedere nella gestione del drenaggio toracico:**
 - a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido drenato
 - b monitoraggio della quantità del liquido drenato
 - c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato

- 5 La decontaminazione dei ferri chirurgici:**
 - a viene effettuata in autoclave
 - b viene effettuata al termine dell'intervento e precede la fase di lavaggio
 - c viene effettuata dopo la fase di lavaggio

- 6 Quale tra i seguenti rappresenta uno degli interventi assistenziali che l'infermiere deve attuare nella contenzione fisica di un paziente:**
 - a monitoraggio nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l'attuazione
 - b applicazione della prescrizione medica solo nelle ore notturne
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta

- 7 Durante la preparazione di agenti chemioterapici è indicato l'utilizzo di quale tipologia di guanti:**
 - a guanti sterili
 - b guanti non sterili monouso
 - c guanti in gomma

- 8 In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte ad evitare punture e tagli accidentali:**
 - a solo quando sono stati utilizzati per pazienti HIV- positivi
 - b sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati
 - c solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti

AB

MB



9 Il triage è:

- a una metodica di classificazione dei pazienti in base alla loro gravità espressa attraverso un codice colore
- b un criterio per smistare solo pazienti non urgenti
- c una metodica per ridurre i tempi di attesa in ospedale

10 Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:

- a esclusivamente in presenza di parestesie agli arti inferiori
- b prima di alzarsi dal letto al mattino
- c esclusivamente durante il riposo notturno

AB



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

22/09/2020

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 2


AB 

- 1 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'utilizzo di soluzioni:
 - a saline mediante irrigazione
 - b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi
- 2 Quale tra i seguenti rappresenta uno degli interventi assistenziali che l'infermiere deve attuare nella contenzione fisica di un paziente:
 - a monitoraggio nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l'attuazione
 - b applicazione della prescrizione medica solo nelle ore notturne
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta
- 3 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:
 - a assumere pasti ricchi di grassi
 - b assumere pasti piccoli e frequenti
 - c assumere pasti abbondanti
- 4 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l'insieme degli interventi da prevedere nella gestione del drenaggio toracico:
 - a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido drenato
 - b monitoraggio della quantità del liquido drenato
 - c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato
- 5 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:
 - a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - b lo stato di salute di un neonato alla nascita
 - c lo stato di coscienza
- 6 Il triage è:
 - a una metodica di classificazione dei pazienti in base alla loro gravità espressa attraverso un codice colore
 - b un criterio per smistare solo pazienti non urgenti
 - c una metodica per ridurre i tempi di attesa in ospedale
- 7 La decontaminazione dei ferri chirurgici:
 - a viene effettuata in autoclave
 - b viene effettuata al termine dell'intervento e precede la fase di lavaggio
 - c viene effettuata dopo la fase di lavaggio
- 8 Durante la preparazione di agenti chemioterapici è indicato l'utilizzo di quale tipologia di guanti:
 - a guanti sterili
 - b guanti non sterili monouso
 - c guanti in gomma

AB





- 9 **Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:**
- a esclusivamente in presenza di parestesie agli arti inferiori
 - b **prima di alzarsi dal letto al mattino**
 - c esclusivamente durante il riposo notturno
- 10 **In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte ad evitare punture e tagli accidentali:**
- a solo quando sono stati utilizzati per pazienti HIV- positivi
 - b **sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati**
 - c solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti

AB 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

22/09/2020

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 3

AB 

- 1 **Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:**
 - a esclusivamente in presenza di parestesie agli arti inferiori
 - b **prima di alzarsi dal letto al mattino**
 - c esclusivamente durante il riposo notturno
- 2 **Durante la preparazione di agenti chemioterapici è indicato l'utilizzo di quale tipologia di guanti:**
 - a **guanti sterili**
 - b guanti non sterili monouso
 - c guanti in gomma
- 3 **Quali tra le seguenti alternative rappresenta l'insieme degli interventi da prevedere nella gestione del drenaggio toracico:**
 - a **monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido drenato**
 - b monitoraggio della quantità del liquido drenato
 - c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato
- 4 **Quale tra i seguenti rappresenta uno degli interventi assistenziali che l'infermiere deve attuare nella contenzione fisica di un paziente:**
 - a **monitoraggio nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l'attuazione**
 - b applicazione della prescrizione medica solo nelle ore notturne
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta
- 5 **La decontaminazione dei ferri chirurgici:**
 - a viene effettuata in autoclave
 - b **viene effettuata al termine dell'intervento e precede la fase di lavaggio**
 - c viene effettuata dopo la fase di lavaggio
- 6 **In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte ad evitare punture e tagli accidentali:**
 - a solo quando sono stati utilizzati per pazienti HIV- positivi
 - b **sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati**
 - c solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti
- 7 **Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'utilizzo di soluzioni:**
 - a **saline mediante irrigazione**
 - b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi

AB MB



8 Il triage è:

- a una metodica di classificazione dei pazienti in base alla loro gravità espressa attraverso un codice colore
- b un criterio per smistare solo pazienti non urgenti
- c una metodica per ridurre i tempi di attesa in ospedale

9 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:

- a assumere pasti ricchi di grassi
- b assumere pasti piccoli e frequenti
- c assumere pasti abbondanti

10 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:

- a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
- b lo stato di salute di un neonato alla nascita
- c lo stato di coscienza

AB MB