



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**23/09/2020**

**PROVA PRATICA B**

**TIPO TEST 1**

AB   


- 1 La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
  - a la predizione del rischio di caduta
  - b la predizione del rischio di lesioni da decubito
  - c la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana
- 2 Il lavaggio sociale delle mani si effettua:**
  - a con acqua e sapone detergente per una durata di 40 – 60 secondi
  - b con antisettico per una durata di circa 2 minuti
  - c frizionando le mani con soluzione alcolica per una durata di circa 10 minuti
- 3 Per aiutare un soggetto ad espettorare le secrezioni è utile:**
  - a invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso
  - b fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
  - c associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse
- 4 Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:**
  - a la cintura ergonomica
  - b lo stabilizzatore per la postura corretta
  - c il telo ad alto scorrimento
- 5 Tra le più comuni attività per la preparazione all'intervento chirurgico, le più recenti e autorevoli Linee Guida mettono in discussione l'appropriatezza o l'efficacia:**
  - a della tricotomia come misura universale per la prevenzione delle infezioni
  - b dell'informazione e dell'educazione nei confronti del paziente
  - c della preparazione della cute mediante doccia con detergente o antisettico
- 6 La calciparina deve essere somministrata per via:**
  - a intramuscolare
  - b sottocutanea
  - c orale
- 7 Per raccogliere i dati utili alla pianificazione dell'assistenza infermieristica, l'infermiere utilizza:**
  - a l'intervista al paziente e consultazione della documentazione sanitaria
  - b l'osservazione del paziente
  - c entrambe le precedenti risposte sono corrette
- 8 Se un paziente deve eseguire un intervento chirurgico in urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere:**
  - a posizionare un catetere vescicale al paziente
  - b incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori
  - c somministrare la preanestesia al paziente

✓  
AB MB

- 9 In un paziente operato all'addome, se si verifica distensione addominale, quale intervento deve essere **EVITATO**:
- a favorire la mobilitazione precoce
  - b monitorare la comparsa dei rumori intestinali
  - c **mantenere il paziente fermo a letto sino alla ricomparsa della peristalsi intestinale**
- 10 Nella rianimazione cardiopolmonare di un adulto, la ventilazione del paziente:
- a deve precedere le compressioni cardiache
  - b **deve seguire le compressioni cardiache**
  - c può indifferentemente precedere o seguire le compressioni cardiache

AB MB

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**23/09/2020**

**PROVA PRATICA B**

**TIPO TEST 2**

AB

- 1 Il lavaggio sociale delle mani si effettua:**
  - a con acqua e sapone detergente per una durata di 40 – 60 secondi
  - b con antisettico per una durata di circa 2 minuti
  - c frizionando le mani con soluzione alcolica per una durata di circa 10 minuti
  
- 2 La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
  - a la predizione del rischio di caduta
  - b la predizione del rischio di lesioni da decubito
  - c la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana
  
- 3 Per aiutare un soggetto ad espettorare le secrezioni è utile:**
  - a invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso
  - b fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
  - c associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse
  
- 4 Tra le più comuni attività per la preparazione all'intervento chirurgico, le più recenti e autorevoli Linee Guida mettono in discussione l'appropriatezza o l'efficacia:**
  - a della tricotomia come misura universale per la prevenzione delle infezioni
  - b dell'informazione e dell'educazione nei confronti del paziente
  - c della preparazione della cute mediante doccia con detergente o antisettico
  
- 5 Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:**
  - a la cintura ergonomica
  - b lo stabilizzatore per la postura corretta
  - c il telo ad alto scorrimento
  
- 6 La calciparina deve essere somministrata per via:**
  - a intramuscolare
  - b sottocutanea
  - c orale
  
- 7 Se un paziente deve eseguire un intervento chirurgico in urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere:**
  - a posizionare un catetere vescicale al paziente
  - b incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori
  - c somministrare la preanestesia al paziente
  
- 8 Per raccogliere i dati utili alla pianificazione dell'assistenza infermieristica, l'infermiere utilizza:**
  - a l'intervista al paziente e consultazione della documentazione sanitaria
  - b l'osservazione del paziente
  - c entrambe le precedenti risposte sono corrette

AB



- 9 Nella rianimazione cardiopolmonare di un adulto, la ventilazione del paziente:
- a deve precedere le compressioni cardiache
  - b deve seguire le compressioni cardiache
  - c può indifferentemente precedere o seguire le compressioni cardiache
- 10 In un paziente operato all'addome, se si verifica distensione addominale, quale intervento deve essere evitato:
- a favorire la mobilizzazione precoce
  - b monitorare la comparsa dei rumori intestinali
  - c mantenere il paziente fermo a letto sino alla ricomparsa della peristalsi intestinale

AB





- 1 **In un paziente operato all'addome, se si verifica distensione addominale, quale intervento deve essere evitato:**
  - a favorire la mobilizzazione precoce
  - b monitorare la comparsa dei rumori intestinali
  - c **mantenere il paziente fermo a letto sino alla ricomparsa della peristalsi intestinale**
  
- 2 **Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:**
  - a la cintura ergonomica
  - b lo stabilizzatore per la postura corretta
  - c **il telo ad alto scorrimento**
  
- 3 **Il lavaggio sociale delle mani si effettua:**
  - a **con acqua e sapone detergente per una durata di 40 – 60 secondi**
  - b con antisettico per una durata di circa 2 minuti
  - c frizionando le mani con soluzione alcolica per una durata di circa 10 minuti
  
- 4 **Per raccogliere i dati utili alla pianificazione dell'assistenza infermieristica, l'infermiere utilizza:**
  - a l'intervista al paziente e consultazione della documentazione sanitaria
  - b l'osservazione del paziente
  - c **entrambe le precedenti risposte sono corrette**
  
- 5 **Per aiutare un soggetto ad espettorare le secrezioni è utile:**
  - a invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso
  - b fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
  - c **associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse**
  
- 6 **Tra le più comuni attività per la preparazione all'intervento chirurgico, le più recenti e autorevoli Linee Guida mettono in discussione l'appropriatezza o l'efficacia:**
  - a **della tricotomia come misura universale per la prevenzione delle infezioni**
  - b dell'informazione e dell'educazione nei confronti del paziente
  - c della preparazione della cute mediante doccia con detergente o antisettico
  
- 7 **La calciparina deve essere somministrata per via:**
  - a intramuscolare
  - b **sottocutanea**
  - c orale
  
- 8 **Se un paziente deve eseguire un intervento chirurgico in urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere:**
  - a posizionare un catetere vescicale al paziente
  - b **incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori**
  - c somministrare la preanestesia al paziente

*[Handwritten signature]*

AB *[Handwritten signature]*



**9 La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**

- a la predizione del rischio di caduta
- b la predizione del rischio di lesioni da decubito
- c la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiane

**10 Nella rianimazione cardiopolmonare di un adulto, la ventilazione del paziente:**

- a deve precedere le compressioni cardiache
- b deve seguire le compressioni cardiache
- c può indifferentemente precedere o seguire le compressioni cardiache

*[Handwritten signature]*

AB *[Handwritten signature]*





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**23/09/2020**

**PROVA PRATICA C**

**TIPO TEST 1**

AB 

- 1 **La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
  - a la predizione del rischio di caduta
  - b la predizione del rischio di lesioni da decubito
  - c la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiane
- 2 **Il lavaggio sociale delle mani si effettua:**
  - a con acqua e sapone detergente per una durata di 40 – 60 secondi
  - b con antisettico per una durata di circa 2 minuti
  - c frizionando le mani con soluzione alcolica per una durata di circa 10 minuti
- 3 **Per aiutare un soggetto ad espettorare le secrezioni è utile:**
  - a invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso
  - b fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
  - c associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse
- 4 **Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:**
  - a la cintura ergonomica
  - b lo stabilizzatore per la postura corretta
  - c il telo ad alto scorrimento
- 5 **Quali fra le seguenti indica con maggiore completezza la sequenza delle fasi del processo di assistenza infermieristica:**
  - a attuazione degli interventi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica e valutazione
  - b raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, valutazione
  - c raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta e attuazione degli interventi, valutazione
- 6 **Indicare le complicanze precoci di una stomia:**
  - a dermatiti, prolasso
  - b ernia, fistola
  - c ischemia, emorragia
- 7 **Se durante l'alimentazione attraverso sondino naso gastrico si manifesta vomito, quale dei seguenti interventi NON è indicato:**
  - a posizionare il paziente seduto
  - b aspirare immediatamente dal sondino
  - c rimuovere immediatamente il sondino
- 8 **Un paziente operato per distacco di retina, nell'immediata fase postoperatoria:**
  - a deve osservare il riposo assoluto
  - b può alzarsi appena superati gli effetti dell'anestesia generale
  - c può assumere la posizione seduta ed esercitare il più possibile l'attività visiva



AB



**9 In una Unità Operativa viene ricoverato un utente affetto da Scabbia: quali misure precauzionali devono essere messe in atto per prevenire la contaminazione di altre persone o dell'ambiente:**

- a precauzioni da contatto
- b precauzioni da droplets (goccioline respiratorie)
- c non è necessaria alcuna precauzione

**10 Per i rifiuti prodotti dai pazienti affetti da COVID-19, in isolamento domiciliare, il Rapporto n. 1 del 7.3.2020 dell'Istituto Superiore di Sanità raccomanda:**

- a smaltimento in un doppio sacco impermeabile in pattumiera chiusa con apertura a pedale
- b smaltimento secondo le consuete modalità adottate per i restanti rifiuti prodotti in ambito domestico
- c entrambe le precedenti risposte sono errate



AB

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**23/09/2020**

**PROVA PRATICA C**

**TIPO TEST 2**

  
AB 

- 1 **Il lavaggio sociale delle mani si effettua:**
  - a con acqua e sapone detergente per una durata di 40 – 60 secondi
  - b con antisettico per una durata di circa 2 minuti
  - c frizionando le mani con soluzione alcolica per una durata di circa 10 minuti
- 2 **Quali fra le seguenti indica con maggiore completezza la sequenza delle fasi del processo di assistenza infermieristica:**
  - a attuazione degli interventi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica e valutazione
  - b raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, valutazione
  - c raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta e attuazione degli interventi, valutazione
- 3 **La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
  - a la predizione del rischio di caduta
  - b la predizione del rischio di lesioni da decubito
  - c la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiane
- 4 **Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:**
  - a la cintura ergonomica
  - b lo stabilizzatore per la postura corretta
  - c il telo ad alto scorrimento
- 5 **Per aiutare un soggetto ad espettorare le secrezioni è utile:**
  - a invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso
  - b fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
  - c associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse
- 6 **Se durante l'alimentazione attraverso sondino naso gastrico si manifesta vomito, quale dei seguenti interventi NON è indicato:**
  - a posizionare il paziente seduto
  - b aspirare immediatamente dal sondino
  - c rimuovere immediatamente il sondino
- 7 **Per i rifiuti prodotti dai pazienti affetti da COVID-19, in isolamento domiciliare, il Rapporto n. 1 del 7.3.2020 dell'Istituto Superiore di Sanità raccomanda:**
  - a smaltimento in un doppio sacco impermeabile in pattumiera chiusa con apertura a pedale
  - b smaltimento secondo le consuete modalità adottate per i restanti rifiuti prodotti in ambito domestico
  - c entrambe le precedenti risposte sono errate
- 8 **Indicare le complicanze precoci di una stomia:**
  - a dermatiti, prolasso
  - b ernia, fistola
  - c ischemia, emorragia

AB



- 9 Un paziente operato per distacco di retina, nell'immediata fase postoperatoria:
- a deve osservare il riposo assoluto
  - b può alzarsi appena superati gli effetti dell'anestesia generale
  - c può assumere la posizione seduta ed esercitare il più possibile l'attività visiva
- 10 In una Unità Operativa viene ricoverato un utente affetto da Scabbia: quali misure precauzionali devono essere messe in atto per prevenire la contaminazione di altre persone o dell'ambiente:
- a precauzioni da contatto
  - b precauzioni da droplets (goccioline respiratorie)
  - c non è necessaria alcuna precauzione



AB MB

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**23/09/2020**



**PROVA PRATICA C**

**TIPO TEST 3**

  
AB 



- 1 Se durante l'alimentazione attraverso sondino naso gastrico si manifesta vomito, quale dei seguenti interventi **NON** è indicato:
  - a posizionare il paziente seduto
  - b aspirare immediatamente dal sondino
  - c **rimuovere immediatamente il sondino**
- 2 Un paziente operato per distacco di retina, nell'immediata fase postoperatoria:
  - a **deve osservare il riposo assoluto**
  - b può alzarsi appena superati gli effetti dell'anestesia generale
  - c può assumere la posizione seduta ed esercitare il più possibile l'attività visiva
- 3 Il lavaggio sociale delle mani si effettua:
  - a **con acqua e sapone detergente per una durata di 40 – 60 secondi**
  - b con antisettico per una durata di circa 2 minuti
  - c frizionando le mani con soluzione alcolica per una durata di circa 10 minuti
- 4 Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:
  - a la cintura ergonomica
  - b lo stabilizzatore per la postura corretta
  - c **il telo ad alto scorrimento**
- 5 Quali fra le seguenti indica con maggiore completezza la sequenza delle fasi del processo di assistenza infermieristica:
  - a attuazione degli interventi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica e valutazione
  - b raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, valutazione
  - c **raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta e attuazione degli interventi, valutazione**
- 6 Indicare le complicanze **precoci** di una stomia:
  - a dermatiti, prolasso
  - b ernia, fistola
  - c **ischemia, emorragia**
- 7 Per i rifiuti prodotti dai pazienti affetti da COVID-19, in isolamento domiciliare, il Rapporto n. 1 del 7.3.2020 dell'Istituto Superiore di Sanità raccomanda:
  - a **smaltimento in un doppio sacco impermeabile in pattumiera chiusa con apertura a pedale**
  - b smaltimento secondo le consuete modalità adottate per i restanti rifiuti prodotti in ambito domestico
  - c entrambe le precedenti risposte sono errate
- 8 La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per:
  - a **la predizione del rischio di caduta**
  - b la predizione del rischio di lesioni da decubito
  - c la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiane

  
AB 

**9 In una Unità Operativa viene ricoverato un utente affetto da Scabbia: quali misure precauzionali devono essere messe in atto per prevenire la contaminazione di altre persone o dell'ambiente:**

- a precauzioni da contatto
- b precauzioni da droplets (goccioline respiratorie)
- c non è necessaria alcuna precauzione

**10 Per aiutare un soggetto ad espettorare le secrezioni è utile:**

- a invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso
- b fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
- c associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse

AB

MB