

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

21/09/2020

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 1

AB



- 1 **Il Barthel Index è:**
 - a uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - b uno strumento per valutare la performance dell'operatore sanitario
 - c **uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della persona assistita**

- 2 **NON è necessario l'utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta di:**
 - a urina
 - b sangue
 - c **feci**

- 3 **Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
 - a diminuire la velocità di infusione
 - b **sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e chiamare il medico**
 - c diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

- 4 **Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:**
 - a lavaggio sociale
 - b **lavaggio antisettico**
 - c lavaggio sociale con soluzione idroalcolica

- 5 **Nell'esecuzione di una broncoaspirazione in un paziente affetto da COVID-19, i Dispositivi di Protezione Individuale/indumenti barriera da utilizzare sono:**
 - a mascherina chirurgica, camice e guanti monouso, occhiali/visiera protettivi
 - b **facciale filtrante FFP3 o FFP2, camice e guanti monouso, occhiali/visiera protettivi**
 - c facciale filtrante FFP3 o FFP2, guanti monouso, occhiali/visiera protettivi solo se non si indossano già propri occhiali da vista

- 6 **Tra quelli indicati, quale intervento è opportuno attuare per favorire il mantenimento dell'integrità cutanea in un paziente:**
 - a **ispezionare quotidianamente la cute per individuare possibili arrossamenti**
 - b mantenere la cute umida
 - c applicare creme antibiotiche

- 7 **Nell'Unità Operativa viene ricoverato un paziente affetto da Pediculosi: quali misure precauzionali si attuano per prevenire la contaminazione ad altre persone o all'ambiente:**
 - a **precauzioni standard e precauzioni da contatto**
 - b precauzioni per via respiratoria
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta

AB



- 8 In un paziente con apparecchio gessato a un arto, quali segni e sintomi si devono monitorare all'estremità interessata al fine di prevenire danni alla funzionalità neurovascolare:
- a colorito cutaneo
 - b presenza di dolore e/o parestesie
 - c entrambe le precedenti risposte sono corrette
- 9 Quale delle seguenti procedure va eseguita per prima in caso di politrauma:
- a medicare le eventuali ferite lacero-contuse
 - b proteggere la colonna cervicale e garantire la pervietà delle vie aeree
 - c proteggere dall'ipotermia
- 10 Per garantire l'assorbimento dell'insulina, quale via di somministrazione è indicata:
- a intramuscolare
 - b orale
 - c sottocutanea

AB



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

21/09/2020

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 2

h
AB
mg

- 1 **Nell'Unità Operativa viene ricoverato un paziente affetto da Pediculosi: quali misure precauzionali si attuano per prevenire la contaminazione ad altre persone o all'ambiente:**
 - a precauzioni standard e precauzioni da contatto
 - b precauzioni per via respiratoria
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta
- 2 **Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:**
 - a lavaggio sociale
 - b lavaggio antisettico
 - c lavaggio sociale con soluzione idroalcolica
- 3 **NON è necessario l'utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta di:**
 - a urina
 - b sangue
 - c feci
- 4 **Tra quelli indicati, quale intervento è opportuno attuare per favorire il mantenimento dell'integrità cutanea in un paziente:**
 - a ispezionare quotidianamente la cute per individuare possibili arrossamenti
 - b mantenere la cute umida
 - c applicare creme antibiotiche
- 5 **Il Barthel Index è:**
 - a uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - b uno strumento per valutare la performance dell'operatore sanitario
 - c uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della persona assistita
- 6 **Per garantire l'assorbimento dell'insulina, quale via di somministrazione è indicata:**
 - a intramuscolare
 - b orale
 - c sottocutanea
- 7 **In un paziente con apparecchio gessato a un arto, quali segni e sintomi si devono monitorare all'estremità interessata al fine di prevenire danni alla funzionalità neurovascolare:**
 - a colorito cutaneo
 - b presenza di dolore e/o parestesie
 - c entrambe le precedenti risposte sono corrette
- 8 **Nell'esecuzione di una broncoaspirazione in un paziente affetto da COVID-19, i Dispositivi di Protezione Individuale/indumenti barriera da utilizzare sono:**
 - a mascherina chirurgica, camice e guanti monouso, occhiali/visiera protettivi
 - b facciale filtrante FFP3 o FFP2, camice e guanti monouso, occhiali/visiera protettivi
 - c facciale filtrante FFP3 o FFP2, guanti monouso, occhiali/visiera protettivi solo se non si indossano già propri occhiali da vista

AB



- 9 **Quale delle seguenti procedure va eseguita per prima in caso di politrauma:**
- a medicare le eventuali ferite lacero-contuse
 - b proteggere la colonna cervicale e garantire la pervietà delle vie aeree**
 - c proteggere dall'ipotermia
- 10 **Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
- a diminuire la velocità di infusione
 - b sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e chiamare il medico**
 - c diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

h
AB

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

21/09/2020

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 3

AB



- 1 **Nell'esecuzione di una broncoaspirazione in un paziente affetto da COVID-19, i Dispositivi di Protezione Individuale/indumenti barriera da utilizzare sono:**
 - a mascherina chirurgica, camice e guanti monouso, occhiali/visiera protettivi
 - b facciale filtrante FFP3 o FFP2, camice e guanti monouso, occhiali/visiera protettivi
 - c facciale filtrante FFP3 o FFP2, guanti monouso, occhiali/visiera protettivi solo se non si indossano già propri occhiali da vista
- 2 **Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
 - a diminuire la velocità di infusione
 - b sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e chiamare il medico
 - c diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
- 3 **Il Barthel Index è:**
 - a uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - b uno strumento per valutare la performance dell'operatore sanitario
 - c uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della persona assistita
- 4 **Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:**
 - a lavaggio sociale
 - b lavaggio antisettico
 - c lavaggio sociale con soluzione idroalcolica
- 5 **NON è necessario l'utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta di:**
 - a urina
 - b sangue
 - c feci
- 6 **Quale delle seguenti procedure va eseguita per prima in caso di politrauma:**
 - a medicare le eventuali ferite lacero-contuse
 - b proteggere la colonna cervicale e garantire la pervietà delle vie aeree
 - c proteggere dall'ipotermia
- 7 **Tra quelli indicati, quale intervento è opportuno attuare per favorire il mantenimento dell'integrità cutanea in un paziente:**
 - a ispezionare quotidianamente la cute per individuare possibili arrossamenti
 - b mantenere la cute umida
 - c applicare creme antibiotiche
- 8 **In un paziente con apparecchio gessato a un arto, quali segni e sintomi si devono monitorare all'estremità interessata al fine di prevenire danni alla funzionalità neurovascolare:**
 - a colorito cutaneo
 - b presenza di dolore e/o parestesie
 - c entrambe le precedenti risposte sono corrette



AB





- 9 Per garantire l'assorbimento dell'insulina, quale via di somministrazione è indicata:
- a intramuscolare
 - b orale
 - c sottocutanea
- 10 Nell'Unità Operativa viene ricoverato un paziente affetto da Pediculosi: quali misure precauzionali si attuano per prevenire la contaminazione ad altre persone o all'ambiente:
- a precauzioni standard e precauzioni da contatto
 - b precauzioni per via respiratoria
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta

h
AB






CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

21/09/2020

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 1

- 1 **Il Barthel Index è:**
 - a uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - b uno strumento per valutare la performance dell'operatore sanitario
 - c **uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della persona assistita**

- 2 **NON è necessario l'utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta di:**
 - a urina
 - b sangue
 - c **feci**

- 3 **Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
 - a diminuire la velocità di infusione
 - b **sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e chiamare il medico**
 - c diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

- 4 **Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:**
 - a lavaggio sociale
 - b **lavaggio antisettico**
 - c lavaggio sociale con soluzione idroalcolica

- 5 **La modalità più comune di trasmissione delle infezioni avviene attraverso il contatto, che può essere:**
 - a diretto, quando i microrganismi sono trasferiti da una persona ad un'altra senza un oggetto o una persona contaminata intermedia
 - b indiretto, quando un oggetto o una persona consentono il trasferimento del microrganismo da una persona a un'altra
 - c **entrambe le precedenti risposte sono corrette**

- 6 **Secondo l'OMS, le "Precauzioni Standard" o pratiche di routine sono misure di prevenzione delle infezioni che devono essere adottate per l'assistenza:**
 - a **di tutti i pazienti, indipendentemente dalla diagnosi o dal presunto stato infettivo**
 - b dei soli pazienti con malattia infettiva accertata
 - c dei soli pazienti con sospetta malattia infettiva

- 7 **La ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico rappresenta un evento che può causare gravi danni all'assistito. Il Ministero della Salute raccomanda di:**
 - a effettuare sempre una ecografia in II giornata postoperatoria
 - b **effettuare la procedura di conteggio da due operatori contemporaneamente (strumentista, infermiere di sala, operatore di supporto)**
 - c utilizzare garze radio-opache anche per la medicazione della ferita a fine intervento



AB



- 8 Nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare (EBPM) per via sottocutanea:**
- a va evitata la manovra di Lesser
 - b va evitato di massaggiare vigorosamente la zona di iniezione al termine della manovra di somministrazione
 - c **entrambe le manovre vanno evitate**
- 9 Per praticare correttamente la puntura lombare, il paziente deve essere:**
- a in decubito laterale con arti superiori iperestesi
 - b in decubito prono
 - c **in decubito laterale con le gambe flesse e testa piegata verso il torace**
- 10 Nell'instillazione di gocce oculari, l'infermiere deve:**
- a **tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore**
 - b chiedere al paziente di guardare verso il pavimento
 - c appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia


AB 



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

21/09/2020

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 2

AB



- 1 **NON** è necessario l'utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta di:
 - a urina
 - b sangue
 - c feci
- 2 **Il Barthel Index è:**
 - a uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - b uno strumento per valutare la performance dell'operatore sanitario
 - c uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della persona assistita
- 3 **La modalità più comune di trasmissione delle infezioni avviene attraverso il contatto, che può essere:**
 - a diretto, quando i microrganismi sono trasferiti da una persona ad un'altra senza un oggetto o una persona contaminata intermedia
 - b indiretto, quando un oggetto o una persona consentono il trasferimento del microrganismo da una persona a un'altra
 - c entrambe le precedenti risposte sono corrette
- 4 **Nell'instillazione di gocce oculari, l'infermiere deve:**
 - a tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore
 - b chiedere al paziente di guardare verso il pavimento
 - c appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia
- 5 **Secondo l'OMS, le "Precauzioni Standard" o pratiche di routine sono misure di prevenzione delle infezioni che devono essere adottate per l'assistenza:**
 - a di tutti i pazienti, indipendentemente dalla diagnosi o dal presunto stato infettivo
 - b dei soli pazienti con malattia infettiva accertata
 - c dei soli pazienti con sospetta malattia infettiva
- 6 **Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
 - a diminuire la velocità di infusione
 - b sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e chiamare il medico
 - c diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
- 7 **Nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare (EBPM) per via sottocutanea:**
 - a va evitata la manovra di Lesser
 - b va evitato di massaggiare vigorosamente la zona di iniezione al termine della manovra di somministrazione
 - c entrambe le manovre vanno evitate
- 8 **Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:**
 - a lavaggio sociale
 - b lavaggio antisettico
 - c lavaggio sociale con soluzione idroalcolica

AB

- 9 La ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico rappresenta un evento che può causare gravi danni all'assistito. Il Ministero della Salute raccomanda di:**
- a effettuare sempre una ecografia in II giornata postoperatoria
 - b effettuare la procedura di conteggio da due operatori contemporaneamente (strumentista, infermiere di sala, operatore di supporto)
 - c utilizzare garze radio-opache anche per la medicazione della ferita a fine intervento
- 10 Per praticare correttamente la puntura lombare, il paziente deve essere:**
- a in decubito laterale con arti superiori iperestesi
 - b in decubito prono
 - c in decubito laterale con le gambe flesse e testa piegata verso il torace


AB 



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

21/09/2020

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 3

AB

- 1 Nell'instillazione di gocce oculari, l'infermiere deve:**
 - a tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore
 - b chiedere al paziente di guardare verso il pavimento
 - c appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia

- 2 Per praticare correttamente la puntura lombare, il paziente deve essere:**
 - a in decubito laterale con arti superiori iperestesi
 - b in decubito prono
 - c in decubito laterale con le gambe flesse e testa piegata verso il torace

- 3 Secondo l'OMS, le "Precauzioni Standard" o pratiche di routine sono misure di prevenzione delle infezioni che devono essere adottate per l'assistenza:**
 - a di tutti i pazienti, indipendentemente dalla diagnosi o dal presunto stato infettivo
 - b dei soli pazienti con malattia infettiva accertata
 - c dei soli pazienti con sospetta malattia infettiva

- 4 La modalità più comune di trasmissione delle infezioni avviene attraverso il contatto, che può essere:**
 - a diretto, quando i microrganismi sono trasferiti da una persona ad un'altra senza un oggetto o una persona contaminata intermedia
 - b indiretto, quando un oggetto o una persona consentono il trasferimento del microrganismo da una persona a un'altra
 - c entrambe le precedenti risposte sono corrette

- 5 Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
 - a diminuire la velocità di infusione
 - b sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e chiamare il medico
 - c diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

- 6 La ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico rappresenta un evento che può causare gravi danni all'assistito. Il Ministero della Salute raccomanda di:**
 - a effettuare sempre una ecografia in II giornata postoperatoria
 - b effettuare la procedura di conteggio da due operatori contemporaneamente (strumentista, infermiere di sala, operatore di supporto)
 - c utilizzare garze radio-opache anche per la medicazione della ferita a fine intervento

- 7 Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:**
 - a lavaggio sociale
 - b lavaggio antisettico
 - c lavaggio sociale con soluzione idroalcolica



AB



- 8 **Nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare (EBPM) per via sottocutanea:**
- a va evitata la manovra di Lesser
 - b va evitato di massaggiare vigorosamente la zona di iniezione al termine della manovra di somministrazione
 - c **entrambe le manovre vanno evitate**
- 9 **NON è necessario l'utilizzo di contenitori sterili, per esami culturali, in caso di raccolta di:**
- a urina
 - b sangue
 - c **feci**
- 10 **Il Barthel Index è:**
- a uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - b uno strumento per valutare la performance dell'operatore sanitario
 - c **uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della persona assistita**


AB 