



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

22/09/2020

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 1

M AB



- 1 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:**
 - a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - b lo stato di salute di un neonato alla nascita
 - c lo stato di coscienza

- 2 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'utilizzo di soluzioni:**
 - a saline mediante irrigazione
 - b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi

- 3 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:**
 - a assumere pasti ricchi di grassi
 - b assumere pasti piccoli e frequenti
 - c assumere pasti abbondanti

- 4 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l'insieme degli interventi da prevedere nella gestione del drenaggio toracico:**
 - a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido drenato
 - b monitoraggio della quantità del liquido drenato
 - c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato

- 5 Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:**
 - a solo prima di indossarli
 - b prima e dopo averli indossati
 - c solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici

- 6 Prima di essere sottoposto a paracentesi, cosa viene raccomandato al paziente:**
 - a urinare nella fase immediatamente precedente alla paracentesi
 - b effettuare un clistere evacuativo la sera precedente l'effettuazione della paracentesi
 - c sospendere l'assunzione di farmaci almeno dalle ore 24:00 antecedenti la procedura

- 7 Indicare le finalità del drenaggio pleurico:**
 - a prevenire l'emorragia e l'infezione locale e sistemica
 - b monitorare il processo di cicatrizzazione in seguito a resezione bronchiale
 - c rimuovere l'aria ed i liquidi contenuti nello spazio intrapleurico e ristabilire la pressione negativa in cavità pleurica

- 8 Nell'ambito dell'accertamento infermieristico qual è la differenza tra segno e sintomo:**
 - a il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna all'organismo
 - b il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva
 - c si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno

M *AB* *fu* *MS*



- 9 **Quale indicazione deve essere fornita al paziente diabetico per la corretta conservazione dell'insulina:**
- a i flaconi di insulina chiusi possono essere utilizzati senza limite di scadenza
 - b i flaconi di insulina in uso, per cui è previsto un rapido consumo, devono essere tenuti a temperatura ambiente inferiore a 25 gradi centigradi e utilizzati entro un mese dall'apertura
 - c i flaconi di insulina chiusi non ancora utilizzati, devono essere conservati ad una temperatura inferiore a 0 gradi centigradi
- 10 **In quale dei seguenti interventi assistenziali NON è previsto l'utilizzo del guanto sterile:**
- a posizionamento del sondino naso gastrico
 - b medicazione del catetere arterioso
 - c posizionamento del catetere vescicale



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

22/09/2020

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 2

Handwritten signatures:
AB
[Signature]
[Signature]



- 1 Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:**
 - a solo prima di indossarli
 - b prima e dopo averli indossati**
 - c solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici

- 2 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'utilizzo di soluzioni:**
 - a saline mediante irrigazione**
 - b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi

- 3 Prima di essere sottoposto a paracentesi, cosa viene raccomandato al paziente:**
 - a urinare nella fase immediatamente precedente alla paracentesi**
 - b effettuare un clistere evacuativo la sera precedente l'effettuazione della paracentesi
 - c sospendere l'assunzione di farmaci almeno dalle ore 24:00 antecedenti la procedura

- 4 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l'insieme degli interventi da prevedere nella gestione del drenaggio toracico:**
 - a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido drenato**
 - b monitoraggio della quantità del liquido drenato
 - c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato

- 5 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:**
 - a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - b lo stato di salute di un neonato alla nascita
 - c lo stato di coscienza**

- 6 Indicare le finalità del drenaggio pleurico:**
 - a prevenire l'emorragia e l'infezione locale e sistemica
 - b monitorare il processo di cicatrizzazione in seguito a resezione bronchiale
 - c rimuovere l'aria ed i liquidi contenuti nello spazio intrapleurico e ristabilire la pressione negativa in cavità pleurica**

- 7 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:**
 - a assumere pasti ricchi di grassi
 - b assumere pasti piccoli e frequenti**
 - c assumere pasti abbondanti

- 8 Nell'ambito dell'accertamento infermieristico qual è la differenza tra segno e sintomo:**
 - a il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna all'organismo
 - b il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva**
 - c si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno

[Handwritten signatures and initials]



9 In quale dei seguenti interventi assistenziali **NON** è previsto l'utilizzo del guanto sterile:

- a posizionamento del sondino naso gastrico
- b medicazione del catetere arterioso
- c posizionamento del catetere vescicale

10 Quale indicazione deve essere fornita al paziente diabetico per la corretta conservazione dell'insulina:

- a i flaconi di insulina chiusi possono essere utilizzati senza limite di scadenza
- b i flaconi di insulina in uso, per cui è previsto un rapido consumo, devono essere tenuti a temperatura ambiente inferiore a 25 gradi centigradi e utilizzati entro un mese dall'apertura
- c i flaconi di insulina chiusi non ancora utilizzati, devono essere conservati ad una temperatura inferiore a 0 gradi centigradi

h
AB *la* *MG*



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

22/09/2020

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 3

n *B* *lu* *ng*



- 1 In quale dei seguenti interventi assistenziali NON è previsto l'utilizzo del guanto sterile:**
 - a posizionamento del sondino naso gastrico
 - b medicazione del catetere arterioso
 - c posizionamento del catetere vescicale

- 2 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'utilizzo di soluzioni:**
 - a saline mediante irrigazione
 - b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi

- 3 Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:**
 - a solo prima di indossarli
 - b prima e dopo averli indossati
 - c solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici

- 4 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l'insieme degli interventi da prevedere nella gestione del drenaggio toracico:**
 - a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido drenato
 - b monitoraggio della quantità del liquido drenato
 - c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato

- 5 Prima di essere sottoposto a paracentesi, cosa viene raccomandato al paziente:**
 - a urinare nella fase immediatamente precedente alla paracentesi
 - b effettuare un clistere evacuativo la sera precedente l'effettuazione della paracentesi
 - c sospendere l'assunzione di farmaci almeno dalle ore 24:00 antecedenti la procedura

- 6 Nell'ambito dell'accertamento infermieristico qual è la differenza tra segno e sintomo:**
 - a il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna all'organismo
 - b il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva
 - c si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno

- 7 Indicare le finalità del drenaggio pleurico:**
 - a prevenire l'emorragia e l'infezione locale e sistemica
 - b monitorare il processo di cicatrizzazione in seguito a resezione bronchiale
 - c rimuovere l'aria ed i liquidi contenuti nello spazio intrapleurico e ristabilire la pressione negativa in cavità pleurica

- 8 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:**
 - a assumere pasti ricchi di grassi
 - b assumere pasti piccoli e frequenti
 - c assumere pasti abbondanti



- 9 **Quale indicazione deve essere fornita al paziente diabetico per la corretta conservazione dell'insulina:**
- a i flaconi di insulina chiusi possono essere utilizzati senza limite di scadenza
 - b i flaconi di insulina in uso, per cui è previsto un rapido consumo, devono essere tenuti a temperatura ambiente inferiore a 25 gradi centigradi e utilizzati entro un mese dall'apertura
 - c i flaconi di insulina chiusi non ancora utilizzati, devono essere conservati ad una temperatura inferiore a 0 gradi centigradi
- 10 **La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:**
- a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - b lo stato di salute di un neonato alla nascita
 - c lo stato di coscienza

[Handwritten signatures]