

Vaccinazione contro Papillomavirus (HPV)

Il Papillomavirus (HPV) costituisce un gruppo di virus molto diffuso, esistono infatti oltre 100 sierotipi di HPV, di cui più di 40 possono provocare infezioni dell'apparato genitale femminile e maschile.

La vaccinazione è primariamente raccomandata per tutti i bambini, maschi e femmine, al dodicesimo anno di età. La gratuità è comunque garantita fino al compimento dei 26 anni per tutte le donne non ancora vaccinate e per gli uomini a partire dai nati dal 2006.

La vaccinazione viene offerta gratuitamente senza limite di età a donne con storia clinica documentata di trattamento di lesioni cervicali di grado elevato (CIN2+) negli ultimi 3 anni e a persone con infezione da HIV.

La vaccinazione è inoltre offerta fino al compimento del 46° anno di età a persone non precedentemente vaccinate con ciclo completo in caso di: trattamento con immunosoppressori e immunomodulatori, sex workers, uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, chi intraprende il percorso di transizione di genere, chi ha lesioni HPV-relate pre-invasive intraepiteliali in distretti diversi dalla cervice uterina senza distinzione di genere.

Il vaccino attualmente in uso è quello che offre la maggiore protezione perché contiene 9 sierotipi di HPV, il ciclo vaccinale consiste di 3 dosi. La vaccinazione è prenotabile senza prescrizione medica.

Anche per le persone vaccinate è comunque indispensabile aderire al programma di screening della cervice uterina, per maggiori informazioni visita la pagina **Screening del collo dell'utero**.