

Vaccinazione combinata ANTIEPATITE A + ANTIEPATITE B

Caratteristiche

Vaccino combinato antiepatite A ed antiepatite B.

Tipi di vaccino

Il vaccino è disponibile nella formulazione pediatrica e nella formulazione per adulti.

Indicazioni alla vaccinazione

Il rischio di contrarre l'epatite A in Paesi ad alta endemia aumenta proporzionalmente alla durata del viaggio. Anche il rischio di contrarre l'epatite B aumenta con la durata del soggiorno in Paesi endemici e non è esclusivamente legato ai contatti sessuali o al ricorso alle strutture sanitarie, ma può dipendere anche dal contatto di oggetti contaminati con la cute o le mucose lese.

La vaccinazione combinata antiepatite A e antiepatite B è indicata nelle seguenti categorie:

1. viaggiatori internazionali diretti in Paesi ad endemia media o alta per epatite A, che siano esposti anche al rischio di epatite B per uno o più dei seguenti fattori:
 - contatti sessuali con la popolazione locale;
 - durata del viaggio superiore ad un mese;
2. persone dirette per motivi di lavoro, studio o volontariato in Paesi ad endemia media o alta per l'epatite A per le quali il rischio di contrarre anche l'epatite B sia accresciuto dagli stretti contatti con la popolazione locale (lavoratori all'estero, missionari, operatori sanitari, volontari, coppie per adozioni internazionali);
3. persone a rischio per patologie o per comportamento:
 - cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive;
 - alcolismo cronico;
 - tossicodipendenti;
 - pazienti con coagulopatie tali da richiedere terapia a lungo termine con derivati di natura ematica, compresi i fattori della coagulazione concentrati;
 - uomini che fanno sesso con uomini;

4. persone a rischio per esposizione professionale
 - personale di laboratorio;
 - soggetti che lavorano a contatto con primati infettati dal virus dell'epatite A;
 - persone per le quali il medico competente ravvisi un rischio professionale per l'esposizione al virus dell'epatite A.
5. conviventi con soggetti affetti da entrambe le patologie.

Ciclo vaccinale

Tre dosi di vaccino per via intramuscolare nel deltoide ai tempi:

1^a dose: tempo 0;

2^a dose: dopo 1 mese dalla 1^a dose;

3^a dose: dopo 5 mesi dalla 2^a dose.

Ciclo accelerato

In circostanze eccezionali, in adulti che necessitino di una protezione rapida e quando non vi sia sufficiente tempo per permettere il completamento del ciclo di vaccinazione standard, può essere utilizzato un ciclo accelerato di tre dosi a 0, 7 e 21 giorni, con somministrazione di una quarta dose 12 mesi dopo la prima.

Il programma vaccinale deve essere rispettato e il ciclo di vaccinazione primaria, una volta iniziato, deve essere completato con lo stesso vaccino.

Età minima di somministrazione

Twinrix pediatrico è indicato per persone di età compresa tra 12 mesi e 15 anni; a partire da 16 anni di età deve essere usata la formulazione per adulti.

Risposta anticorpale e tempo di comparsa dell'immunità

Titoli anticorpali specifici verso l'epatite A sono presenti nel 94% dei vaccinati dopo un mese dalla prima dose e nel 100% dopo un mese dalla terza dose.

Titoli anticorpali specifici verso l'epatite B sono presenti nel 70% dei vaccinati dopo un mese dalla prima dose e nel 99% dopo un mese dalla terza.

Molti studi indicano che la risposta anticorpale al vaccino combinato A+B è superiore a quelle indotte dalla somministrazione separata dei due vaccini.

Nelle persone anziane l'immunogenicità del vaccino rimane però notevolmente ridotta.

Durata dell'immunità

Almeno 20 anni dopo il completamento del ciclo vaccinale.

Effetti collaterali

Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono:

- *molto comuni*: rossore, gonfiore e dolore nella sede di iniezione, stanchezza;
- *comuni*: mal di testa, nausea, malessere;
- *non comuni*: febbre e vomito;
- *molto rare*: reazioni allergiche, sintomi influenzali, disturbi neurologici, svenimenti, sintomi gastrointestinali, alterazioni ematologiche, ingrossamento delle linfoghiandole.

Controindicazioni

- Malattie febbrili in atto;
- allergie ai componenti del vaccino.

Precauzioni

In caso di gravidanza è consigliabile rinviare la vaccinazione.

Concomitanza con altre vaccinazioni

Non si prevedono reazioni avverse con la contemporanea somministrazione di altri vaccini qualora vengano somministrati in siti anatomici diversi.

Pagamento

Si applica normalmente la tariffa prevista dal tariffario aziendale.

La vaccinazione è gratuita per: persone a rischio per patologie o per comportamento; persone a rischio per esposizione professionale; conviventi con soggetti affetti da entrambe le patologie.

E' prevista la gratuità totale, ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 27 settembre 2006,

per le seguenti categorie che rientrano nella definizione di “viaggiatori impegnati in progetti di cooperazione umanitaria”:

- religiosi inviati dal proprio Ordine in missioni all'estero;
- militari inviati dal Ministero della Difesa “in missioni di pace” all'estero;
- operatori dipendenti o volontari appartenenti ad organizzazioni laiche o religiose, inviati all'estero con mansioni sanitarie o non sanitarie in progetti di cooperazione umanitaria;
- coppie dirette all'estero per adozioni internazionali (compresi eventuali figli minorenni che li accompagnano nel viaggio).

I vaccinandati devono documentare la loro appartenenza ad una delle categorie sopra specificate presentando una lettera dell'Organizzazione, Ente o Associazione, oppure, qualora ne siano sprovvisti, compilando un modulo di autodichiarazione.