

Protocolli di analgesia alla dimissione DH

**Procedura Aziendale
P116 AUSLBO
Allegato 4**

PROTOCOLLI ANALGESIA POST OPERATORIA in regime di Day Surgery

PROTOCOLLO	INTERVENTO	PRESCRIZIONE POST OPERATORIA	PRESCRIZIONE A DOMICILIO Specificare se per 24-48 h	RESCUE NRS>3
DH: orari fissi dolore lieve NRS 1-3	Chirurgia: ernia inguinale, ombelicale o laparoceli di piccole dimensioni, cisti pilonidali e sacrococcigee; safenectomia, nodulectomie mammarie	Perfalgan 1 gr ev ± Ketoprofene/Ketorolac ev In SF 100 ml	Paracetamolo cpr 500-1000 mg x 3 /die	Ibuprofene cpr 600 mg oppure Ketoprofene cpr 100/200 mg oppure Ketorolac 15-20 gtt
DH: orari fissi dolore moderato NRS 4-6	Urologia: idrocelectomia, varicocelectomia, DTC, orchipessi. Ortopedia: chirurgia della mano, neurolisi, raffe tendinee, artroscopia ginocchio e caviglia, Ginecologia: Isteroscopia operativa, conizzazione, cerchiaggio uterino, revisione di cavità, videolaparoscopia diagnostica o operativa Otorinolaringoiatria: polipectomia fosse nasali asportazione di neoformazioni	Perfalgan 1 gr ev ± Ketoprofene /Ketorolac ev In SF 100 ml	Paracetamolo – Codeina cpr x 3/die Oppure Paracetamolo cpr 1 gr x 2 + Tramadolo gtt 15-30 x 3/die	Ibuprofene cpr 600 mg oppure Ketoprofene cpr 100/200 mg oppure Ketorolac 15-20 gtt
DH: orari fissi dolore moderato-severo	Chirurgia: proctologia (emorroidi, ragadi, fistole), quadrantomie Urologia: uretrotomia	Perfalgan ev + Tramadolo ev ± Ketoprofene /Ketorolac ev	Paracetamolo – Codeina cpr x 4/die Oppure Tramadolo SR cpr 100 mg x 2/die	Ibuprofene cpr 600 mg/ Ketoprofene cpr 100/200 mg oppure

Protocolli di analgesia alla dimissione DH

**Procedura Aziendale
P116 AUSLBO
Allegato 4**

NRS 4-10	endoscopica, Ortopedia: Chirurgia del piede: correzione alluce valgo o altri segmenti ossei	Perfalgan ev + Morfina ev ± Ketoprofene /Ketorolac ev	+ Paracetamolo cpr 1 gr x 2 Oxycontin cpr 5-10 mg x 2/die + Paracetamolo cpr 1 gr x 2	Ketorolac 15-20 gtt Ibuprofene cpr 600 mg/ Ketoprofene cpr 100/200 mg oppure Ketorolac 15-20 gtt
	Chirurgia spalla: (Acromionplastica endoscopica) Rimozione mezzi di sintesi	Chirurgia ortopedica: Infusione continua perinervosa AL	Infusione continua con elastomero perinervosa AL (con istruzioni)	Paracetamolo cpr 1 gr oppure Ibuprofene cpr 600 mg/ Ketoprofene cpr 100/200 mg oppure Ketorolac 15-20 gtt