

Nursing FAQs

(frequently asked questions)

About "Scabbia"

Che cos'è la Scabbia?

È una malattia contagiosa provocata da un acaro (*Sarcoptes scabiei*) che si insinua nell'epidermide e depone le uova, provocando prurito intenso ed eruzioni cutanee.

Perché la scabbia è un problema id Sanità Pubblica?

Perché è una malattia molto diffusa e, negli ultimi anni, sono notevolmente aumentati i casi segnalati dalle Aziende Sanitarie. La patologia, frequentemente, genera casi secondari e può comportare recidive se non trattata correttamente.

Che cos'è la Scabbia Norvegese?

È una forma clinica grave di malattia detta anche "scabbia crostosa" che può presentarsi in soggetti defedati o affetti da deficit immunologici. Questa forma si presenta con lesioni ulcerate o crostose e un numero elevato di acari.

Come si trasmette il microrganismo?

Per **contatto diretto** con persona infestata. I contatti devono essere continuativi e molto stretti (es. in famiglia, istituti di lunga degenza, strutture per l'infanzia, caserme, istituti di detenzione). Meno frequente è la trasmissione per contatto indiretto (es. uso comune di biancheria da letto, vestiti o asciugamani), ma può essere importante per soggetti affetti da scabbia crostosa.

Quali sono i sintomi?

Prurito particolarmente intenso durante la notte. Il grattamento può causare lesioni e graffi che si possono infettare. I sintomi si manifestano dopo 2-4 settimane dal contagio. La **diagnosi** si basa sul riconoscimento clinico delle caratteristiche tipiche dell'infestazione.

Quali sono le zone del corpo maggiormente interessate?

Le zone dove più spesso compaiono le lesioni sono: gli spazi tra le dita delle mani, i polsi, i gomiti, le ascelle, intorno alla vita (nei bambini intorno all'ombelico), le cosce, i genitali nell'uomo e le regioni inferiori dei glutei o le areole dei capezzoli nella donna. Nel bambino più piccolo anche la testa, il collo, il palmo delle mani e le piante dei piedi.

Come si tratta la biancheria personale del paziente?

I vestiti e la biancheria personale del paziente possono essere lavati in lavatrice ad una temperatura $\geq 60^{\circ}\text{C}$. Se non possibile, mantenerli in un sacco chiuso per 7 giorni, dopodiché possono essere lavati alla temperatura richiesta.

Quali misure di prevenzione devono essere adottate?

Precauzioni da contatto in aggiunta alle standard. L'isolamento può essere interrotto dopo 24 ore dall'inizio della terapia efficace.

Qual è la terapia della scabbia?

La terapia può essere per via generale (es. Ivermectina compresse) e/o per via locale (es. Permetrina crema, benzile benzoato crema/emulsione). L'erogazione di tali farmaci a tutti i cittadini residenti e ai contatti stretti è gratuita.

Gli operatori sanitari possono usufruire gratuitamente dei farmaci contro la scabbia?

Per l'operatore con diagnosi di scabbia o contatto stretto, la Medicina Preventiva farà richiesta alla Farmacia Ospedaliera attraverso apposito modulo e fornirà i farmaci necessari a terminare l'intero ciclo terapeutico.