

**Analisi dei ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Periodo 2000-2019**

*Tab.1 Ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2019*

Tab.2 Ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna - Periodo 2000-2019

*Tab.3 Caratteristiche dei ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2019*

*Tab.4 Soggetti ricoverati per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2019*

*Tab.5 Soggetti ricoverati per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2019*

Tab.1 Ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2019

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	316		295		272		254		245		219		194		190		169		104	
Dipendenza da allucinogeni	4	1.3	3	1.0	2	0.7		0.0	1	0.4	2	0.9	2	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9
Dipendenza da amfetamine	3	0.9	0	-	1	0.4	0	-	0	-	1	0.5	2	1.0	1	0.5	1	0.6	1	1.0
Dipendenza da barbiturici	8	2.5	10	3.4	4	1.5	10	3.9	9	3.7	10	4.6	9	4.6	6	3.2	11	6.5	5	4.8
Dipendenza da cannabinoidi	6	1.9	5	1.7	10	3.7	9	3.5	6	2.4	15	6.8	9	4.6	21	11.1	11	6.5	2	1.9
Dipendenza da cocaina	24	7.6	20	6.8	23	8.5	21	8.3	26	10.6	19	8.7	12	6.2	18	9.5	18	10.7	13	12.5
Dipendenza da oppioidi	190	60.1	180	61.0	142	52.2	118	46.5	184	75.1	154	70.3	137	70.6	123	64.7	103	60.9	60	57.7
Altra dipendenza da droga	29	9.2	25	8.5	24	8.8	21	8.3	25	10.2	26	11.9	21	10.8	20	10.5	20	11.8	25	24.0
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	52	16.5	52	17.6	66	24.3	75	29.5	90	36.7	87	39.7	55	28.4	40	21.1	37	21.9	15	14.4
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abuso di droghe senza dipendenza	79		80		89		95		106		146		210		206		181		160	
Abuso di allucinogeni	3	3.8	3	3.8	1	1.1	3	3.2	1	0.9	1	0.7	0	-	1	0.5	1	0.6	1	0.6
Abuso di amfetamine	1	1.3	0	-	2	2.2	4	4.2	0	-	3	2.1	1	0.5	4	1.9	1	0.6	0	0.0
Abuso di antidepressivi	2	2.5	2	2.5	2	2.2	1	1.1	1	0.9	3	2.1	9	4.3	4	1.9	5	2.8	2	1.3
Abuso di barbiturici	4	5.1	12	15.0	12	13.5	6	6.3	17	16.0	20	13.7	59	28.1	28	13.6	30	16.6	28	17.5
Abuso di cannabinoidi	9	11.4	12	15.0	13	14.6	17	17.9	14	13.2	26	17.8	28	13.3	28	13.6	14	7.7	20	12.5
Abuso di cocaina	8	10.1	9	11.3	14	15.7	19	20.0	25	23.6	24	16.4	23	11.0	40	19.4	32	17.7	14	8.8
Abuso di oppioidi	22	27.8	14	17.5	15	16.9	19	20.0	10	9.4	13	8.9	31	14.8	23	11.2	26	14.4	24	15.0
Altri abusi misti non specificati	30	38.0	28	35.0	30	33.7	26	27.4	44	41.5	65	44.5	68	32.4	85	41.3	78	43.1	75	46.9

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Psicosi indotte da droghe	44		42		25		37		29		32		29		24		17		28	
Sindrome astinenza	16	36.4	7	16.7	3	12.0	10	27.0	3	10.3	7	21.9	0	-	7	29.2	0	0.0	3	10.7
Intossicazione patologica	5	11.4	15	35.7	12	48.0	7	18.9	8	27.6	10	31.3	0	-	6	25.0	2	11.8	9	32.1
Disturbi psichici vari	23	52.3	20	47.6	10	40.0	20	54.1	18	62.1	15	46.9	0	-	3	12.5	15	88.2	16	57.1

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Avvelenamenti	56	15.1	40	10.6	18	6.0	21	7.1	29	9.0	23		24		23		11		138	
da oppiacei	25	44.6	19	47.5	7	38.9	8	38.1	11	37.9	8	38.1	10	41.7	7	30.4	9	81.8	14	10.1
da eroina	7	12.5	4	10.0	1	5.6	1	4.8	0	-	2	9.5	2	8.3	2	8.7	4	36.4	1	0.7
da metadone	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	1.4
da altre sostanze	24	42.9	17	42.5	10	55.6	12	57.1	18	62.1	13	61.9	12	50.0	8	34.8	0	0.0	121	87.7

Tab. 1 (continua dalla precedente)

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	101		102		99		91		106		90		75		116		103		106	
Dipendenza da allucinogeni	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	0	0.0
Dipendenza da amfetamine	1	1.0	0	-	2	2.0	4	4.4	0	0.0	3	3.3	1	1.3	0	0.0	2	1.9	1	0.9
Dipendenza da barbiturici	6	5.9	7	6.9	7	7.1	3	3.3	8	7.5	5	5.6	4	5.3	10	8.6	2	1.9	4	3.8
Dipendenza da cannabinoidi	1	1.0	2	2.0	5	5.1	13	14.3	7	6.6	5	5.6	6	8.0	11	9.5	9	8.7	9	8.5
Dipendenza da cocaina	10	9.9	13	12.7	10	10.1	19	20.9	11	10.4	18	20.0	18	24.0	28	24.1	28	27.2	33	31.1
Dipendenza da oppioidi	52	51.5	53	52.0	60	60.6	51	56.0	67	63.2	47	52.2	39	52.0	53	45.7	41	39.8	30	28.3
Altra dipendenza da droga	20	19.8	14	13.7	11	11.1	1	1.1	6	5.7	14	15.6	11	14.7	24	20.7	15	14.6	21	19.8
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	11	10.9	10	9.8	7	7.1	8	8.8	10	9.4	15	16.7	11	14.7	10	8.6	10	9.7	15	14.2
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	-	-	8	7.8	2	2.0	1	1.1	5	4.7	1	1.1	1	1.3	2	1.7	4	3.9	2	1.9

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abuso di droghe senza dipendenza	198		138		131		129		169		233		236		241		282		229	
Abuso di allucinogeni	0	-	2	1.4	2	1.5	0	0.0	3	1.8	5	2.1	1	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0
Abuso di amfetamine	3	1.5	1	0.7	1	0.8	4	3.1	1	0.6	9	3.9	4	1.7	2	0.8	5	1.8	2	0.9
Abuso di antidepressivi	3	1.5	5	3.6	13	9.9	7	5.4	1	0.6	7	3.0	3	1.3	8	3.3	8	2.8	2	0.9
Abuso di barbiturici	19	9.6	11	8.0	21	16.0	18	14.0	32	18.9	37	15.9	36	15.3	36	14.9	31	11.0	19	8.3
Abuso di cannabinoidi	22	11.1	22	15.9	17	13.0	39	30.2	38	22.5	50	21.5	56	23.7	55	22.8	73	25.9	57	24.9
Abuso di cocaina	21	10.6	21	15.2	21	16.0	21	16.3	32	18.9	39	16.7	70	29.7	82	34.0	88	31.2	77	33.6
Abuso di oppioidi	29	14.6	20	14.5	25	19.1	14	10.9	28	16.6	42	18.0	35	14.8	28	11.6	26	9.2	29	12.7
Altri abusi misti non specificati	90	45.5	61	44.2	37	28.2	36	27.9	50	29.6	78	33.5	69	29.2	63	26.1	80	28.4	65	28.4

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Psicosi indotte da droghe	34		34		33		34		43		53		56		64		69		72	
Sindrome astinenza	4	11.8	3	8.8	6	18.2	5	14.7	3	7.0	3	5.7	5	8.9	9	14.1	2	2.9	7	9.7
Intossicazione patologica	13	38.2	16	47.1	10	30.3	7	20.6	16	37.2	12	22.6	14	25.0	19	29.7	16	23.2	15	20.8
Disturbi psichici vari	17	50.0	15	44.1	17	51.5	22	64.7	24	55.8	38	71.7	39	69.6	36	56.3	52	75.4	50	69.4

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Avvelenamenti	112		140		127		89		27		72		86		66		66		66	
da oppiacei	7	6.3	15	10.7	21	16.5	11	12.4	17	63.0	8	11.1	10	11.6	12	18.2	15	22.7	7	10.6
da eroina	1	0.9	1	0.7	3	2.4	2	2.2	1	3.7	1	1.4	1	1.2	1	1.5	2	3.0	0	0.0
da metadone	0	-	1	0.7	1	0.8	1	1.1	0	0.0	2	2.8	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
da altre sostanze	105	93.8	126	90.0	106	83.5	77	86.5	12	44.4	64	88.9	73	84.9	55	83.3	54	81.8	60	90.9

Tab.2 Ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna. Periodo 2000-2019

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale ricoveri	498		463		418		415		436		444		470		446		409		467	
M	337	67.7	298	64.4	252	60.3	281	67.7	292	67.0	292	65.8	294	62.6	277	62.1	234	57.2	217	46.5
F	161	32.3	163	35.2	166	39.7	134	32.3	144	33.0	152	34.2	176	37.4	169	37.9	175	42.8	250	53.5
italiani	437	87.8	409	88.3	368	88.0	376	90.6	400	91.7	401	90.3	436	92.8	402	90.1	363	88.8	416	89.1
non nativi	59	11.8	34	7.3	42	10.0	39	9.4	33	7.6	43	9.7	33	7.0	40	9.0	46	11.2	51	10.9
metropoli	390	78.3	364	78.6	329	78.7	322	77.6	357	81.9	389	87.6	394	83.8	378	84.8	356	87.0	427	91.4
fuori metropoli	107	21.5	99	21.4	85	20.3	90	21.7	78	17.9	54	12.2	75	16.0	67	15.0	51	12.5	40	8.6
età media													40.9		39.5		42.1		47.2	
	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale ricoveri	427		442		409		342		342		449		440		482		490		450	
M	236	55.3	219	49.5	214	52.3	206	60.2	250	73.1	293	65.3	286	65.0	299	62.0	318	64.9	282	62.7
F	191	44.7	223	50.5	195	47.7	136	39.8	92	26.9	156	34.7	154	35.0	183	38.0	172	35.1	168	37.3
italiani	375	87.8	382	86.4	346	84.6	290	84.8	297	86.8	375	83.5	379	86.1	412	85.5	384	78.4	347	77.1
non nativi	52	12.2	60	13.6	60	14.7	52	15.2	45	13.2	74	16.5	61	13.9	68	14.1	103	21.0	102	22.7
metropoli	372	87.1	391	88.5	370	90.5	304	88.9	305	89.2	400	89.1	397	90.2	438	90.9	443	90.4	409	90.9
fuori metropoli	55	12.9	51	11.5	38	9.3	38	11.1	37	10.8	48	10.7	41	9.3	43	8.9	45	9.2	40	8.9
età media	47.2		48.9		47.6		46.8		44.2		44.8		45.8		43.7		43.3		42.8	

Tab.3 Caratteristiche dei ricoveri ospedalieri per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
 Raffronti per sostanza esplicitamente specificata nelle diagnosi di dimissione - Periodo 2000-2019

giorni degenza	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	8140		7075		5289		5735		6438		6411		6041		6139		5367		7382	
Barbiturici	135	1.7	600	8.5	198	3.7	268	4.7	421	6.5	489	7.6	691	11.4	428	7.0	636	11.9	423	5.7
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.	
Cocaina	442	5.4	427	6.0	304	5.7	388	6.8	766	11.9	336	5.2	384	6.4	460	7.5	378	7.0	168	2.3
Cannabinoidi	168	2.1	478	6.8	472	8.9	595	10.4	182	2.8	326	5.1	511	8.5	708	11.5	236	4.4	432	5.9
Allucinogeni	37	0.5	37	0.5	14	0.3	33	0.6	11	0.2	49	0.8	65	1.1	12	0.2	7	0.1	31	0.4
Opioidi	5332	65.5	4281	60.5	3173	60.0	3236	56.4	3704	57.5	3226	50.3	2502	41.4	2078	33.8	2297	42.8	1207	16.4
Antidepressivi	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		1	0.0	12	0.2	143	2.4	35	0.6	34	0.6	258	3.5
Amfetamine	43	0.5		0.0	12	0.2	46	0.8		0.0	23	0.4	147	2.4	26	0.4	4	0.1	16	0.2

media	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto
media	16.3	1.3	15.3	1.2	12.7	1.4	13.8	1.4	14.8	1.3	14.4	1.3	12.9	1.3	13.7	1.2	13.1	1.3	15.8	1.2
Barbiturici	9.6	1.2	25.0	1.1	11.0	1.3	15.8	1.1	16.8	1.0	16.3	1.0	10.2	1.1	12.6	1.0	15.5	1.1	12.8	1.0
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.	
Cocaina	13.8	1.2	14.7	1.1	8.2	1.3	9.7	1.3	15.0	1.3	7.8	1.2	11.0	1.1	7.9	1.1	7.6	1.4	6.7	1.0
Cannabinoidi	11.2	1.1	28.1	1.2	20.5	1.2	22.9	1.1	9.1	1.1	8.0	1.5	13.8	1.4	14.4	1.1	9.4	1.0	20.6	1.0
Allucinogeni	3.7	1.3	6.2	1.0	4.7	1.0	6.6	1.3	5.5	1.0	16.3	1.0	32.5	1.0	12.0	1.0	7.0	1.0	10.3	1.0
Opioidi	18.4	1.4	16.2	1.2	13.8	1.3	14.7	1.4	18.1	1.0	18.5	1.2	14.9	1.3	14.2	1.2	17.8	1.4	15.3	1.2
Antidepressivi	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		1.0	1.0	4.0	1.0	15.9	1.1	8.8	1.0	6.8	1.0	6.6	1.0
Amfetamine	10.8	1.0				4.0		11.5			1.0	1.3	49.0	1.0	5.2	1.3	2.0	1.0	16.0	1.0

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

Tab. 3 (continua dalla precedente)

giorni degenza	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	4073		5161		3321		2775		3179		3486		3431		4188		4104		3853	
Barbiturici	434	10.7	224	4.3	232	7.0	142	5.1	371	11.7	332	9.5	305	8.9	422	10.1	347	8.5	258	6.3
Benzodiazepine*	223	5.5	403	7.8	277	8.3	246	8.9	8	0.3	264	7.6	240	7.0	216	5.2	222	5.4	286	7.0
Cocaina	227	5.6	308	6.0	264	7.9	272	9.8	321	10.1	380	10.9	687	20.0	1121	26.8	1021	24.9	810	19.7
Cannabinoidi	173	4.2	248	4.8	186	5.6	559	20.1	462	14.5	375	10.8	425	12.4	519	12.4	789	19.2	627	15.3
Allucinogeni	42	1.0	4	0.1	17	0.5	5	0.2	18	0.6	33	0.9	15	0.4	6	0.1	22	0.5	0	0.0
Opioidi	1286	31.6	1090	21.1	918	27.6	731	26.3	1295	40.7	992	28.5	833	24.3	1042	24.9	933	22.7	800	19.5
Antidepressivi	324	8.0	0	-	257	7.7	146	5.3	12	0.4	127	3.6	121	3.5	139	3.3	172	4.2	70	1.7
Amfetamine	11	0.3	8	0.2	20	0.6	20	0.7	24	0.8	67	1.9	36	1.0	6	0.1	31	0.8	37	0.9

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto	gg deg. ricovero	ricoveri per soggetto
media	9.5	1.2	11.7	1.2	8.1	1.3	8.1	1.2	9.3	1.0	7.8	1.3	7.8	1.3	8.7	1.2	8.4	1.3	8.6	1.3
Barbiturici	19.7	1.1	12.4	1.0	8.3	1.0	6.8	1.0	9.5	1.0	8.5	1.1	7.8	1.0	10.3	1.1	10.8	1.0	12.9	1.2
Benzodiazepine*	5.7	1.1	5.8	1.0	5.7	1.0	9.1	1.0	1.3	6.0	6.9	1.0	6.0	1.0	7.0	1.0	6.9	1.1	7.0	1.0
Cocaina	7.8	1.1	9.6	1.1	9.4	1.1	7.8	1.1	8.2	1.1	8.1	1.2	11.3	1.4	12.6	1.2	11.6	1.3	11.1	1.5
Cannabinoidi	9.6	1.3	11.8	1.1	8.9	1.0	11.4	1.1	11.0	1.1	8.7	1.3	9.0	1.3	10.2	1.3	11.8	1.2	11.2	1.2
Allucinogeni	42.0	1.0	1.3	1.0	5.7	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	6.6	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	7.3	1.0	-	-
Opioidi	17.1	1.1	13.0	1.1	10.8	1.1	10.4	1.1	12.1	1.1	11.4	1.3	10.5	1.1	12.3	1.1	11.4	1.1	15.1	1.4
Antidepressivi	4.7	1.0	-	-	8.9	1.1	5.4	1.0	12.0	18.0	4.9	1.0	3.9	1.1	6.6	1.0	7.2	1.0	3.7	1.1
Amfetamine	2.8	1.0	8.0	1.0	6.7	1.0	6.7	1.3	24.0	1.0	8.4	1.4	7.2	1.0	3.0	1.0	4.4	1.0	12.3	1.0

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

Tab.4 Soggetti ricoverati per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2019

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	370		378		302		295		323		353		369		385		304		395	
M	251	67.8	241	63.8	189	62.6	191	64.7	208	64.4	228	64.6	217	58.8	235	61.0	170	55.9	186	47.1
F	119	32.2	137	36.2	113	37.4	104	35.3	115	35.6	125	35.4	152	41.2	150	39.0	134	44.1	209	52.9
italiani	323	87.3	330	87.3	256	84.8	263	89.2	291	90.1	316	89.5	334	90.5	345	89.6	268	88.2	350	88.6
Non nativi	47	12.7	30	7.9	39	12.9	32	10.8	29	9.0	37	10.5	35	9.5	37	9.6	36	11.8	43	10.9
metropoli	281	75.9	295	78.0	226	74.8	223	75.6	261	80.8	304	86.1	299	81.0	326	84.7	253	83.2	355	89.9
fuori metropoli	89	24.1	83	22.0	76	25.2	72	24.4	61	18.9	48	13.6	69	18.7	58	15.1	50	16.4	40	10.1
età media	35.0		37.7		35.5		36.6		39.6		41.6		42.2		40.3		43.4		48.4	

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	361		393		365		310		295		335		343		397		380		344	
M	190	52.6	194	49.4	187	51.2	186	60.0	209	70.8	207	61.8	213	62.1	239	60.2	237	62.4	202	58.7
F	171	47.4	199	50.6	178	48.8	124	40.0	86	29.2	128	38.2	130	37.9	158	39.8	143	37.6	142	41.3
italiani	316	87.5	342	87.0	309	84.7	262	84.5	252	85.4	277	82.7	297	86.6	343	86.4	306	80.5	267	77.6
Non nativi	45	12.5	51	13.0	53	14.5	48	15.5	43	14.6	58	17.3	46	13.4	52	13.1	73	19.2	76	22.1
metropoli	307	85.0	344	87.5	326	89.3	275	88.7	259	87.8	294	87.8	300	87.5	359	90.4	338	88.9	307	89.2
fuori metropoli	54	15.0	49	12.5	38	10.4	35	11.3	36	12.2	40	11.9	41	12.0	37	9.3	40	10.5	36	10.5
età media	47.8		49.8		47.9		47.4		44.5		46.6		47.7		45.3		45.0		44.5	

Tab.5 Soggetti ricoverati per problemi dovuti all'uso di sostanze psicoattive nell'area metropolitana di Bologna
 Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2019

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	370		378		302		295		323		353		369		385		304		395	
Barbiturici	12	3.2	22	5.8	14	4.6	15	5.1	25	7.7	29	8.2	63	17.1	33	8.6	39	12.8	33	8.4
Benzodiazepine	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Cocaina	26	7.0	27	7.1	29	9.6	31	10.5	39	12.1	35	9.9	32	8.7	53	13.8	37	12.2	25	6.3
Cannabinoidi	14	3.8	14	3.7	19	6.3	23	7.8	18	5.6	27	7.6	27	7.3	44	11.4	25	8.2	21	5.3
Allucinogeni	8	2.2	6	1.6	3	1.0	4	1.4	2	0.6	3	0.8	2	0.5	1	0.3	1	0.3	3	0.8
Oppioidi	214	57.8	217	57.4	171	56.6	158	53.6	205	63.5	140	39.7	130	35.2	123	31.9	93	30.6	79	20.0
Antidepressivi	2	0.5	2	0.5	2	0.7	1	0.3	1	0.3	3	0.8	8	2.2	4	1.0	5	1.6	39	9.9
Amfetamine	4	1.1			3	1.0	4	1.4			3	0.8	3	0.8	4	1.0	2	0.7	1	0.3

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	361		393		365		310		295		335		343		397		380		344	
Barbiturici	22	6.1	18	4.6	28	7.7	21	6.8	39	13.2	39	11.6	39	11.4	41	10.3	32	8.4	20	5.8
Benzodiazepine	39	10.8	69	17.6	49	13.4	39	12.6	6	2.0	38	11.3	40	11.7	31	7.8	32	8.4	41	11.9
Cocaina	29	8.0	32	8.1	28	7.7	35	11.3	39	13.2	47	14.0	61	17.8	89	22.4	88	23.2	73	21.2
Cannabinoidi	18	5.0	21	5.3	21	5.8	49	15.8	42	14.2	43	12.8	47	13.7	51	12.8	67	17.6	56	16.3
Allucinogeni	1	0.3	3	0.8	3	0.8	1	0.3	3	1.0	5	1.5	3	0.9	1	0.3	3	0.8	0	0.0
Oppioidi	83	23.0	84	21.4	85	23.3	70	22.6	107	36.3	87	26.0	79	23.0	85	21.4	82	21.6	53	15.4
Antidepressivi	69	19.1	0	-	29	7.9	27	8.7	1	0.3	26	7.8	31	9.0	21	5.3	24	6.3	19	5.5
Amfetamine	4	1.1	1	0.3	3	0.8	3	1.0	1	0.3	8	2.4	5	1.5	2	0.5	7	1.8	3	0.9