

Analisi dei ricoveri ospedalieri in area metropolitana per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Periodo 2000-2010

*Tab.1 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2010*

Tab.2 Ricoveri effettuati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Periodo 2000-2010

*Tab.3 Caratteristiche dei ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2010*

*Tab.4 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2010*

*Tab.5 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2010*

**Tab. 1 - Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2010**

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Dipendenza da droghe | 316 | | 295 | | 272 | | 254 | | 245 | | 219 | |
| Dipendenza da allucinogeni | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 | | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 |
| Dipendenza da barbiturici | 8 | 2.5 | 10 | 3.4 | 4 | 1.5 | 10 | 3.9 | 9 | 3.7 | 10 | 4.6 |
| Dipendenza da cannabinoidi | 6 | 1.9 | 5 | 1.7 | 10 | 3.7 | 9 | 3.5 | 6 | 2.4 | 15 | 6.8 |
| Dipendenza da cocaina | 24 | 7.6 | 20 | 6.8 | 23 | 8.5 | 21 | 8.3 | 26 | 10.6 | 19 | 8.7 |
| Dipendenza da oppioidi | 190 | 60.1 | 180 | 61.0 | 142 | 52.2 | 118 | 46.5 | 184 | 75.1 | 154 | 70.3 |
| Altra dipendenza da droga | 29 | 9.2 | 25 | 8.5 | 24 | 8.8 | 21 | 8.3 | 25 | 10.2 | 26 | 11.9 |
| Combinazioni di sostanze oppioidi con altre dipendenza da amfetamine | 52 | 16.5 | 52 | 17.6 | 66 | 24.3 | 75 | 29.5 | 90 | 36.7 | 87 | 39.7 |
| | 3 | 0.9 | | 0.0 | 1 | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | 1 | 0.5 |

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Abuso di droghe senza dipendenza | 79 | | 80 | | 89 | | 95 | | 106 | | 146 | |
| Abuso di barbiturici | 4 | 5.1 | 12 | 15.0 | 12 | 13.5 | 6 | 6.3 | 17 | 16.0 | 20 | 13.7 |
| Abuso di cocaina | 8 | 10.1 | 9 | 11.3 | 14 | 15.7 | 19 | 20.0 | 25 | 23.6 | 24 | 16.4 |
| Abuso di antidepressivi | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 3 | 2.1 |
| Abuso di oppioidi | 22 | 27.8 | 14 | 17.5 | 15 | 16.9 | 19 | 20.0 | 10 | 9.4 | 13 | 8.9 |
| Abuso di allucinogeni | 3 | 3.8 | 3 | 3.8 | 1 | 1.1 | 3 | 3.2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 |
| Abuso di cannabinoidi | 9 | 11.4 | 12 | 15.0 | 13 | 14.6 | 17 | 17.9 | 14 | 13.2 | 26 | 17.8 |
| abuso di amfetamine | 1 | 1.3 | | 0.0 | 2 | 2.2 | 4 | 4.2 | | 0.0 | 3 | 2.1 |
| Altri abusi misti non specificati | 30 | 38.0 | 28 | 35.0 | 30 | 33.7 | 26 | 27.4 | 44 | 41.5 | 65 | 44.5 |

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Psicosi indotte da droghe | 44 | | 42 | | 25 | | 37 | | 29 | | 32 | |
| Sindrome astinenza | 16 | 36.4 | 7 | 16.7 | 3 | 12.0 | 10 | 27.0 | 3 | 10.3 | 7 | 21.9 |
| Intossicazione patologica | 5 | 11.4 | 15 | 35.7 | 12 | 48.0 | 7 | 18.9 | 8 | 27.6 | 10 | 31.3 |
| Disturbi psichici vari | 23 | 52.3 | 20 | 47.6 | 10 | 40.0 | 20 | 54.1 | 18 | 62.1 | 15 | 46.9 |

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Avvelenamenti | 56 | | 40 | | 18 | | 21 | | 29 | | 23 | |
| da oppioidi | 25 | 44.6 | 19 | 47.5 | 7 | 38.9 | 8 | 38.1 | 11 | 37.9 | 8 | 38.1 |
| da eroina | 7 | 12.5 | 4 | 10.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.8 | | 0.0 | 2 | 9.5 |
| da metadone | | | | | | | | | | | | |
| da altre sostanze | 24 | 42.9 | 17 | 42.5 | 10 | 55.6 | 12 | 57.1 | 18 | 62.1 | 13 | 61.9 |

Tab. 1 (continua dalla precedente)

| | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Dipendenza da droghe | 194 | | 190 | | 169 | | 104 | | 101 | |
| Dipendenza da allucinogeni | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.9 | 1 | 1.0 |
| Dipendenza da barbiturici | 9 | 4.6 | 6 | 3.2 | 11 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6 | 5.9 |
| Dipendenza da cannabinoidi | 9 | 4.6 | 21 | 11.1 | 11 | 6.5 | 2 | 1.9 | 1 | 1.0 |
| Dipendenza da cocaina | 12 | 6.2 | 18 | 9.5 | 18 | 10.7 | 13 | 12.5 | 10 | 9.9 |
| Dipendenza da oppioidi | 137 | 70.6 | 123 | 64.7 | 103 | 60.9 | 60 | 57.7 | 52 | 51.5 |
| Altra dipendenza da droga | 21 | 10.8 | 20 | 10.5 | 20 | 11.8 | 25 | 24.0 | 20 | 19.8 |
| Combinazioni di sostanze oppioidi con altre dipendenza da amfetamine | 55 | 28.4 | 40 | 21.1 | 37 | 21.9 | 15 | 14.4 | 11 | 10.9 |
| | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |

| | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Abuso di droghe senza dipendenza | 210 | | 206 | | 181 | | 160 | | 198 | |
| Abuso di barbiturici | 59 | 28.1 | 28 | 13.6 | 30 | 16.6 | 28 | 17.5 | 19 | 9.6 |
| Abuso di cocaina | 23 | 11.0 | 40 | 19.4 | 32 | 17.7 | 14 | 8.8 | 21 | 10.6 |
| Abuso di antidepressivi | 9 | 4.3 | 4 | 1.9 | 5 | 2.8 | 2 | 1.3 | 3 | 1.5 |
| Abuso di oppioidi | 31 | 14.8 | 23 | 11.2 | 26 | 14.4 | 24 | 15.0 | 29 | 14.6 |
| Abuso di allucinogeni | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| Abuso di cannabinoidi | 28 | 13.3 | 28 | 13.6 | 14 | 7.7 | 20 | 12.5 | 22 | 11.1 |
| abuso di amfetamine | 1 | 0.5 | 4 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 |
| Altri abusi misti non specificati | 68 | 32.4 | 85 | 41.3 | 78 | 43.1 | 75 | 46.9 | 90 | 45.5 |

| | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|----------------------------------|-----------|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Psicosi indotte da droghe | 29 | | 24 | | 17 | | 28 | | 34 | |
| Sindrome astinenza | 0 | 0.0 | 7 | 29.2 | 0 | 0.0 | 3 | 10.7 | 4 | 11.8 |
| Intossicazione patologica | 0 | 0.0 | 6 | 25.0 | 2 | 11.8 | 9 | 32.1 | 13 | 38.2 |
| Disturbi psichici vari | 0 | 0.0 | 3 | 12.5 | 15 | 88.2 | 16 | 57.1 | 17 | 50.0 |

| | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|----------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Avvelenamenti | 24 | | 23 | | 11 | | 138 | | 112 | |
| da oppioidi | 10 | 41.7 | 7 | 30.4 | 9 | 81.8 | 14 | 10.1 | 7 | 6.3 |
| da eroina | 2 | 8.3 | 2 | 8.7 | 4 | 36.4 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 |
| da metadone | | | | | | | 2 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| da altre sostanze | 12 | 50.0 | 8 | 34.8 | 0 | 0.0 | 121 | 87.7 | 105 | 93.8 |

**Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Periodo 2000-2010**

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Totale ricoveri | 498 | | 463 | | 418 | | 415 | | 436 | | 444 | | 470 | | 446 | | 409 | | 467 | | 427 | |
| M | 337 | 67.7 | 298 | 64.4 | 252 | 60.3 | 281 | 67.7 | 292 | 67.0 | 292 | 65.8 | 294 | 62.6 | 277 | 62.1 | 234 | 57.2 | 217 | 46.5 | 236 | 55.3 |
| F | 161 | 32.3 | 163 | 35.2 | 166 | 39.7 | 134 | 32.3 | 144 | 33.0 | 152 | 34.2 | 176 | 37.4 | 169 | 37.9 | 175 | 42.8 | 250 | 53.5 | 191 | 44.7 |
| italiani | 437 | 87.8 | 409 | 88.3 | 368 | 88.0 | 376 | 90.6 | 400 | 91.7 | 401 | 90.3 | 436 | 92.8 | 402 | 90.1 | 363 | 88.8 | 416 | 89.1 | 375 | 87.8 |
| stranieri | 59 | 11.8 | 34 | 7.3 | 42 | 10.0 | 39 | 9.4 | 33 | 7.6 | 43 | 9.7 | 33 | 7.0 | 40 | 9.0 | 46 | 11.2 | 51 | 10.9 | 52 | 12.2 |
| metropoli | 390 | 78.3 | 364 | 78.6 | 329 | 78.7 | 322 | 77.6 | 357 | 81.9 | 389 | 87.6 | 394 | 83.8 | 378 | 84.8 | 356 | 87.0 | 427 | 91.4 | 372 | 87.1 |
| fuori metropoli | 107 | 21.5 | 99 | 21.4 | 85 | 20.3 | 90 | 21.7 | 78 | 17.9 | 54 | 12.2 | 75 | 16.0 | 67 | 15.0 | 51 | 12.5 | 40 | 8.6 | 55 | 12.9 |
| s.f.d. | 1 | 0.2 | | 0.0 | 4 | | 3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | | | | | | | | |
| età media | | | | | | | | | | | | | 40.9 | | 39.5 | | 42.1 | | 47.2 | | 47.2 | |

Tab. 3 - Caratteristiche dei ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti. Raffronti per sostanza esplicitamente specificata nelle diagnosi di dimissione

| giorni degenza | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | gg deg | % | gg deg | % | gg deg | % | gg deg | % | gg deg | % | gg deg | % |
| totale | 8140 | | 7075 | | 5289 | | 5735 | | 6438 | | 6411 | |
| Barbiturici | 135 | 1.7 | 600 | 8.5 | 198 | 3.7 | 268 | 4.7 | 421 | 6.5 | 489 | 7.6 |
| Benzodiazepine* | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | |
| Cocaina | 442 | 5.4 | 427 | 6.0 | 304 | 5.7 | 388 | 6.8 | 766 | 11.9 | 336 | 5.2 |
| Cannabinoidi | 168 | 2.1 | 478 | 6.8 | 472 | 8.9 | 595 | 10.4 | 182 | 2.8 | 326 | 5.1 |
| Allucinogeni | 37 | 0.5 | 37 | 0.5 | 14 | 0.3 | 33 | 0.6 | 11 | 0.2 | 49 | 0.8 |
| Oppiodi | 5332 | 65.5 | 4281 | 60.5 | 3173 | 60.0 | 3236 | 56.4 | 3704 | 57.5 | 3226 | 50.3 |
| Antidepressivi | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | | 1 | 0.0 | 12 | 0.2 |
| Amfetamine | 43 | 0.5 | | 0.0 | 12 | 0.2 | 46 | 0.8 | | 0.0 | 23 | 0.4 |

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto |
| media | 16.3 | 1.3 | 15.3 | 1.2 | 12.7 | 1.4 | 13.8 | 1.4 | 14.8 | 1.3 | 14.4 | 1.3 |
| Barbiturici | 9.6 | 1.2 | 25.0 | 1.1 | 11.0 | 1.3 | 15.8 | 1.1 | 16.8 | 1.0 | 16.3 | 1.0 |
| Benzodiazepine* | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | |
| Cocaina | 13.8 | 1.2 | 14.7 | 1.1 | 8.2 | 1.3 | 9.7 | 1.3 | 15.0 | 1.3 | 7.8 | 1.2 |
| Cannabinoidi | 11.2 | 1.1 | 28.1 | 1.2 | 20.5 | 1.2 | 22.9 | 1.1 | 9.1 | 1.1 | 8.0 | 1.5 |
| Allucinogeni | 3.7 | 1.3 | 6.2 | 1.0 | 4.7 | 1.0 | 6.6 | 1.3 | 5.5 | 1.0 | 16.3 | 1.0 |
| Oppiodi | 18.4 | 1.4 | 16.2 | 1.2 | 13.8 | 1.3 | 14.7 | 1.4 | 18.1 | 1.0 | 18.5 | 1.2 |
| Antidepressivi | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| Amfetamine | 10.8 | 1.0 | | | | 4.0 | | 11.5 | | | 1.0 | 1.3 |

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

Tab. 3 (continua dalla precedente)

| giorni degenza | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | |
|-----------------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---|
| | totale | gg deg | % | gg deg | % | gg deg | % | gg deg | % | gg deg | % |
| | 6041 | | | 6139 | | 5367 | | 7382 | | 4073 | |
| Barbiturici | 691 | 11.4 | 428 | 7.0 | 636 | 11.9 | 423 | 5.7 | 434 | 10.7 | |
| Benzodiazepine* | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | | 223 | 5.5 | |
| Cocaina | 384 | 6.4 | 460 | 7.5 | 378 | 7.0 | 168 | 2.3 | 227 | 5.6 | |
| Cannabinoidi | 511 | 8.5 | 708 | 11.5 | 236 | 4.4 | 432 | 5.9 | 173 | 4.2 | |
| Allucinogeni | 65 | 1.1 | 12 | 0.2 | 7 | 0.1 | 31 | 0.4 | 42 | 1.0 | |
| Oppioidi | 2502 | 41.4 | 2078 | 33.8 | 2297 | 42.8 | 1207 | 16.4 | 1286 | 31.6 | |
| Antidepressivi | 143 | 2.4 | 35 | 0.6 | 34 | 0.6 | 258 | 3.5 | 324 | 8.0 | |
| Amfetamine | 147 | 2.4 | 26 | 0.4 | 4 | 0.1 | 16 | 0.2 | 11 | 0.3 | |

| | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto | deg. media ricovero | ricoveri per soggetto |
| media | 12.9 | 1.3 | 13.7 | 1.2 | 13.1 | 1.3 | 15.8 | 1.2 | 9.5 | 1.2 |
| Barbiturici | 10.2 | 1.1 | 12.6 | 1.0 | 15.5 | 1.1 | 12.8 | 1.0 | 19.7 | 1.1 |
| Benzodiazepine* | N.R. | | N.R. | | N.R. | | N.R. | | 5.7 | 1.1 |
| Cocaina | 11.0 | 1.1 | 7.9 | 1.1 | 7.6 | 1.4 | 6.7 | 1.0 | 7.8 | 1.1 |
| Cannabinoidi | 13.8 | 1.4 | 14.4 | 1.1 | 9.4 | 1.0 | 20.6 | 1.0 | 9.6 | 1.3 |
| Allucinogeni | 32.5 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 10.3 | 1.0 | 42.0 | 1.0 |
| Oppioidi | 14.9 | 1.3 | 14.2 | 1.2 | 17.8 | 1.4 | 15.3 | 1.2 | 17.1 | 1.1 |
| Antidepressivi | 15.9 | 1.1 | 8.8 | 1.0 | 6.8 | 1.0 | 6.6 | 1.0 | 4.7 | 1.0 |
| Amfetamine | 49.0 | 1.0 | 5.2 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 2.8 | 1.0 |

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

Tab. 4 - Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2010

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Totale soggetti | 370 | | 378 | | 302 | | 295 | | 323 | | 353 | | 369 | | 385 | | 304 | | 395 | | 361 | |
| M | 251 | 67.8 | 241 | 63.8 | 189 | 62.6 | 191 | 64.7 | 208 | 64.4 | 228 | 64.6 | 217 | 58.8 | 235 | 61.0 | 170 | 55.9 | 186 | 47.1 | 190 | 52.6 |
| F | 119 | 32.2 | 137 | 36.2 | 113 | 37.4 | 104 | 35.3 | 115 | 35.6 | 125 | 35.4 | 152 | 41.2 | 150 | 39.0 | 134 | 44.1 | 209 | 52.9 | 171 | 47.4 |
| italiani | 323 | 87.3 | 330 | 87.3 | 256 | 84.8 | 263 | 89.2 | 291 | 90.1 | 316 | 89.5 | 334 | 90.5 | 345 | 89.6 | 268 | 88.2 | 350 | 88.6 | 316 | 87.5 |
| stranieri | 47 | 12.7 | 30 | 7.9 | 39 | 12.9 | 32 | 10.8 | 29 | 9.0 | 37 | 10.5 | 35 | 9.5 | 37 | 9.6 | 36 | 11.8 | 43 | 10.9 | 45 | 12.5 |
| metropoli | 281 | 75.9 | 295 | 78.0 | 226 | 74.8 | 223 | 75.6 | 261 | 80.8 | 304 | 86.1 | 299 | 81.0 | 326 | 84.7 | 253 | 83.2 | 355 | 89.9 | 307 | 85.0 |
| fuori metropoli | 89 | 24.1 | 83 | 22.0 | 76 | 25.2 | 72 | 24.4 | 61 | 18.9 | 48 | 13.6 | 69 | 18.7 | 58 | 15.1 | 50 | 16.4 | 40 | 10.1 | 54 | 15.0 |
| età media | 35.0 | | 37.7 | | 35.5 | | 36.6 | | 39.6 | | 41.6 | | 42.2 | | 40.3 | | 43.4 | | 48.4 | | 47.8 | |

Tab. 5 - Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti. Raffronti per sostanza esplicitamente specificata nelle diagnosi di dimissione - Periodo 2000-2010

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Totale soggetti | 370 | | 378 | | 302 | | 295 | | 323 | | 353 | | 369 | | 385 | | 304 | | 395 | | 361 | |
| Barbiturici | 12 | 3.2 | 22 | 5.8 | 14 | 4.6 | 15 | 5.1 | 25 | 7.7 | 29 | 8.2 | 63 | 17.1 | 33 | 8.6 | 39 | 12.8 | 33 | 8.4 | 22 | 6.1 |
| Benzodiazepine | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 39 | 10.8 |
| Cocaina | 26 | 7.0 | 27 | 7.1 | 29 | 9.6 | 31 | 10.5 | 39 | 12.1 | 35 | 9.9 | 32 | 8.7 | 53 | 13.8 | 37 | 12.2 | 25 | 6.3 | 29 | 8.0 |
| Cannabinoidi | 14 | 3.8 | 14 | 3.7 | 19 | 6.3 | 23 | 7.8 | 18 | 5.6 | 27 | 7.6 | 27 | 7.3 | 44 | 11.4 | 25 | 8.2 | 21 | 5.3 | 18 | 5.0 |
| Allucinogeni | 8 | 2.2 | 6 | 1.6 | 3 | 1.0 | 4 | 1.4 | 2 | 0.6 | 3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 1 | 0.3 |
| Oppioidi | 214 | 57.8 | 217 | 57.4 | 171 | 56.6 | 158 | 53.6 | 205 | 63.5 | 140 | 39.7 | 130 | 35.2 | 123 | 31.9 | 93 | 30.6 | 79 | 20.0 | 83 | 23.0 |
| Antidepressivi | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 8 | 2.2 | 4 | 1.0 | 5 | 1.6 | 39 | 9.9 | 69 | 19.1 |
| Amfetamine | 4 | 1.1 | | | 3 | 1.0 | 4 | 1.4 | | | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 4 | 1.0 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 |