

Analisi dei ricoveri ospedalieri in area metropolitana per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive - Periodo 2000-2014

*Tab.1 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2014*

Tab.2 Ricoveri effettuati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive - Periodo 2000-2014

*Tab.3 Caratteristiche dei ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2014*

*Tab.4 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2014*

*Tab.5 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2014*

**Tab. 1 - Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2014**

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	316		295		272		254		245		219	
Dipendenza da allucinogeni	4	1.3	3	1.0	2	0.7		0.0	1	0.4	2	0.9
Dipendenza da barbiturici	8	2.5	10	3.4	4	1.5	10	3.9	9	3.7	10	4.6
Dipendenza da cannabinoidi	6	1.9	5	1.7	10	3.7	9	3.5	6	2.4	15	6.8
Dipendenza da cocaina	24	7.6	20	6.8	23	8.5	21	8.3	26	10.6	19	8.7
Dipendenza da oppioidi	190	60.1	180	61.0	142	52.2	118	46.5	184	75.1	154	70.3
Altra dipendenza da droga	29	9.2	25	8.5	24	8.8	21	8.3	25	10.2	26	11.9
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	52	16.5	52	17.6	66	24.3	75	29.5	90	36.7	87	39.7
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dipendenza da amfetamine	3	0.9	0	-	1	0.4	0	-	0	-	1	0.5

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abuso di droghe senza dipendenza	79		80		89		95		106		146	
Abuso di barbiturici	4	5.1	12	15.0	12	13.5	6	6.3	17	16.0	20	13.7
Abuso di cocaina	8	10.1	9	11.3	14	15.7	19	20.0	25	23.6	24	16.4
Abuso di antidepressivi	2	2.5	2	2.5	2	2.2	1	1.1	1	0.9	3	2.1
Abuso di oppioidi	22	27.8	14	17.5	15	16.9	19	20.0	10	9.4	13	8.9
Abuso di allucinogeni	3	3.8	3	3.8	1	1.1	3	3.2	1	0.9	1	0.7
Abuso di cannabinoidi	9	11.4	12	15.0	13	14.6	17	17.9	14	13.2	26	17.8
Abuso di amfetamine	1	1.3	0	-	2	2.2	4	4.2	0	-	3	2.1
Altri abusi misti non specificati	30	38.0	28	35.0	30	33.7	26	27.4	44	41.5	65	44.5

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Psicosi indotte da droghe	44		42		25		37		29		32	
Sindrome astinenza	16	36.4	7	16.7	3	12.0	10	27.0	3	10.3	7	21.9
Intossicazione patologica	5	11.4	15	35.7	12	48.0	7	18.9	8	27.6	10	31.3
Disturbi psichici vari	23	52.3	20	47.6	10	40.0	20	54.1	18	62.1	15	46.9

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Avvelenamenti	56		40		18		21		29		23	
da oppiacei	25	44.6	19	47.5	7	38.9	8	38.1	11	37.9	8	38.1
da eroina	7	12.5	4	10.0	1	5.6	1	4.8	0	-	2	9.5
da metadone	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
da altre sostanze	24	42.9	17	42.5	10	55.6	12	57.1	18	62.1	13	61.9

Tab. 1 (continua dalla precedente)

	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	194		190		169		104		101		102		99		91		106	
Dipendenza da allucinogeni	2	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0
Dipendenza da barbiturici	9	4.6	6	3.2	11	6.5	5	4.8	6	5.9	7	6.9	7	7.1	3	3.3	8	7.5
Dipendenza da cannabinoidi	9	4.6	21	11.1	11	6.5	2	1.9	1	1.0	2	2.0	5	5.1	13	14.3	7	6.6
Dipendenza da cocaina	12	6.2	18	9.5	18	10.7	13	12.5	10	9.9	13	12.7	10	10.1	19	20.9	11	10.4
Dipendenza da oppioidi	137	70.6	123	64.7	103	60.9	60	57.7	52	51.5	53	52.0	60	60.6	51	56.0	67	63.2
Altra dipendenza da droga	21	10.8	20	10.5	20	11.8	25	24.0	20	19.8	14	13.7	11	11.1	1	1.1	6	5.7
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	55	28.4	40	21.1	37	21.9	15	14.4	11	10.9	10	9.8	7	7.1	8	8.8	10	9.4
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7.8	2	2.0	1	1.1	5	4.7
Dipendenza da amfetamine	2	1.0	1	0.5	1	0.6	1	1.0	1	1.0	0	-	2	2.0	4	4.4	0	0.0

	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abuso di droghe senza dipendenza	210		206		181		160		198		138		131		129		169	
Abuso di barbiturici	59	28.1	28	13.6	30	16.6	28	17.5	19	9.6	11	8.0	21	16.0	18	14.0	32	18.9
Abuso di cocaina	23	11.0	40	19.4	32	17.7	14	8.8	21	10.6	21	15.2	21	16.0	21	16.3	32	18.9
Abuso di antidepressivi	9	4.3	4	1.9	5	2.8	2	1.3	3	1.5	5	3.6	13	9.9	7	5.4	1	0.6
Abuso di oppioidi	31	14.8	23	11.2	26	14.4	24	15.0	29	14.6	20	14.5	25	19.1	14	10.9	28	16.6
Abuso di allucinogeni	0	-	1	0.5	1	0.6	1	0.6	0	-	2	1.4	2	1.5	0	0.0	3	1.8
Abuso di cannabinoidi	28	13.3	28	13.6	14	7.7	20	12.5	22	11.1	22	15.9	17	13.0	39	30.2	38	22.5
Abuso di amfetamine	1	0.5	4	1.9	1	0.6	0	0.0	3	1.5	1	0.7	1	0.8	4	3.1	1	0.6
Altri abusi misti non specificati	68	32.4	85	41.3	78	43.1	75	46.9	90	45.5	61	44.2	37	28.2	36	27.9	50	29.6

	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Psicosi indotte da droghe	29		24		17		28		34		34		33		34		43	
Sindrome astinenza	0	-	7	29.2	0	0.0	3	10.7	4	11.8	3	8.8	6	18.2	5	14.7	3	8.8
Intossicazione patologica	0	-	6	25.0	2	11.8	9	32.1	13	38.2	16	47.1	10	30.3	7	20.6	16	47.1
Disturbi psichici vari	0	-	3	12.5	15	88.2	16	57.1	17	50.0	15	44.1	17	51.5	22	64.7	24	70.6

	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Avvelenamenti	24		23		11		138		112		140		127		89		27	
da oppiacei	10	41.7	7	30.4	9	81.8	14	10.1	7	6.3	15	10.7	21	16.5	11	12.4	17	19.1
da eroina	2	8.3	2	8.7	4	36.4	1	0.7	1	0.9	1	0.7	3	2.4	2	2.2	1	1.1
da metadone	0	-	0	-	0	-	2	1.4	0	-	1	0.7	1	0.8	1	1.1	0	0.0
da altre sostanze	12	50.0	8	34.8	0	0.0	121	87.7	105	93.8	126	90.0	106	83.5	77	86.5	12	13.5

**Tab. 2 - Ricoveri effettuati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Periodo 2000-2014**

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Totale ricoveri	498		463		418		415		436		444		470		446		409		467		427		442		409		342		342	
M	337	67.7	298	64.4	252	60.3	281	67.7	292	67.0	292	65.8	294	62.6	277	62.1	234	57.2	217	46.5	236	55.3	219	51.3	214	50.1	206	60.2	250	73.1
F	161	32.3	163	35.2	166	39.7	134	32.3	144	33.0	152	34.2	176	37.4	169	37.9	175	42.8	250	53.5	191	44.7	223	52.2	195	45.7	136	39.8	92	26.9
italiani	437	87.8	409	88.3	368	88.0	376	90.6	400	91.7	401	90.3	436	92.8	402	90.1	363	88.8	416	89.1	375	87.8	382	89.5	346	81.0	290	84.8	297	86.8
Non nativi	59	11.8	34	7.3	42	10.0	39	9.4	33	7.6	43	9.7	33	7.0	40	9.0	46	11.2	51	10.9	52	12.2	60	14.1	60	14.1	52	15.2	45	13.2
metropoli	390	78.3	364	78.6	329	78.7	322	77.6	357	81.9	389	87.6	394	83.8	378	84.8	356	87.0	427	91.4	372	87.1	391	91.6	370	86.7	304	88.9	305	89.2
fuori metropoli	107	21.5	99	21.4	85	20.3	90	21.7	78	17.9	54	12.2	75	16.0	67	15.0	51	12.5	40	8.6	55	12.9	51	11.9	38	8.9	38	11.1	37	10.8
età media													40.9		39.5		42.1		47.2		47.2		48.9		47.6		46.8		44.2	

Tab. 3 - Caratteristiche dei ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive. Raffronti per sostanza esplicitamente specificata nelle diagnosi di dimissione - Periodo 2000-2014

giorni degenza	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	8140		7075		5289		5735		6438		6411		6041	
Barbiturici	135	1.7	600	8.5	198	3.7	268	4.7	421	6.5	489	7.6	691	11.4
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.	
Cocaina	442	5.4	427	6.0	304	5.7	388	6.8	766	11.9	336	5.2	384	6.4
Cannabinoidi	168	2.1	478	6.8	472	8.9	595	10.4	182	2.8	326	5.1	511	8.5
Allucinogeni	37	0.5	37	0.5	14	0.3	33	0.6	11	0.2	49	0.8	65	1.1
Oppioidi	5332	65.5	4281	60.5	3173	60.0	3236	56.4	3704	57.5	3226	50.3	2502	41.4
Antidepressivi	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		1	0.0	12	0.2	143	2.4
Amfetamine	43	0.5		0.0	12	0.2	46	0.8		0.0	23	0.4	147	2.4

media	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto
media	16.3	1.3	15.3	1.2	12.7	1.4	13.8	1.4	14.8	1.3	14.4	1.3	12.9	1.3
Barbiturici	9.6	1.2	25.0	1.1	11.0	1.3	15.8	1.1	16.8	1.0	16.3	1.0	10.2	1.1
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.	
Cocaina	13.8	1.2	14.7	1.1	8.2	1.3	9.7	1.3	15.0	1.3	7.8	1.2	11.0	1.1
Cannabinoidi	11.2	1.1	28.1	1.2	20.5	1.2	22.9	1.1	9.1	1.1	8.0	1.5	13.8	1.4
Allucinogeni	3.7	1.3	6.2	1.0	4.7	1.0	6.6	1.3	5.5	1.0	16.3	1.0	32.5	1.0
Oppioidi	18.4	1.4	16.2	1.2	13.8	1.3	14.7	1.4	18.1	1.0	18.5	1.2	14.9	1.3
Antidepressivi	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		1.0	1.0	4.0	1.0	15.9	1.1
Amfetamine	10.8	1.0				4.0		11.5			1.0	1.3	49.0	1.0

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

Tab. 3 (continua dalla precedente)

giorni degenza	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	6139		5367		7382		4073		5161		3321		2775		3179	
Barbiturici	428	7.0	636	11.9	423	5.7	434	10.7	224	4.3	232	7.0	142	5.1	371	13.4
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		223	5.5	403	7.8	277	8.3	246	8.9	8	0.3
Cocaina	460	7.5	378	7.0	168	2.3	227	5.6	308	6.0	264	7.9	272	9.8	321	11.6
Cannabinoidi	708	11.5	236	4.4	432	5.9	173	4.2	248	4.8	186	5.6	559	20.1	462	16.6
Allucinogeni	12	0.2	7	0.1	31	0.4	42	1.0	4	0.1	17	0.5	5	0.2	18	0.6
Oppioidi	2078	33.8	2297	42.8	1207	16.4	1286	31.6	1090	21.1	918	27.6	731	26.3	1295	46.7
Antidepressivi	35	0.6	34	0.6	258	3.5	324	8.0	0	-	257	7.7	146	5.3	12	0.4
Amfetamine	26	0.4	4	0.1	16	0.2	11	0.3	8	0.2	20	0.6	20	0.7	24	0.9

media	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto
media	13.7	1.2	13.1	1.3	15.8	1.2	9.5	1.2	11.7	1.1	8.1	1.1	8.1	1.1	9.3	1.2
Barbiturici	12.6	1.0	15.5	1.1	12.8	1.0	19.7	1.1	12.4	1.0	8.3	1.0	6.8	1.0	9.5	1.0
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		5.7	1.1	5.8	1.0	5.7	1.0	9.1	1.0	1.3	6.0
Cocaina	7.9	1.1	7.6	1.4	6.7	1.0	7.8	1.1	9.6	1.1	9.4	1.1	7.8	1.1	8.2	1.1
Cannabinoidi	14.4	1.1	9.4	1.0	20.6	1.0	9.6	1.3	11.8	1.1	8.9	1.0	11.4	1.1	11.0	1.1
Allucinogeni	12.0	1.0	7.0	1.0	10.3	1.0	42.0	1.0	1.3	1.0	5.7	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0
Oppioidi	14.2	1.2	17.8	1.4	15.3	1.2	17.1	1.1	13.0	1.1	10.8	1.1	10.4	1.1	12.1	1.1
Antidepressivi	8.8	1.0	6.8	1.0	6.6	1.0	4.7	1.0	-	-	8.9	1.1	5.4	1.0	12.0	18.0
Amfetamine	5.2	1.3	2.0	1.0	16.0	1.0	2.8	1.0	8.0	1.0	6.7	1.0	6.7	1.3	24.0	1.0

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

Tab. 4 - Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2014

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Totale soggetti	370		378		302		295		323		353		369		385		304		395		361		393		365		310		295	
M	251	67.8	241	63.8	189	62.6	191	64.7	208	64.4	228	64.6	217	58.8	235	61.0	170	55.9	186	47.1	190	52.6	194	49.4	187	51.2	186	60.0	209	67.4
F	119	32.2	137	36.2	113	37.4	104	35.3	115	35.6	125	35.4	152	41.2	150	39.0	134	44.1	209	52.9	171	47.4	199	50.6	178	48.8	124	40.0	86	27.7
italiani	323	87.3	330	87.3	256	84.8	263	89.2	291	90.1	316	89.5	334	90.5	345	89.6	268	88.2	350	88.6	316	87.5	342	87.0	309	84.7	262	84.5	252	81.3
Non nativi	47	12.7	30	7.9	39	12.9	32	10.8	29	9.0	37	10.5	35	9.5	37	9.6	36	11.8	43	10.9	45	12.5	51	13.0	53	14.5	48	15.5	43	13.9
metropoli	281	75.9	295	78.0	226	74.8	223	75.6	261	80.8	304	86.1	299	81.0	326	84.7	253	83.2	355	89.9	307	85.0	344	87.5	326	89.3	275	88.7	259	83.5
fuori metropoli	89	24.1	83	22.0	76	25.2	72	24.4	61	18.9	48	13.6	69	18.7	58	15.1	50	16.4	40	10.1	54	15.0	49	12.5	38	10.4	35	11.3	36	11.6
età media	35.0		37.7		35.5		36.6		39.6		41.6		42.2		40.3		43.4		48.4		47.8		49.8		47.9		47.4		44.5	

Tab. 5 - Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive.
Raffronti per sostanza esplicitamente specificata nelle diagnosi di dimissione - Periodo 2000-2014

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	370		378		302		295		323		353		369		385		304		395		361		393		365		310		295	
Barbiturici	12	3.2	22	5.8	14	4.6	15	5.1	25	7.7	29	8.2	63	17.1	33	8.6	39	12.8	33	8.4	22	6.1	18	5.0	28	7.7	21	6.8	39	12.6
Benzodiazepine	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		39	10.8	69	19.1	49	13.4	39	8.7	6	0.3
Cocaina	26	7.0	27	7.1	29	9.6	31	10.5	39	12.1	35	9.9	32	8.7	53	13.8	37	12.2	25	6.3	29	8.0	32	8.9	28	7.7	35	11.3	39	12.6
Cannabinoidi	14	3.8	14	3.7	19	6.3	23	7.8	18	5.6	27	7.6	27	7.3	44	11.4	25	8.2	21	5.3	18	5.0	21	5.8	21	5.8	49	15.8	42	13.5
Allucinogeni	8	2.2	6	1.6	3	1.0	4	1.4	2	0.6	3	0.8	2	0.5	1	0.3	1	0.3	3	0.8	1	0.3	3	0.8	3	0.8	1	0.3	3	1.0
Oppioidi	214	57.8	217	57.4	171	56.6	158	53.6	205	63.5	140	39.7	130	35.2	123	31.9	93	30.6	79	20.0	83	23.0	84	23.3	85	23.3	70	22.6	107	34.5
Antidepressivi	2	0.5	2	0.5	2	0.7	1	0.3	1	0.3	3	0.8	8	2.2	4	1.0	5	1.6	39	9.9	69	19.1	0	-	29	7.9	27	8.7	1	0.3
Amfetamine	4	1.1			3	1.0	4	1.4			3	0.8	3	0.8	4	1.0	2	0.7	1	0.3	4	1.1	1	0.3	3	0.8	3	1.0	1	0.3