

Rassegne e Articoli

Mortality risk in a cohort of subjects reported by authorities for cannabis possession for personal use. Results of a longitudinal study

Il rischio di decesso in una coorte di soggetti segnalati dalle forze dell'ordine per consumo di Cannabis. Risultati di uno studio longitudinale

Raimondo Maria Pavarin,¹ Domenico Berardi²

¹ Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze patologiche, DSM DP AUSL Bologna

² Istituto di psichiatria, Università di Bologna

Corrispondenza:
Raimondo Pavarin
Raimondo.Pavarin@ausl.bologna.it

Cosa si sapeva già

■ La cannabis è la sostanza illecita più utilizzata nel mondo, dove si stima che nel corso dell'ultimo anno sia stata consumata da almeno 159 milioni di persone.

■ I più probabili effetti sulla salute collegati a un uso continuativo sono: sindrome di dipendenza, bronchiti croniche, indebolimento delle funzioni respiratorie, tumori alle vie respiratorie, problemi cardiovascolari e disordini psicotici.

■ I cannabinoidi costituiscono la più frequente sostanza psicotropa dopo l'alcol etilico riscontrata in caso di incidente stradale.

Cosa si aggiunge di nuovo

■ Osservazione di un elevato rischio di decesso per i soggetti segnalati dalle forze dell'ordine per uso di cannabis.

Epidemiol Prev 2011; 35 (2): 89-93

Riassunto

Obiettivo: studiare il rischio di decesso tra i soggetti segnalati dalle forze dell'ordine per consumo di cannabis.

Materiali e metodi: studio di coorte su 2.511 soggetti residenti nell'area metropolitana di Bologna segnalati per detenzione di cannabis per uso personale nel periodo compreso tra il 1990 e il 2004.

Per identificare i soggetti con dipendenza, la coorte è stata incrociata con le cartelle socio-sanitarie informatizzate degli utenti in carico ai SERT dell'area metropolitana di Bologna e i risultati sono stati distinti tra utenti SERT (soggetti in trattamento, tutti eroinomani) e non utenti SERT (soggetti che non sono stati in trattamento presso un SERT e di cui non si conosce l'uso di altre sostanze oltre alla cannabis).

Risultati: si osserva un eccesso di mortalità per tutte le cause della coorte rispetto alla popolazione generale sia tra gli utenti SERT (SMR 14,61 IC 95% 9,21-23,19) sia tra i non utenti (SMR 2,43 IC 95% 1,67-3,55). Tra gli utenti SERT, gli SMR più elevati e statisticamente significativi erano per overdose, suicidio e AIDS. Tra i non utenti si evidenzia un eccesso per incidenti stradali e per overdose.

Conclusioni: i risultati dello studio evidenziano un elevato rischio di decesso per i consumatori di cannabis, una quota dei quali era probabilmente consumatore di altre sostanze e solo un numero esiguo si è rivolto nel tempo al SERT.

Parole chiave: cannabis, mortalità, incidenti stradali, stili di vita, soggetti segnalati per uso di droga.