



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Rapporto 2014 sulle dipendenze in area metropolitana

*quadro epidemiologico
caratteristiche tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d'azzardo patologici,
attività dei servizi*

A cura di Raimondo Maria Pavarin
Con la collaborazione di Silvia Marani, Elsa Turino, Giovanni Coccagna

Azienda USL di Bologna
DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Via S. Isaia, 94/A
Tel. 051/6584192 – Fax. 051/6584315
<http://www.ausl.bologna.it/oem>

Si ringraziano

Luana Capitani – AUSL di Bologna – U.O.S.D Ser. T Bologna Ovest
Roberto Ragazzi – AUSL Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Orietta Venturi – AUSL di Bologna – Equipe carcere U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Elisabetta Scagliarini e Daniele Campedelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Pianura Ovest
Catia Leoni – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Sert Bologna Est
Elisabetta Bacchini – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert Budrio
Giorgia Paoletti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T San Lazzaro di Savena
Leonardo Piscitelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Vergato
Cristina Nasonte – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert San Giorgio di Piano
Simona Sarti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Zola

Moreno Astorri – Opera Padre Marella, Comunità “La Sorgente”
Silvia Garagnani – Cooperativa Sociale “Il Pettiroso”
Cinzia Tavalazzi– Centro Accoglienza “La Rupe-Quadrifoglio”
Hazem Cavina – Cooperativa Sociale “ASAT”

Francesca Puccetti – Ausl Bologna - U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore
Mimosa Balloni – Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi- Dipartimento ad attività integrata emergenza/urgenza
Vincenza Perlangeli – Ausl Bologna - U.O.C. Epidemiologia, promozione della salute e comunicazione del rischio
Antonietta Moschetti - Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi - Tecnologie e Sistemi Informatici

Sono inoltre disponibili on line sul sito dell'Osservatorio.

<http://www.ausl.bologna.it/oem>

1 – Tabelle dati dettagliate

2 – Mappa dei servizi pubblici e privati per le dipendenze in area metropolitana

3 – Approfondimenti

Il quadro¹

Consumatori socialmente integrati e consumatori marginali

Stabile il numero di consumatori problematici di stupefacenti (in calo eroina, aumenta l'uso di cocaina).

Cambiano le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche: è in aumento la percentuale di residenti, di non nativi e di soggetti senza fissa dimora.

Anche se su numeri molto bassi, si segnala che tra i residenti aumentano i nuovi casi (incidenza) di soggetti con consumo problematico di eroina.

Il consumo di alcol

Aumenta il numero e la stima di persone con consumo problematico di alcol. Aumenta il numero di accessi al pronto soccorso. Tra i residenti, aumenta l'incidenza di soggetti con età superiore a 30 anni, in modo più accentuato tra i non nativi.

Il gioco d'azzardo patologico

Nel corso del 2014 i SERT dell'ASL Bologna hanno preso in carico 145 soggetti, numero in aumento. Dagli studi condotti nel territorio emerge che la problematica sembra concentrata nei luoghi dove sono disponibili vari tipi di giochi, non sempre in relazione con altre tipologie di dipendenza.

Il sistema di allerta rapida

Dopo l'aumento registrato negli anni scorsi, nel 2014 diminuisce il numero di overdose letali e di accessi per overdose ai reparti di Pronto Soccorso. In calo anche il rapporto di letalità (decessi/stima numero consumatori di eroina).

Cosa emerge dalle ricerche nell'area metropolitana di Bologna

E' stato intervistato un campione per quote di 838 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età compresa tra 18 e 64 anni.

Il 24% ha un consumo problematico di alcol, il 21% ha usato cannabis almeno una volta nell'ultimo anno, il 20% ha una dipendenza medio alta da tabacco.

Il 9% soffre di disturbi dell'alimentazione, il 5% è positivo al test per la dipendenza da shopping, il 2% è positivo al test per la dipendenza da internet, lo 0.5% è positivo al test per la dipendenza da gioco.

¹A cura di Raimondo Maria Pavarin

Metodologia utilizzata: note

Definizione di caso – Come “consumatori problematici” sono stati considerati i soggetti che si sono rivolti ad un servizio pubblico o privato per problemi dovuti all’uso/abuso di sostanze psicoattive.

I soggetti inclusi nel presente studio sono stati selezionati dai sistemi informativi di SERT e Carcere (cartella socio-sanitaria informatizzata SISTER), Pronto Soccorso dell’AUSL di Bologna (sistema informativo SIO), Ospedali e case di cura private convenzionate (Scheda di Dimissione Ospedaliera), servizi a bassa soglia di accesso del Comune di Bologna (SIDS: Sistema Informativo Disagio Sociale – dato disponibile fino al 31/12/2010), Registro Mortalità dell’AUSL di Bologna (Scheda ISTAT). Il periodo di riferimento è compreso tra il 2004 ed il 2014, il territorio è l’area metropolitana di Bologna. L’analisi dei dati si sviluppa su cinque filoni: 1) le sostanze illegali; 2) l’alcol; 3) Il gioco patologico; 4) il sistema di allerta rapida sulle overdose; 5) gli stili di vita.

Materiali e metodi - Dall’archivio dei SERT sono stati selezionati i soggetti presi in carico come tossicodipendenti o come alcolisti. Dal data base degli accessi al Pronto Soccorso sono stati selezionati i soggetti che si sono rivolti al servizio per problemi collegati all’uso di sostanze psicoattive². Dai data base dei servizi a bassa soglia sono stati selezionati i soggetti con tipologia di disagio “tossicodipendente” o “alcolista” e con sostanza di abuso specificata. Per quanto riguarda i ricoveri, sono stati utilizzati i dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e sono stati selezionati i soggetti con diagnosi di dimissione abuso o dipendenza da sostanze psicoattive in base alla classificazione ICD-9. Dall’archivio delle schede di morte ISTAT sono stati selezionati i soggetti deceduti in area metropolitana con causa di decesso ICD-9 304, ICD-10 X40-X49.

Un soggetto nello stesso periodo di riferimento può essere stato in contatto con più servizi e quindi essere presente in più archivi. Per ogni soggetto le informazioni sono state riunite in unico record ed aggiornate anno per anno. L’archivio finale distingue i “nuovi” contatti (soggetti presenti nell’anno considerato, ma non negli anni precedenti), i “persi” (soggetti non presenti nell’anno successivo a quello considerato) ed i soggetti in contatto anche nell’anno precedente. Per indicare la nazionalità si è tenuto conto del paese di nascita. Gli italiani nati all’estero sono stati considerati italiani.

Analisi - Per la stima del sommerso è stato utilizzato il metodo “cattura/ricattura” a due fonti (A*B/C) e sono stati calcolati i relativi intervalli di confidenza al 95%: A) i soggetti che hanno usufruito di servizi SERT (esclusi quelli che sono stati seguiti solo dal Carcere); B) i soggetti dimessi da Ospedali e case di cura private convenzionate³; C) i soggetti comuni tra le due fonti.

Per tutte le stime sono stati utilizzati i soggetti di età compresa tra 15 e 64 anni; per le sostanze illegali i soggetti con abuso di oppioidi, cocaina e cannabis.

Incidenza e prevalenza sono calcolati per ogni Distretto sanitario utilizzando i soli soggetti residenti di età compresa tra 15-64 anni distintamente per sesso e nazionalità (utenti residenti/popolazione residente*1000). La popolazione residente è stata ricavata dal sito web della Regione Emilia-Romagna⁴, la popolazione residente straniera dal sito web dell’ ISTAT⁵. Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando i software SPSS 12.0 e STATA 14.0.

Gli stili di vita – Sono stati intervistati 838 soggetti. Sulla popolazione residente (18/64 anni) è stato realizzato un campionamento per quote distinto per sesso, età e nazione di nascita. Il questionario, che raccoglie i dati socio-demografici dell’intervistato (sesso, età, nazionalità, stato civile, scolarità, condizione professionale, situazione abitativa, disponibilità mensile di denaro) ed informazioni sui genitori (nazione di nascita), è strutturato in otto sezioni: shopping, alimentazione, sostanze illegali, tabacco, alcol, gioco con premi in denaro, uso di internet, sport e salute.

²Pavarin, R.M. (2014), *Access to the health services for problematic use of illegal psychoactive substances among natives and non-natives: a study in the metropolitan area of Bologna*, Ann Ist Super Sanità, 50(1): 40-46

³Vedi Pavarin, R.M. (2007), *Consumo, consumo problematico e dipendenza*, Franco Angeli, Milano: 37;56. Pavarin, R.M. (1998), *Stima della prevalenza di tossicodipendenti nella città di Bologna nel 1997 e analisi del sommerso*, Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo, 3:7-11

⁴http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/statistica/pagine/statistica_self_service.htm

⁵<http://demo.istat.it/>

Anno 2014 e precedenti: tabelle dei dati

Tab. 1	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti inclusi nello studio trasversale. Periodo 2004-2014
Tab. 2	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi - Periodo 2004-2014
Tab. 3	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2004-2014
Tab. 4	Consumatori problematici di eroina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2012-2014
Tab. 5	Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche - Periodo 2004-2014
Tab. 6	Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2004-2014
Tab. 7	Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi - Periodo 2004-2014
Tab. 8	Giocatori d'azzardo patologici in carico al SERT. Periodo 2009-2014
Tab. 9	Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2004-2014
Tab. 10	Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2004-2014
Tab. 11	Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2004-2014
Tab. 12	Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità, età in classi. Confronto 2012-2014
Tab. 13	Ricerca sulla prevalenza di disturbi, con e senza sostanze (alcol, tabacco, illegali, shopping compulsivo, gioco d'azzardo patologico, dipendenza da internet e disturbi dell'alimentazione)
Tab. 14	Sistema di allerta rapida. Overdose letali e non letali area metropolitana di Bologna.

Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2004-2014

	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
Totale	3405		3461		3440		3636		3862		3771		3876		3627		3853		3478		3064	
età media	39.3		38.1		37.9		38.1		37.7		37.0		36.4		36.6		37.9		34.4		34.2	
femmine	630	18.5	622	18.0	665	19.3	756	20.8	812	21.0	773	20.5	810	20.9	737	20.3	797	20.7	669	19.2	591	19.3
maschi	2777	81.6	2839	82.0	2775	80.7	2880	79.2	3050	79.0	2998	79.5	3066	79.1	2890	79.7	3056	79.3	2809	80.8	2473	80.7
italiani	2620	76.9	2697	77.9	2699	78.5	2890	79.5	3101	80.3	3083	81.8	3127	80.7	2922	80.6	3186	82.7	2881	82.8	2625	85.7
non nativi	780	22.9	758	21.9	741	21.5	746	20.5	761	19.7	688	18.2	749	19.3	705	19.4	667	17.3	597	17.2	439	14.3
residenti Bologna	1367	40.1	1339	38.7	1353	39.3	1419	39.0	1542	39.9	1475	39.1	1517	39.1	1426	39.3	1447	37.6	1246	35.8	1139	37.2
res. area metropolitana	2507	73.6	2467	71.3	2388	69.4	2572	70.7	2707	70.1	2611	69.2	2597	67.0	2433	67.1	2507	65.1	2163	62.2	1929	63.0
res. fuori area metropolitana	840	24.7	931	26.9	1011	29.4	1060	29.2	1081	28.0	1093	29.0	1201	31.0	1087	30.0	1196	31.0	1058	30.4	937	30.6
SFD	195	5.7	168	4.9	132	3.8	123	3.4	223	5.8	207	5.5	314	8.1	259	7.1	183	4.7	224	6.4	252	8.2
elem/media inf	1993	58.5	1989	57.5	2023	58.8	2116	58.2	2297	59.5	2820	74.8	2383	61.5	2259	62.3	1675	43.5	2081	59.8	1673	54.6
media sup/laurea	976	28.7	949	27.4	933	27.1	974	26.8	1067	27.6	820	21.7	786	20.3	667	18.4	680	17.6	616	17.7	711	23.2
lavora	1227	36.0	1426	41.2	1285	37.4	1369	37.7	1597	41.4	1576	41.8	1587	40.9	1346	37.1	1308	33.9	1215	34.9	1198	39.1
non lavora	1564	45.9	1393	40.2	1641	47.7	1707	46.9	1780	46.1	1650	43.8	1079	27.8	1510	41.6	1566	40.6	1582	45.5	499	16.3
studia	91	2.7	99	2.9	91	2.6	119	3.3	122	3.2	110	2.9	105	2.7	97	2.7	93	2.4	83	2.4	64	2.1
Epatite C+	1087	31.9	1058	30.6	841	24.4	863	23.7	928	24.0	950	25.2	931	24.0	919	25.3	930	24.1	870	25.0	852	27.8
HIV+	205	6.0	190	5.5	181	5.3	179	4.9	186	4.8	200	5.3	207	5.3	200	5.5	215	5.6	206	5.9	204	6.7
decesso overdose	12	0.4	19	0.5	16	0.5	8	0.2	5	0.1	8	0.2	10	0.3	13	0.4	26	0.7	18	0.5	16	0.5
oppioidi	2534	74.4	2474	71.5	2598	75.5	2703	74.3	2817	72.9	2839	75.3	2871	74.1	2624	72.3	2577	66.9	2496	71.8	2359	77.0
di cui eroina	2349	69.0	2363	68.3	2485	72.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cocaina	1001	29.4	920	26.6	821	23.9	790	21.7	921	23.8	1142	30.3	1382	35.7	1259	34.7	1268	32.9	1232	35.4	1136	37.1
solo cocaina	511	15.0	508	14.7	434	12.6	426	11.7	456	11.8	439	11.6	453	11.7	423	11.7	489	12.7	437	12.6	341	11.1
cannabinoidi	510	15.0	522	15.1	417	12.1	376	10.3	378	9.8	416	11.0	540	13.9	520	14.3	546	14.2	544	15.6	432	14.1
solo cannabinoidi	217	6.4	238	6.9	193	5.6	166	4.6	141	3.7	132	3.5	161	4.2	135	3.7	182	4.7	199	5.7	138	4.5
altre sostanze illegali	339	10.0	315	9.1	326	9.5	356	9.8	359	9.3	418	11.1	643	16.6	372	10.3	545	14.1	317	9.1	199	6.5
benzodiazepine	55	1.6	56	1.6	77	2.2	101	2.8	100	2.6	95	2.5	137	3.5	60	1.7	61	1.6	52	1.5	49	1.6
anche alcol	476	14.0	460	13.3	444	12.9	484	13.3	526	13.6	623	16.5	689	17.8	603	16.6	729	18.9	513	14.7	447	14.6
anche altri farmaci**	89	2.6	54	1.6	70	2.0	121	3.3	205	5.3	162	4.3	257	6.6	154	4.2	80	2.1	110	3.2	92	3.0
uso Vena	1146	33.7	1180	34.1	1254	36.5	1362	37.5	1473	38.1	1371	36.4	1669	43.1	1615	44.5	1629	42.3	1624	46.7	1589	51.9
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	751	22.1	737	21.3	738	21.5	828	22.8	837	21.7	898	23.8	1065	27.5	1050	28.9	1265	32.8	1148	33.0	1064	34.7
Carcere	637	18.7	624	18.0	693	20.1	690	19.0	654	16.9	522	13.8	584	15.1	578	15.9	671	17.4	584	16.8	386	12.6
Ospedale	283	8.3	187	5.4	215	6.3	265	7.3	326	8.4	214	5.7	226	5.8	243	6.7	234	6.1	253	7.3	170	5.5
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	130	3.4	162	4.3	204	5.3	172	4.7	189	4.9	292	8.4	343	11.2
Unità Mobile Metadone	181	5.3	131	3.8	140	4.1	147	4.0	196	5.1	172	4.6	177	4.6	144	4.0	198	5.1	170	4.9	158	5.2
Sert	2854	83.8	2858	82.6	2908	84.5	3029	83.3	3189	82.6	3027	80.3	2935	75.7	2765	76.2	2763	71.7	2604	74.9	2288	74.7
Pronto soccorso	480	14.1	685	19.8	632	18.4	610	16.8	408	10.6	449	11.9	391	10.1	232	6.4	209	5.4	380	10.9	275	9.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

** psicofarmaci, antidepressivi, barbiturici e anche altri farmaci non specificati

Tab. 2 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2004-2014

	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
Totale	780		758		741		746		761		688		749		705		667		597		439	
femmine	64	8.4	62	8.2	58	7.8	86	11.5	88	11.6	73	10.6	81	10.8	60	8.5	58	8.7	60	10.1	49	11.2
residenti Bologna	175	23.1	164	21.6	139	18.8	150	20.1	150	19.7	149	21.7	165	22.0	165	23.4	138	20.7	115	19.3	81	18.5
residenti area metrop.	272	35.9	253	33.4	228	30.8	249	33.4	257	33.8	236	34.3	248	33.1	226	32.1	200	30.0	170	28.5	120	27.3
fuori area Metropolitana	460	60.7	458	60.4	484	65.3	496	66.5	457	60.1	427	62.1	468	62.5	432	61.3	414	62.1	335	56.1	269	61.3
sup/laurea	128	16.9	112	14.8	104	14.0	111	14.9	127	16.7	92	13.4	88	11.7	70	9.9	85	12.7	74	12.4	67	15.3
non lavora	521	68.7	481	63.5	516	69.6	512	68.6	505	66.4	432	62.8	183	24.4	422	59.9	394	59.1	344	57.6	53	12.1
studia	6	0.8	10	1.3	4	0.5	7	0.9	6	0.8	5	0.7	4	0.5	3	0.4	1	0.1	4	0.7	1	0.2
Senza fissa dimora	98	12.9	72	9.5	46	6.2	54	7.2	70	9.2	61	8.9	82	10.9	54	7.7	15	2.2	31	5.2	34	7.7
EpaC+	86	11.3	76	10.0	63	8.5	69	9.2	60	7.9	59	8.6	53	7.1	43	6.1	37	5.5	32	5.4	29	6.6
HIV+	13	1.7	13	1.7	11	1.5	15	2.0	12	1.6	12	1.7	8	1.1	10	1.4	10	1.5	6	1.0	8	1.8
oppioidi	528	69.7	494	65.2	500	67.5	526	70.5	537	70.6	501	72.8	523	69.8	484	68.7	408	61.2	371	62.1	304	69.2
di cui eroina	491	64.8	465	61.3	484	65.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	295	38.9	249	32.8	222	30.0	182	24.4	203	26.7	295	42.9	374	49.9	365	51.8	349	52.3	323	54.1	245	55.8
solo cocaina	153	20.2	139	18.3	131	17.7	107	14.3	106	13.9	104	15.1	120	16.0	133	18.9	160	24.0	147	24.6	88	20.0
Cannabis	173	22.8	157	20.7	118	15.9	80	10.7	74	9.7	110	16.0	126	16.8	141	20.0	113	16.9	78	13.1	43	9.8
Solo cannabis	59	7.8	60	7.9	59	8.0	44	5.9	26	3.4	22	3.2	38	5.1	30	4.3	34	5.1	28	4.7	14	3.2
altre sostanze illegali***	77	10.2	74	9.8	69	9.3	67	9.0	75	9.9	82	11.9	91	12.1	49	7.0	52	7.8	54	9.0	38	8.7
benzodiazepine	17	2.2	10	1.3	14	1.9	15	2.0	11	1.4	16	2.3	32	4.3	13	1.8	11	1.6	5	0.8	4	0.9
anche Alcol	92	12.1	87	11.5	95	12.8	83	11.1	87	11.4	105	15.3	126	16.8	96	13.6	102	15.3	70	11.7	52	11.8
anche altri farmaci**	14	1.8	11	1.5	11	1.5	23	3.1	29	3.8	29	4.2	56	7.5	48	6.8	13	1.9	15	2.5	12	2.7
uso vena	117	15.4	115	15.2	117	15.8	126	16.9	132	17.3	100	14.5	124	16.6	117	16.6	104	15.6	117	19.6	113	25.7
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	246	32.5	239	31.5	261	34.4	265	35.0	271	35.8	239	31.5	297	39.2	324	42.7	289	38.1	320	42.2	274	36.1
Carcere	405	53.4	380	50.1	423	57.1	392	52.5	369	48.5	344	50.0	396	52.9	413	58.6	412	61.8	348	58.3	217	49.4
Ospedale	43	5.7	35	4.6	34	4.6	39	5.2	43	5.7	26	3.8	19	2.5	32	4.5	18	2.7	21	3.5	9	2.1
Decesso overdose	1	0.1	4	0.5	5	0.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.3	5	0.7	3	0.5	3	0.7
Pronto soccorso	107	14.1	145	19.1	122	16.5	115	15.4	107	14.1	82	11.9	64	8.5	45	6.4	31	4.6	65	10.9	47	10.7
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3.3	29	4.2	55	7.3	47	6.7	28	4.2	45	7.5	60	13.7
Unità Mobile Metadone	120	15.8	80	10.6	77	10.4	85	11.4	105	13.8	81	11.8	84	11.2	58	8.2	49	7.3	37	6.2	40	9.1
Sert	657	86.7	616	81.3	620	83.7	618	82.8	623	81.9	539	78.3	509	68.0	493	69.9	457	68.5	400	67.0	279	63.6
Area provenienza																						
Europa Est	145	7.2	130	6.5	130	6.5	137	6.8	146	7.3	130	6.5	121	6.0	87	4.3	79	3.9	91	4.5	67	3.3
Europa Nord	4	0.2	6	0.3	4	0.2	10	0.5	11	0.5	9	0.4	7	0.3	7	0.3	3	0.1	5	0.2	5	0.2
Europa Ovest	73	3.6	85	4.2	74	3.7	80	4.0	91	4.5	86	4.3	80	4.0	75	3.7	73	3.6	74	3.7	66	3.3
Asia Medio Orientale	7	0.3	14	0.7	13	0.6	12	0.6	11	0.5	14	0.7	16	0.8	19	0.9	24	1.2	26	1.3	17	0.8
Asia Orientale	1	0.0	2	0.1	3	0.1	2	0.1	1	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0
Regione Indiana	34	1.7	28	1.4	27	1.3	25	1.2	25	1.2	19	0.9	17	0.8	10	0.5	16	0.8	14	0.7	10	0.5
Altra Asia o Sud Est Asiatico	5	0.2	2	0.1	7	0.3	1	0.0	2	0.1	4	0.2	3	0.1	4	0.2	3	0.1	1	0.0	1	0.0
Africa Mediterranea	438	21.7	420	20.9	424	21.1	412	20.5	413	20.5	368	18.3	437	21.8	435	21.7	396	19.7	325	16.2	238	11.9
Altra Africa	23	1.1	27	1.3	22	1.1	27	1.3	24	1.2	23	1.1	26	1.3	31	1.5	35	1.7	20	1.0	13	0.6
USA e Canada	2	0.1	4	0.2	3	0.1	4	0.2	3	0.1	5	0.2	5	0.2	4	0.2	5	0.2	3	0.1	4	0.2
America Latina	37	1.8	28	1.4	26	1.3	30	1.5	29	1.4	28	1.4	30	1.5	25	1.2	26	1.3	26	1.3	14	0.7
Altro	11	0.5	12	0.6	8	0.4	6	0.3	5	0.2	1	0.0	5	0.2	6	0.3	7	0.3	10	0.5	4	0.2

Tab. 3 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2004-2014

	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
Totale	751		737		738		828		837		898		1065		1050		1265		1148		1064	
età media	35.3		32.2		33.9		35.5		35.7		35.0		34.6		36.4		41.5		31.6		31.1	
femmine	155	20.6	128	17.4	142	19.2	197	23.8	213	25.4	194	21.6	259	24.3	248	23.6	313	24.7	224	19.5	190	17.9
non nativi	246	32.8	239	32.4	261	35.4	265	32.0	271	32.4	239	26.6	297	27.9	324	30.9	289	22.8	320	27.9	274	25.8
residenti Bologna	214	28.5	186	25.2	182	24.7	213	25.7	223	26.6	197	21.9	259	24.3	309	29.4	398	31.5	251	21.9	253	23.8
res. area metropolitana	441	58.7	417	56.6	347	47.0	448	54.1	421	50.3	441	49.1	531	49.9	522	49.7	697	55.1	517	45.0	462	43.4
res. fuori area metropolitana	292	38.9	299	40.6	376	50.9	379	45.8	387	46.2	423	47.1	514	48.3	479	45.6	548	43.3	599	52.2	562	52.8
SFD	46	6.1	24	3.3	25	3.4	17	2.1	54	6.5	44	4.9	77	7.2	59	5.6	40	3.2	56	4.9	99	9.3
sup/laurea	132	17.6	114	15.5	111	15.0	141	17.0	155	18.5	158	17.6	174	16.3	124	11.8	148	11.7	153	13.3	188	17.7
non lavora	213	28.4	200	27.1	259	35.1	288	34.8	326	38.9	314	35.0	159	14.9	358	34.1	392	31.0	458	39.9	90	8.5
studia	18	2.4	28	3.8	15	2.0	28	3.4	37	4.4	28	3.1	33	3.1	26	2.5	27	2.1	32	2.8	30	2.8
EpaC+	35	4.7	20	2.7	31	4.2	33	4.0	36	4.3	31	3.5	26	2.4	38	3.6	61	4.8	46	4.0	51	4.8
HIV+	7	0.9	4	0.5	5	0.7	1	0.1	5	0.6	5	0.6	4	0.4	5	0.5	10	0.8	10	0.9	14	1.3
Decesso overdose	9	1.2	5	0.7	7	0.9	3	0.4	2	0.2	3	0.3	8	0.8	10	1.0	20	1.6	11	1.0	10	0.9
oppioidi	353	47.0	248	33.6	325	44.0	379	45.8	385	46.0	488	54.3	542	50.9	514	49.0	510	40.3	582	50.7	634	59.6
di cui eroina	239	31.8	193	26.2	269	36.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	238	31.7	208	28.2	182	24.7	177	21.4	159	19.0	268	29.8	342	32.1	327	31.1	380	30.0	454	39.5	485	45.6
solo cocaina	166	22.1	159	21.6	139	18.8	141	17.0	120	14.3	132	14.7	174	16.3	155	14.8	198	15.7	210	18.3	185	17.4
Cannabis	205	27.3	235	31.9	161	21.8	126	15.2	96	11.5	137	15.3	150	14.1	183	17.4	184	14.5	229	19.9	191	18.0
Solo cannabis	125	16.6	151	20.5	111	15.0	95	11.5	67	8.0	51	5.7	74	6.9	65	6.2	76	6.0	113	9.8	99	9.3
altre sostanze illegali***	169	22.5	169	22.9	180	24.4	206	24.9	270	32.3	259	28.8	345	32.4	300	28.6	469	37.1	253	22.0	153	14.4
benzodiazepine	6	0.8	10	1.4	15	2.0	0	0.0	38	4.5	17	1.9	42	3.9	12	1.1	12	0.9	15	1.3	12	1.1
anche Alcol	130	17.3	121	16.4	138	18.7	129	15.6	75	9.0	156	17.4	198	18.6	140	13.3	251	19.8	172	15.0	176	16.5
anche altri farmaci**	54	7.2	21	2.8	23	3.1	62	7.5	135	16.1	63	7.0	99	9.3	51	4.9	33	2.6	39	3.4	39	3.7
uso vena	75	10.0	47	6.4	98	13.3	98	11.8	105	12.5	103	11.5	163	15.3	157	15.0	177	14.0	208	18.1	239	22.5
Carcere	119	15.8	123	16.7	196	26.6	193	23.3	177	21.1	197	21.9	214	20.1	242	23.0	262	20.7	313	27.3	228	21.4
Ospedale	171	22.8	73	9.9	82	11.1	133	16.1	188	22.5	101	11.2	78	7.3	94	9.0	109	8.6	116	10.1	51	4.8
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2.6	73	8.1	92	8.6	74	7.0	69	5.5	143	12.5	205	19.3
Unità Mobile Metadone	58	7.7	27	3.7	0	0.0	30	3.6	61	7.3	33	3.7	46	4.3	36	3.4	67	5.3	60	5.2	74	7.0
Sert	369	49.1	333	45.2	370	50.1	450	54.3	466	55.7	459	51.1	480	45.1	494	47.0	500	39.5	581	50.6	546	51.3
Pronto soccorso	232	30.9	348	47.2	307	41.6	271	32.7	195	23.3	261	29.1	190	17.8	112	10.7	125	9.9	263	22.9	200	18.8

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 4 – Consumatori problematici di eroina. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2012-2014

	2014	%	2013	%	2012	%
totale	239		193		269	
età media	34.4		31.4		32.3	
femmine	48	20.1	28	14.5	48	17.8
non nativi	101	42.3	82	42.5	114	42.4
residenti Bologna	51	21.3	32	16.6	58	21.6
res. Area metropolitana	98	41.0	63	32.6	74	27.5
fuori area metropolitana	136	56.9	114	59.1	184	68.4
Sup/laurea	69	28.9	58	30.1	64	23.8
Non lavora	132	55.2	114	59.1	174	64.7
studia	12	5.0	14	7.3	6	2.2
SFD	41	17.2	20	10.4	24	8.9
EpaC+	30	12.6	16	8.3	28	10.4
HIV+	6	2.5	2	1.0	4	1.5
Cocaina	65	27.2	46	23.8	41	15.2
Cannabinoidi	31	13.0	40	20.7	20	7.4
altre sostanze illegali***	19	7.9	2	1.0	7	2.6
benzodiazepine	0	0.0	1	0.5	2	0.7
anche Alcol	16	6.7	7	3.6	19	7.1
anche altri farmaci**	11	4.6	3	1.6	6	2.2
uso Vena	73	30.5	47	24.4	98	36.4
Carcere	62	25.9	61	31.6	124	46.1
Ospedale	8	3.3	5	2.6	3	1.1
Decesso overdose	9	3.8	5	2.6	7	2.6
Sert	203	84.9	171	88.6	239	88.8
Unità Mobile Metadone	58	24.3	26	13.5	30	11.2
Pronto Soccorso	56	23.4	23	11.9	44	16.4

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Table 5 - Characteristics of subjects with alcohol-related problems. Period 2004-2014

	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
Total	3158		2823		2784		2633		2906		2857		3025		2568		2882		2560		2404	
Middle age	47.9		47.1		47.9		47.6		46.7		46.0		45.7		45.4		45.6		45.7		45.2	
Females	836	26.5	709	25.1	703	25.3	636	24.2	725	24.9	697	24.4	757	25.0	637	24.8	765	26.5	616	24.1	530	22.0
Non-natives	809	25.6	710	25.2	699	25.1	603	22.9	602	20.7	562	19.7	577	19.1	421	16.4	435	15.1	347	13.6	304	12.6
Residents in Bologna	1033	32.7	999	35.4	974	35.0	935	35.5	1160	39.9	1113	39.0	1193	39.4	1073	41.8	1152	40.0	1019	39.8	946	39.4
Residents in the Metropolitan Area	2505	79.3	2261	80.1	2243	80.6	2138	81.2	2389	82.2	2289	80.1	2412	79.7	2058	80.1	2252	78.1	2015	78.7	1802	75.0
Residents Out of the Metropolitan Area	628	19.9	493	17.5	533	19.1	495	18.8	478	16.4	532	18.6	572	18.9	467	18.2	569	19.7	449	17.5	436	18.1
High School Graduate/Degree	491	15.5	459	16.3	431	15.5	409	15.5	550	18.9	419	14.7	397	13.1	331	12.9	116	4.0	295	11.5	286	11.9
Don't Work	728	23.1	456	16.2	630	22.6	609	23.1	909	31.3	893	31.3	824	27.2	645	25.1	622	21.6	540	21.1	326	13.6
Study	15	0.5	11	0.4	12	0.4	12	0.5	18	0.6	14	0.5	10	0.3	12	0.5	11	0.4	6	0.2	4	0.2
No fixed abode	76	2.4	72	2.6	47	1.7	45	1.7	124	4.3	111	3.9	154	5.1	134	5.2	111	3.9	118	4.6	119	5.0
EpaC+	214	6.8	189	6.7	152	5.5	150	5.7	341	11.7	352	12.3	346	11.4	331	12.9	349	12.1	312	12.2	292	12.1
New (any area of contact)	1680	53.2	1288	45.6	1284	46.1	1214	46.1	933	32.1	1058	37.0	1245	41.2	912	35.5	1261	43.8	1076	42.0	1162	48.3
SerT Alcoholics	1035	32.8	1022	36.2	943	33.9	951	36.1	1071	36.9	1029	36.0	954	31.5	886	34.5	813	28.2	781	30.5	710	29.5
SerT Addicts	181	5.7	182	6.4	171	6.1	184	7.0	175	6.0	187	6.5	198	6.5	182	7.1	168	5.8	152	5.9	128	5.3
Prison	73	2.3	58	2.1	43	1.5	61	2.3	39	1.3	14	0.5	11	0.4	14	0.5	25	0.9	14	0.5	11	0.5
Social Distress Area	-	-	-	-	-	-	-	-	71	2.4	95	3.3	114	3.8	103	4.0	107	3.7	136	5.3	156	6.5
Hospital	736	23.3	637	22.6	654	23.5	644	24.5	676	23.3	614	21.5	653	21.6	594	23.1	559	19.4	721	28.2	363	15.1
Emergency Room	1678	53.1	1490	52.8	1509	54.2	1259	47.8	796	27.4	858	30.0	969	32.0	536	20.9	610	21.2	543	21.2	520	21.6

Tab.6 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2004-2014

	nuovi 2014	%	nuovi 2013	%	nuovi 2012	%	nuovi 2011	%	nuovi 2010	%	nuovi 2009	%	nuovi 2008	%	nuovi 2007	%	nuovi 2006	%	nuovi 2005	%	nuovi 2004	%
Totale	1680		1288		1284		1214		933		1058		1245		912		1261		1076		1162	
Età media	45.9		43.6		45.0		44.3		44.6		44.4		45.1		44.9		45.7		46.4		44.9	
femmine	462	27.5	341	26.5	342	26.6	306	25.2	246	26.4	246	23.3	307	24.7	217	23.8	374	29.7	265	24.6	249	21.4
non nativi	522	31.1	430	33.4	433	33.7	383	31.5	313	33.5	315	29.8	347	27.9	227	24.9	268	21.3	217	20.2	212	18.2
residenti Bologna	460	27.4	381	29.6	368	28.7	376	31.0	293	31.4	306	28.9	374	30.0	313	34.3	466	37.0	378	35.1	447	38.5
res. Area metropolitana	1189	70.8	903	70.1	908	70.7	869	71.6	666	71.4	729	68.9	884	71.0	645	70.7	890	70.6	767	71.3	807	69.4
fuori area metropolitana	481	28.6	332	25.8	375	29.2	343	28.3	249	26.7	311	29.4	342	27.5	244	26.8	350	27.8	255	23.7	318	27.4
Sup/laurea	97	5.8	91	7.1	83	6.5	76	6.3	60	6.4	67	6.3	73	5.9	50	5.5	25	2.0	62	5.8	75	6.5
Non lavora	98	5.8	79	6.1	95	7.4	81	6.7	73	7.8	95	9.0	108	8.7	82	9.0	95	7.5	90	8.4	63	5.4
Studia	2	0.1	2	0.2	2	0.2	2	0.2	5	0.5	1	0.1	2	0.2	2	0.2	3	0.2	2	0.2	1	0.1
SFD	12	0.7	14	1.1	8	0.6	2	0.2	25	2.7	18	1.7	29	2.3	19	2.1	19	1.5	25	2.3	44	3.8
EpaC+	15	0.9	7	0.5	10	0.8	4	0.3	5	0.5	6	0.6	9	0.7	8	0.9	26	2.1	17	1.6	27	2.3
Alcolisti SerT	183	10.9	179	13.9	161	12.5	153	12.6	141	15.1	158	14.9	141	11.3	135	14.8	139	11.0	136	12.6	159	13.7
Tossicodipendente concomitante SerT	25	1.5	22	1.7	17	1.3	21	1.7	14	1.5	19	1.8	24	1.9	29	3.2	25	2.0	38	3.5	29	2.5
Carcere	15	0.9	16	1.2	9	0.7	13	1.1	8	0.9	26	2.5	40	3.2	33	3.6	26	2.1	53	4.9	79	6.8
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.0	15	1.4	26	2.1	16	1.8	31	2.5	38	3.5	39	3.4
Ospedale	431	25.7	266	20.7	277	21.6	324	26.7	311	33.3	341	32.2	333	26.7	271	29.7	326	25.9	417	38.8	180	15.5
Pronto Soccorso	1162	69.2	924	71.7	949	73.9	825	68.0	522	55.9	611	57.8	754	60.6	363	39.8	446	35.4	414	38.5	463	39.8

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 7 – Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2004-2014

	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
Totale	809		710		699		603		602		562		577		421		435		347		304	
età media	39.6		39.4		39.3		39.2		38.2		38.5		37.5		37.7		36.7		36.6		36.5	
femmine	214	26.5	190	26.8	188	26.9	155	25.7	143	23.8	140	24.9	154	26.7	108	25.7	104	23.9	84	24.2	56	18.4
residenti Bologna	222	27.4	204	28.7	203	29.0	178	29.5	177	29.4	174	31.0	207	35.9	156	37.1	154	35.4	113	32.6	102	33.6
residenti area metrop.	484	59.8	413	58.2	432	61.8	367	60.9	369	61.3	328	58.4	360	62.4	254	60.3	260	59.8	205	59.1	168	55.3
fuori area Metropolitana	308	38.1	240	33.8	262	37.5	236	39.1	213	35.4	219	39.0	201	34.8	152	36.1	158	36.3	116	33.4	107	35.2
sup/laurea	102	12.6	108	15.2	92	13.2	86	14.3	93	15.4	72	12.8	70	12.1	41	9.7	10	2.3	42	12.1	30	9.9
non lavora	140	17.3	118	16.6	109	15.6	92	15.3	193	32.1	131	23.3	109	18.9	86	20.4	71	16.3	66	19.0	27	8.9
studia	6	0.7	4	0.6	5	0.7	3	0.5	2	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
Senza fissa dimora	28	3.5	32	4.5	22	3.1	23	3.8	39	6.5	27	4.8	32	5.5	19	4.5	6	1.4	12	3.5	11	3.6
EpaC+	20	2.5	18	2.5	14	2.0	12	2.0	22	3.7	24	4.3	26	4.5	20	4.8	16	3.7	14	4.0	12	3.9
HIV+	4	0.5	2	0.3	4	0.6	2	0.3	5	0.8	7	1.2	5	0.9	5	1.2	5	1.1	1	0.3	1	0.3
oppioidi	31	3.8	26	3.7	32	4.6	33	5.5	71	11.8	83	14.8	92	15.9	73	17.3	70	16.1	64	18.4	55	18.1
Cocaina	34	4.2	22	3.1	21	3.0	15	2.5	32	5.3	57	10.1	73	12.7	67	15.9	53	12.2	56	16.1	49	16.1
solo cocaina	31	3.8	20	2.8	16	2.3	12	2.0	19	3.2	23	4.1	25	4.3	29	6.9	28	6.4	24	6.9	17	5.6
Cannabis	25	3.1	26	3.7	25	3.6	10	1.7	6	1.0	15	2.7	16	2.8	16	3.8	16	3.7	13	3.7	9	3.0
Solo cannabis	19	2.3	23	3.2	22	3.1	9	1.5	6	1.0	10	1.8	10	1.7	5	1.2	8	1.8	8	2.3	6	2.0
altre sostanze illegali***	26	3.2	26	3.7	31	4.4	24	4.0	25	4.2	38	6.8	37	6.4	12	2.9	14	3.2	15	4.3	3	1.0
benzodiazepine	12	1.5	11	1.5	8	1.1	2	0.3	3	0.5	11	2.0	17	2.9	6	1.4	8	1.8	3	0.9	1	0.3
anche altri farmaci**	25	3.1	17	2.4	23	3.3	13	2.2	13	2.2	34	6.0	46	8.0	46	10.9	27	6.2	19	5.5	8	2.6
uso vena	7	0.9	6	0.8	8	1.1	7	1.2	26	4.3	24	4.3	29	5.0	30	7.1	21	4.8	22	6.3	22	7.2
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	522	64.5	430	60.6	433	61.9	383	63.5	313	52.0	315	56.0	347	60.1	227	53.9	268	61.6	217	62.5	212	69.7
Sert	196	24.2	193	27.2	164	23.5	153	25.4	172	28.6	147	26.2	128	22.2	107	25.4	101	23.2	72	20.7	56	18.4
Carcere	40	4.9	32	4.5	20	2.9	24	4.0	50	8.3	46	8.2	47	8.1	44	10.5	49	11.3	40	11.5	28	9.2
Ospedale	136	16.8	98	13.8	106	15.2	99	16.4	96	15.9	80	14.2	85	14.7	63	15.0	57	13.1	63	18.2	25	8.2
Td Conc Sert	34	4.2	31	4.4	24	3.4	28	4.6	74	12.3	82	14.6	79	13.7	70	16.6	66	15.2	37	10.7	49	16.1
Pronto soccorso	549	67.9	491	69.2	501	71.7	391	64.8	314	52.2	271	48.2	281	48.7	173	41.1	163	37.5	128	36.9	132	43.4
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.5	21	3.7	36	6.2	25	5.9	19	4.4	26	7.5	22	7.2
Unità Mobile Metadone	15	1.9	15	2.1	12	1.7	13	2.2	19	3.2	24	4.3	32	5.5	18	4.3	13	3.0	13	3.7	9	3.0
Area provenienza																						
Europa Est	368	45.5	288	40.6	276	39.5	232	38.5	210	34.9	186	33.1	195	33.8	128	30.4	101	23.2	76	21.9	57	18.8
Europa Nord	12	1.5	12	1.7	14	2.0	12	2.0	19	3.2	14	2.5	14	2.4	8	1.9	8	1.8	7	2.0	5	1.6
Europa Ovest	46	5.7	46	6.5	49	7.0	38	6.3	54	8.8	59	10.5	48	8.3	40	9.5	53	12.2	45	13.0	41	13.5
Asia Medio Orientale	13	1.6	12	1.7	18	2.6	13	2.2	16	2.7	13	2.3	19	3.3	15	3.6	15	3.4	23	6.6	14	4.6
Asia Orientale	11	1.4	10	1.4	14	2.0	4	0.7	6	1.0	7	1.2	9	1.6	2	0.5	4	0.9	4	1.2	9	3.0
Regione Indiana	46	5.7	35	4.9	49	7.0	36	6.0	30	5.0	33	5.9	24	4.2	15	3.6	19	4.4	19	5.5	9	3.0
Altra Asia o Sud Est Asiatico	11	1.4	7	1.0	5	0.7	8	1.3	7	1.2	7	1.2	4	0.7	6	1.4	5	1.1	4	1.2	5	1.6
Africa Mediterranea	208	25.7	185	26.0	172	24.6	154	25.5	180	30.0	152	27.0	165	28.6	124	29.5	138	31.7	110	31.7	109	35.9
Altra Africa	45	5.6	36	5.1	38	5.4	46	7.6	39	6.5	43	7.7	46	8.0	37	8.8	37	8.5	21	6.1	27	8.9
USA e Canada	8	1.0	7	1.0	3	0.4	4	0.7	5	0.8	11	2.0	9	1.6	7	1.7	8	1.8	3	0.9	6	2.0
America Latina	39	4.8	33	4.7	45	6.4	35	5.8	36	6.0	35	6.2	40	6.9	33	7.8	39	9.0	29	8.4	18	5.9
Altro	2	0.2	39	5.4	16	2.3	21	3.5	0	0.0	2	0.4	4	0.7	6	1.4	8	1.8	6	1.7	4	1.3

Tab. 8 - Giocatori d'azzardo patologici in carico al SERT. Periodo 2009-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totale	32	38	36	55	84	145
% nuovi	46.9	21.1	41.7	54.5	66.7	55.9
età media	47.5	46.9	46.1	45.7	49.2	48.5
% femmine	18.8	10.5	19.4	20.0	26.2	22.8
% non nativi	6.3	7.9	8.3	7.3	11.9	11.7
% residenti fuori	3.1	5.3	5.6	5.5	8.3	9.0
% coniugato	53.1	60.5	55.6	34.5	38.1	35.2
% media sup/laurea	50.0	47.4	52.8	47.3	50.0	46.9
% disoccupato	12.5	13.2	11.1	91.0	13.1	11.7
durata media programma in mesi	39	35	20	21	9	6
% programma completato	28.1	28.9	19.4	1.8	0.0	3.4
% dimissione concordata	12.5	7.9	5.6	3.6	3.6	6.9
% passaggio altra struttura	3.1	7.9	8.3	0.0	0.0	1.4
% abbandono	6.3	7.9	8.3	3.6	1.2	5.5
% chiusura d'ufficio	25.0	26.3	19.4	9.1	31.0	20.7
% programma in corso	21.9	18.4	36.1	80.0	64.3	62.1
% altre dipendenze	25.0	26.3	30.6	25.5	10.7	7.0
% alcol	18.8	18.4	25.0	14.5	4.8	2.8
% cocaina	0.0	2.6	5.6	7.3	1.2	1.4
% eroina	3.1	2.6	0.0	1.8	0.0	0.0
% tabacco	3.1	2.6	0.0	1.8	2.4	2.1
% altro	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.7

Tab. 9 – Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
KG EROINA	39.3	44.5	9.4	65.9	37.7	22.5	52.7	25.3	9.2	30.6	2.4
KG COCAINA	76.1	89.3	88.8	82.9	54.1	39.9	38.4	33.5	28.4	35.0	22.0
KG HASCISH	310.7	183.3	153.6	229.9	905.5	506.8	66.7	140.7	157.7	68.0	41.8
KG MARIJUANA	3.5	8.5	5.0	13.2	2.2	41.0	4.44	89.7	170.7	68.0	75.2
Operazioni	545	669	742	713	664	544	483	616	574	652	489
denunce	759	897	1202	1041	922	825	696	888	709	316	606
arresti	598	703	983	825	788	708	573	790	621	542	493
minori denunciati	50	38	45	29	22	23	14	17	11	12	9
non nativi denunciati	510	504	709	625	529	451	385	569	461	410	375

* i dati statistici riferiti al 2014 sono da considerare provvisori in attesa di consolidamento

Tab. 10 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2004-2014

	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Sostanze Illegali	7.26	7.15	6.76	7.22	7.54	7.31	7.26	6.83	6.72	6.29	5.70	1.86	1.85	1.91	2.06	2.20	2.15	2.16	1.94	1.81	1.69	1.54
Oppioidi	5.31	5.01	5.11	5.40	5.52	5.48	5.47	5.11	4.78	4.58	4.30	1.54	1.44	1.54	1.57	1.58	1.63	1.63	1.47	1.38	1.23	1.22
di cui Eroina	5.03	4.85	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43	1.39	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-
Solo Cocaina	1.14	1.16	0.89	0.95	1.02	0.93	0.90	0.87	0.90	0.73	0.64	0.15	0.14	0.14	0.12	0.14	0.16	0.16	0.13	0.12	0.10	0.11
Alcol	5.40	5.01	4.84	4.82	5.53	5.33	3.24	4.95	5.11	4.67	4.31	2.07	1.83	1.75	1.54	1.92	1.89	1.21	1.71	1.95	1.60	1.42

	Nativi											Non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Sostanze Illegali	4.70	4.70	4.54	4.79	5.03	4.88	4.79	4.40	4.26	4.08	3.67	3.45	3.16	2.92	3.40	3.52	4.02	4.24	4.26	3.09	2.94	
Oppioidi	3.60	3.46	3.57	3.66	3.74	3.72	3.67	3.38	3.15	3.04	2.83	2.02	1.71	1.73	6.75	2.11	2.30	2.56	2.51	2.31	1.74	1.89
di cui Eroina	3.42	3.36	3.45	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	1.56	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-
Solo Cocaina	0.64	0.65	0.50	0.54	0.60	0.55	0.53	0.47	0.47	0.40	0.37	0.60	0.64	0.54	0.44	0.46	0.51	0.55	0.79	0.90	0.54	0.37
Alcol	3.30	3.12	2.93	2.88	3.51	3.42	3.51	3.18	3.34	3.07	2.76	5.87	5.01	5.49	4.96	4.96	4.86	5.75	4.67	5.56	3.68	4.11

Tab. 11 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2004-2013

	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Sostanze Illegali	1.16	1.19	0.90	1.11	0.96	1.09	1.29	1.16	1.30	1.33	1.27	0.34	0.33	0.30	0.40	0.38	0.37	0.48	0.41	0.40	0.40	0.32
Oppioidi	0.40	0.23	0.24	0.39	0.32	0.46	0.52	0.51	0.46	0.56	0.58	0.18	0.09	0.12	0.14	0.08	0.15	0.21	0.17	0.17	0.13	0.14
di cui Eroina	0.24	0.17	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.06	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
Solo Cocaina	0.30	0.35	0.23	0.26	0.21	0.21	0.26	0.26	0.31	0.26	0.26	0.06	0.04	0.03	0.05	0.02	0.05	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04
Alcol	2.38	1.89	1.86	1.88	1.40	1.61	1.78	1.44	1.73	1.59	1.76	0.99	0.76	0.71	0.61	0.51	0.53	0.72	0.44	0.79	0.57	0.58

	Nativi											Non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Sostanze Illegali	0.68	0.71	0.54	0.61	0.61	0.70	0.83	0.69	0.78	0.79	0.74	1.14	1.02	0.92	1.08	1.01	0.92	1.29	1.56	1.63	1.49	1.45
Oppioidi	0.26	0.15	0.17	0.25	0.18	0.30	0.34	0.30	0.29	0.32	0.34	0.39	0.21	0.19	0.37	0.30	0.32	0.57	0.70	0.53	0.56	0.57
di cui Eroina	0.15	0.12	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.11	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
Solo Cocaina	0.18	0.18	0.11	0.15	0.11	0.12	0.15	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	0.25	0.25	0.18	0.14	0.15	0.21	0.34	0.53	0.29	0.27
Alcol	1.34	1.08	0.98	0.98	0.74	0.89	1.01	0.81	1.08	0.95	1.05	3.46	2.70	3.11	2.90	2.33	2.37	3.11	2.05	3.16	2.21	2.67

Tab. 12 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità, età in classi. Confronto 2012-2014

	2014		2013		2012			2014		2013		2012	
	M	F	M	F	M	F		nativi	non nativi	nativi	non nativi	nativi	non nativi
Illegali							Illegali						
<20	1.65	0.78	2.47	0.58	1.81	0.70	<20	1.06	2.28	1.54	1.63	1.05	2.69
21-30	2.49	0.74	2.59	0.91	1.45	0.58	21-30	1.40	2.22	1.86	1.43	0.96	1.22
31-40	1.42	0.42	1.38	0.38	1.33	0.20	31-40	0.91	0.94	0.79	1.25	0.72	0.98
41-50	0.96	0.14	0.84	0.21	0.66	0.25	41-50	0.52	0.69	0.52	0.57	0.46	0.42
>50	0.33	0.18	0.27	0.06	0.21	0.20	>50	0.27	0.08	0.15	0.26	0.21	0.19
Totale	1.16	0.34	1.19	0.33	0.90	0.30	Totale	0.68	1.14	0.71	1.02	0.54	0.92

di cui Eroina	2014		2013		2012		di cui Eroina	2014		2013		2012	
	M	F	M	F	M	F		nativi	non nativi	nativi	non nativi	nativi	non nativi
<20	0.24	0.26	0.30	0.16	0.15	0.27	<20	0.23	0.35	0.21	0.36	0.24	0.00
21-30	0.58	0.23	0.37	0.25	0.35	0.15	21-30	0.33	0.61	0.36	0.16	0.23	0.32
31-40	0.31	0.10	0.23	0.03	0.33	0.08	31-40	0.22	0.16	0.13	0.15	0.22	0.16
41-50	0.21	0.05	0.08	0.04	0.15	0.07	41-50	0.12	0.23	0.07	0.00	0.12	0.06
>50	0.04	0.05	0.04	0.00	0.04	0.00	>50	0.04	0.08	0.02	0.00	0.02	0.00
Totale	0.24	0.10	0.17	0.06	0.19	0.08	Totale	0.15	0.28	0.12	0.11	0.13	0.14

Alcol	2014		2013		2012		Alcol	2014		2013		2012	
	M	F	M	F	M	F		nativi	non nativi	nativi	non nativi	nativi	non nativi
<20	2.42	1.46	2.91	1.32	1.71	1.08	<20	1.82	2.81	2.07	2.53	1.26	2.31
21-30	2.59	0.86	2.59	1.04	1.96	0.93	21-30	1.27	3.21	1.45	3.02	1.09	2.59
31-40	2.46	1.06	1.90	0.60	2.21	0.67	31-40	1.32	3.37	0.92	2.39	0.88	3.80
41-50	2.41	0.94	1.47	0.73	1.91	0.59	41-50	1.32	4.25	0.84	2.96	0.98	3.21
>50	2.15	0.86	1.65	0.67	1.48	0.66	>50	1.31	3.55	1.02	2.56	0.94	2.63
Totale	2.38	0.97	1.89	0.76	1.86	0.71	Totale	1.35	3.52	1.08	2.70	0.98	3.11

Tab. 13 - Ricerca sulla prevalenza di disturbi, con e senza sostanze nell'area metropolitana di Bologna*. Periodo 2013-2014 (alcol, tabacco, illegali, shopping compulsivo, gioco d'azzardo patologico, dipendenza da internet e disturbi dell'alimentazione)

		Maschi (407)	Femmine (431)	Totale (838)
Gioco	Gioca	43%	27%	34%
	Spesa >50 Euro mese	13%	4%	8%
	Giocatore problematico (test Fisher)	1%	0	0.50%
Shopping	Dipendenza (test CBS)	4%	6%	5%
Internet	Dipendenza (test IADQ)	1.50%	2.80%	2.20%
Alcol	Uso ultimo anno	86%	73%	79%
	Binge drinking (ultimo mese)	23%	10%	16%
	Dipendenza (test CAGE)	18%	11%	15%
Alimentazione	Sottopeso (BMI)	1%	9%	5%
	Sovrappeso (BMI)	41%	25%	33%
Tabacco	Uso ultimo anno	55%	38%	46%
	>10 sigarette al giorno	34%	18%	26%
	Dipendenza medio/alta (test Fagerstrom)	27%	14%	20%
Sostanze illegali	Uso ultimo anno	28.0%	19.0%	23.0%
	Molto coinvolto (test DAST10)	16.0%	7.0%	11.0%
	% Cannabis last year	16.0%	16.0%	21.0%
	% Cocaina last year	2.6%	4.5%	6.6%
	% MDMA last year	4.4%	2.3%	3.3%
	% Eroina last year	1.2%	0.2%	0.7%

* Campionamento per quote (età, sesso, popolazione residente 18-64anni)

** Escluso dipendenza

Tabella 14: Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2012-2015 - Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: frequenza per mese

MESE ▼	decessi per overdose		
	2012	2013	2014
Gennaio	2	1	2
Febbraio	1	0	1
Marzo	3	4	2
Aprile	3	2	1
Maggio	1	0	1
Giugno	1	1	0
Luglio	1	1	2
Agosto	3	4	0
Settembre	0	2	0
Ottobre	0	1	1
Novembre	0	2	1
Dicembre	1	1	1
Gennaio-Dicembre	16	19	12

MESE ▼	accessi ai PS per overdose da sostanze illegali		
	2012	2013	2014
Gennaio	3	9	6
Febbraio	12	4	9
Marzo	18	7	8
Aprile	9	3	5
Maggio	6	16	10
Giugno	13	9	8
Luglio	8	16	6
Agosto	7	12	9
Settembre	8	15	4
Ottobre	11	7	11
Novembre	6	9	7
Dicembre	12	5	15
Gennaio-Dicembre	113	112	98