



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Rapporto 2016 sulle dipendenze in area metropolitana

*quadro epidemiologico
caratteristiche tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d'azzardo problematici,
attività dei servizi*

A cura di Raimondo Maria Pavarin
Con la collaborazione di Silvia Marani, Elsa Turino, Giovanni Coccagna

Azienda USL di Bologna
DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Via S. Isaia, 94/A
Tel. 051/6584313 – Fax. 051/6584315
<http://www.ausl.bologna.it/oem>

Si ringraziano

*Luana Capitani – AUSL di Bologna – U.O.S.D Ser. T Bologna Ovest
Simonetta Cioni – AUSL Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Orietta Venturi – AUSL di Bologna – Equipe carcere U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Stefania Bongiovanni e Daniele Campedelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Pianura Ovest
Catia Leoni – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Sert Bologna Est
Elisabetta Bacchini – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert Budrio
Giorgia Paoletti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T San Lazzaro di Savena
Leonardo Piscitelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Vergato
Cristina Nasonte – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert San Giorgio di Piano
Simona Sarti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Zola*

*Moreno Astorri – Opera Padre Marella, Comunità “La Sorgente”
Marco Sirotti – Cooperativa Sociale “Il Pettiroso”
Manuela Civettini– Opegroup Dipendenze
Hazem Cavina – Cooperativa Sociale “ASAT”*

*Vincenza Perlangeli – Ausl Bologna – U.O.C. Epidemiologia, promozione della salute e comunicazione del rischio
Antonietta Moschetti – Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi – Tecnologie e Sistemi Informatici*

Sono inoltre disponibili on line sul sito dell'Osservatorio.

<http://www.ausl.bologna.it/oem>

1 – Dati statistici

2 – Mappa dei servizi pubblici e privati per le dipendenze in area metropolitana

Il consumo problematico di sostanze illegali

Dopo il calo degli anni scorsi, aumenta il numero di consumatori problematici di stupefacenti (nel dettaglio, diminuiscono per l'eroina e aumentano per la cocaina, stabile la cannabis), in particolare aumentano gli accessi al Pronto Soccorso (PS). In aumento il numero di soggetti con abuso concomitante di alcol, di benzodiazepine e di altri farmaci; diminuisce l'uso di sostanze per via iniettiva.

Cambiano le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche: rispetto all'anno precedente è in aumento l'età media, il numero di femmine, di nativi e di non residenti.

Si segnala la diminuzione del numero di decessi per overdose (10 nel 2016 rispetto ai 15 nel 2015).

Tra gli utenti SERT diminuisce il numero di positivi all'HIV, all'Epatite C ed all'Epatite B ed aumenta la percentuale dei soggetti testati.

Il consumo problematico di alcol

Diminuisce il numero complessivo e quello di nuovi accessi di persone con consumo problematico di alcol. In aumento il numero di femmine e di accessi ai servizi ospedalieri (Pronto Soccorso ed Ospedale).

I non nativi

I non nativi con consumo problematico di alcol e di sostanze illegali non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea.

I residenti

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti, è in calo l'incidenza di consumo problematico di alcol, oppioidi, cocaina e cannabis. L'incidenza è più elevata tra i maschi e tra i non nativi.

Per le sostanze illegali si segnalano i soggetti con età compresa tra 15 e 24 anni; per l'abuso di alcol i soggetti di età compresa tra 20 e 24 anni.

I minori

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 18 anni è in aumento il consumo problematico di sostanze illegali, in particolare (anche se su valori bassi) di eroina.

Il gioco d'azzardo problematico

Aumenta il numero di soggetti che si presentano ai SERT per problemi dovuti al gioco. Si stima una prevalenza di GAP di 1.8 per mille residenti.

Cosa emerge dagli studi

- I soggetti che si presentano ad un PS per una overdose rappresentano un target specifico per interventi di prevenzione mirati.
- Molti consumatori di sostanze illegali "socialmente integrati" si impongono delle regole per evitare problemi specifici.
- I minori di seconda generazione si distinguono per particolari stili di vita correlati all'abuso di alcol, uso di marijuana e consumo intensivo di tabacco.
- La crisi economica sta modificando il mercato delle sostanze e le abitudini dei consumatori;

1 - Il consumo problematico di sostanze illegali

Rispetto agli anni precedenti, aumenta l'età media e aumenta il numero di soggetti che si sono rivolti ad un SERT, o ad un pronto soccorso o che sono stati ricoverati in un ospedale per problemi dovuti al consumo di sostanze illegali (Consumo Problematico – CP).

Calano gli utenti dei SERT (compresi Unità Mobile e Carcere), rimangono stabili i ricoveri ospedalieri, aumentano gli accessi al Pronto Soccorso. Per quanto riguarda le caratteristiche anagrafiche, aumentano le femmine, i nativi ed i non residenti. Per quanto riguarda le sostanze, diminuisce il numero di CP di oppioidi, aumentano i CP di cocaina e di cannabis.

Tra i residenti, mediamente più anziani rispetto ai non residenti, osserviamo una quota più elevata di femmine e di accessi al SERT. Tra i non residenti invece troviamo una percentuale più alta di non nativi e di CP di cocaina. I non nativi si caratterizzano per l'elevata prevalenza di soggetti con CP di cocaina e di cannabis.

Per quanto riguarda le sostanze di abuso, il 96% dei soggetti con problemi dovuti ad abuso di oppioidi sono seguiti dai SERT. Tra le persone con abuso di cocaina osserviamo la quota più elevata di non residenti; le persone con consumo problematico di cannabis si rivolgono ai servizi sanitari ospedalieri in percentuale più elevata rispetto ai consumatori problematici di oppioidi e di cocaina. Da rilevare che l'incidenza su mille residenti è più elevata tra i CP di cocaina ed il rapporto sconosciuti/conosciuti (consumatori stimati/consumatori che si rivolgono al SERT) è più alto tra i CP di cannabis.

Le sostanze di abuso

		Oppioidi	Cocaina	Cannabis
Caratteristiche	Numero	2273	1100	563
	Età media	41.3	38.0	34.4
	% nuovi	11.3	24.7	35.0
	% femmine	20.9	15.1	13.9
	% non residenti	24.2	30.6	29.5
	% non nativi	19.8	29.0	29.8
	% SERT	96.3	90.1	84.6
Servizi	% Pronto Soccorso	7.2	14.8	17.6
	% Ospedale	5.6	8.6	12.4
Dati epidemiologici	Incidenza x 1000 residenti	0.19	0.21	0.18
	Prevalenza x 1000 residenti	3.03	1.34	0.70
	Stima numero oscuro	2987	1255	771
	Rapporto sconosciuti/conosciuti	1.55	1.79	2.35

Per quanto riguarda i servizi, l'accesso è più frequente al SERT, soprattutto per soggetti con problemi dovuti all'eroina. L'ospedale si caratterizza per una fascia di utenza con età mediamente più elevata e per la maggiore presenza di femmine; il Pronto Soccorso per la maggiore presenza di non residenti e di non nativi. Altro aspetto degno di nota riguarda i nuovi contatti, ed i servizi sanitari di emergenza (PS) ed il Carcere si confermano tra i principali punti di primo accesso per il consumo problematico di sostanze illegali.

Nel corso del tempo diminuisce la percentuale degli utenti SERT positivi all' HIV, all'Epatite C ed all'Epatite B. Si segnala l'aumento della quota di soggetti con almeno un test effettuato.

Il monitoraggio dello stato di salute degli utenti SERT

% positivi	HIV	Epatite C	Epatite B
2016	9.1	42.2	48.3
2015	10.0	51.3	49.9
% con almeno un test			
2016	72.2	72.9	73.7
2015	69.2	70.4	74.3

2 - Il consumo problematico di alcol

Alcohol use disorders (AUD): dati epidemiologici

	2016	2015	2014
Incidenza x 1000 residenti	0.98	1.14	1.35
Prevalenza x 1000 residenti	3.12	3.27	3.71
Stima numero oscuro	3743	3345	3986
Conosciuti/sconosciuti	4.5	3.8	4.4

Rispetto agli anni precedenti, aumenta l'età media e cala il numero complessivo di persone con CP di alcol (AUD). Mentre le femmine aumentano rispetto all'anno precedente, la diminuzione coinvolge le diverse tipologie di soggetti (nativi e non nativi, residenti e non residenti) e gli alcolisti seguiti dal SERT (compreso il carcere) e gli utenti tossicodipendenti dei SERT con abuso concomitante di alcol. Si nota invece un lieve aumento per i servizi ospedalieri (Pronto Soccorso ed Ospedale). Il calo del numero di soggetti con problemi alcol correlati si conferma anche utilizzando i dati relativi ai residenti, diminuiscono infatti sia la prevalenza che l'incidenza. Da segnalare l'aumento della stima del sommerso ed il rapporto conosciuti/sconosciuti.

3 – I non nativi

I non nativi con consumo problematico di alcol e di sostanze illegali non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea. In particolare per l'alcol si evidenziano nell'ordine i nativi dell'Europa dell'Est, dell'Africa mediterranea e dell'Asia; per le sostanze illegali i nativi dell'Africa mediterranea, dell'Europa dell'Est e di altri paesi europei. Per quanto riguarda le sostanze illegali, il 60% ha un consumo problematico dovuto ad uso oppioidi (in diminuzione), il 42% dovuto ad uso di cocaina (in aumento).

Zona di provenienza dei non nativi

	Sostanze illegali	Alcol
Totale	753	617
% Europa Est	21.9	45.4
% Altri paesi europei	8.9	6.0
% Asia	7.7	9.1
% Africa Mediterranea	52.7	26.9
% Altra Africa	3.1	5.5
% America Latina	5.3	5.7

Per quanto riguarda i settori di contatto, la maggior parte dei soggetti con abuso di sostanze illegali si rivolge al SERT (in diminuzione), in molti casi in seguito ad una carcerazione, mentre invece chi ha problemi con l'alcol accede di preferenza al Pronto Soccorso (in aumento).

I servizi a cui si rivolgono i non nativi

	Sostanze illegali	Alcol
% Ospedale	4.8	18.6
% Pronto soccorso	18.7	61.4
% SERT	78.9	29.0
% di cui anche Carcere	41.6	8.1
% di cui anche Unità Mobile	13.4	1.9

4 – I residenti

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti, in entrambi i sessi, è in calo l'incidenza di consumo problematico di alcol, cocaina e cannabis. Per quanto riguarda invece il consumo problematico di oppioidi, l'incidenza è in diminuzione tra i maschi ed in leggero aumento tra le femmine.

Consumo problematico di sostanze illegali e di alcol – incidenza per mille residenti

	Alcol		Oppioidi		Cocaina		Cannabis	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
2016	1.33	0.32	0.26	0.12	0.36	0.06	0.29	0.07
2015	1.69	0.61	0.28	0.11	0.48	0.10	0.36	0.07
2014	1.92	0.79	0.31	0.16	0.48	0.09	0.42	0.08
2013	1.91	0.73	0.31	0.09	0.57	0.08	0.50	0.09
2012	1.85	0.71	0.37	0.11	0.34	0.05	0.36	0.06
2011	1.83	0.64	0.45	0.13	0.39	0.07	0.32	0.05
2010	1.58	0.52	0.44	0.14	0.46	0.07	0.28	0.04
2009	1.72	0.62	0.61	0.20	0.33	0.08	0.29	0.04

Tra le persone con consumo problematico di sostanze illegali, l'incidenza su mille residenti è più elevata tra i non nativi, in particolare tra i soggetti con età inferiore a 30 anni. Sia tra i nativi che tra i non nativi si segnalano i CP con età compresa tra 15 e 24 anni.

Tra i soggetti con abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi in tutte le classi di età; tra i nativi l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 20 e 24 anni, tra i non nativi nelle classi di età 40/44 anni e 55/59 anni.

Nativi e non nativi: incidenza per mille residenti

	Sostanze illegali		Alcol	
	Nativi	Non nativi	Nativi	Non nativi
Totale	0.60	0.97	0.80	2.05
15-19 anni	1.21	2.32	0.98	1.27
20-24 anni	1.21	2.10	1.25	2.43
25-29 anni	0.85	1.08	0.81	1.97
30-34 anni	0.87	0.86	0.53	1.95
35-39 anni	0.74	0.98	0.48	2.18
40-44 anni	0.57	0.57	0.70	2.58
45-49 anni	0.54	0.35	0.79	1.98
50-54 anni	0.32	0.91	0.86	1.52
55-59 anni	0.26	0.77	0.85	2.69
60-64 anni	0.21	0.30	0.92	1.21

Per quanto riguarda il genere, sia per il consumo problematico di sostanze illegali, che per l'abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i maschi in tutte le classi di età.

Per quanto riguarda le sostanze illegali, l'incidenza è più elevata per i maschi di età compresa tra 30 e 34 anni,, tra le femmine nella fascia di età compresa tra 15 e 19 anni.

Per quanto riguarda l'alcol, sia tra i maschi che tra le femmine l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 20 e 24 anni.

Differenze di genere: incidenza per mille residenti

	Sostanze illegali		Alcol	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Totale	1.00	0.32	1.33	0.64
15-19 anni	1.70	1.00	1.32	0.70
20-24 anni	1.60	0.47	1.93	0.94
25-29 anni	1.67	0.49	1.43	0.78
30-34 anni	1.82	0.08	1.07	0.70
35-39 anni	1.02	0.33	1.35	0.36
40-44 anni	0.70	0.36	1.23	0.71
45-49 anni	0.53	0.19	1.25	0.62
50-54 anni	0.33	0.20	1.25	0.60
55-59 anni	0.25	0.13	1.45	0.62
60-64 anni	0.29	0.15	1.33	0.59

5 – Gli accessi al pronto soccorso

Il numero di soggetti che accedono ai PS per consumo problematico di sostanze illegali è in aumento rispetto al 2015. Aumentano l'età media e la percentuale di femmine e di residenti, stabile la quota di non nativi. Mentre rimane stabile la percentuale di "codici rossi", diminuisce la quota di accessi coatti e gli arrivi di notte e nei week end. Diminuisce la quota di accessi per CP di oppioidi, cannabis e cocaina; aumenta la percentuale di accessi per abuso concomitante di alcol e di psicofarmaci. Per quanto riguarda i problemi correlati, aumenta la percentuale di accessi per autolesione/tentato suicidio, per aggressioni/atti violenti e per incidenti stradali; si segnala la diminuzione degli accessi per overdose.

Il numero di soggetti che accedono ai PS per CP di alcol è stabile rispetto al 2015. Oltre alla percentuale di soggetti con più di un accesso, aumentano l'età media, la quota di femmine, di non residenti e di non nativi.

Si segnala inoltre l'aumento della percentuale di soggetti che vengono ricoverati.

Per quanto riguarda gli eventi traumatici, aumenta la percentuale di accessi per cadute accidentali, incidenti stradali e aggressioni/atti violenti.

6 – I ricoveri ospedalieri

Rispetto al 2015, è stabile il numero di ricoveri per abuso/dipendenza da sostanze illegali, ma aumenta il numero di soggetti ricoverati. Si segnala l'aumento dell'età media e della quota di residenti, e la diminuzione della percentuale di non nativi. Per quanto riguarda le sostanze, in diminuzione la percentuale di soggetti con abuso/dipendenza da oppioidi ed in aumento di quelli con abuso/dipendenza da cannabis e da cocaina. Per quanto riguarda i ricoveri per problemi alcol correlati, è in aumento sia il numero di ricoveri che il numero di soggetti. Aumentano l'età media al ricovero, la percentuale di femmine, di non nativi e di non residenti. Si segnala l'aumento del numero di ricoveri per dipendenza da alcol e per abuso di alcolici.

7 – I nuovi utenti dei SERT

Il numero di nuovi accessi ai SERT per CP di sostanze illegali è stabile rispetto allo scorso anno: diminuiscono l'età media, la percentuale di soggetti con uso di oppioidi, il numero di persone con uso di sostanze in vena, la quota di positivi all'epatite C ed all'HIV. In aumento il numero di persone con uso di cocaina (55%) e di cannabis (35%), la percentuale di non residenti, di non nativi (44%) e di persone senza fissa dimora. Si segnala l'aumento della percentuale di accessi tramite il carcere (39%) e la diminuzione dei nuovi utenti dell'Unità Mobile Metadone.

Il numero di nuovi utenti SERT con dipendenza da alcol è in diminuzione rispetto al 2015. Diminuiscono l'età media e la percentuale di disoccupati e di positivi all'epatite C. In aumento la percentuale di residenti, di femmine, di non nativi (27%) e di persone senza fissa dimora (6%).

8 – I minori

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 18 anni è in diminuzione l'incidenza (nuovi casi su 1000 residenti) del consumo problematico di alcol in entrambi i sessi ed in relazione alla nazione di nascita.

In aumento invece il consumo problematico di sostanze illegali.

Si segnala, anche se su valori bassi, l'aumento del consumo problematico di eroina e di cocaina.

Alcol: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-18 anni

Alcol <=18	2012	2013	2014	2015	2016
Totale	0.85	0.99	1.14	1.03	0.63
Maschi	0.97	1.27	1.36	1.17	0.73
Femmine	0.72	0.70	0.90	0.87	0.53
Nativi	0.75	0.98	1.20	0.86	0.64
Non nativi	1.45	1.07	0.74	2.10	0.61

Sostanze illegali: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-18 anni

Illegali <=18	2012	2013	2014	2015	2016
Totale	0.61	0.57	0.48	0.50	0.73
Maschi	0.97	0.78	0.80	0.74	1.04
Femmine	0.23	0.35	0.13	0.25	0.41
Nativi	0.38	0.49	0.38	0.49	0.62
Non nativi	2.10	1.07	1.04	0.60	1.52
Eroina	0.02	0.15	0.06	0.08	0.18
Cocaina	0.07	0.02	0.06	0.06	0.08
Cannabis	0.35	0.30	0.33	0.36	0.32

9 – Il sistema di allerta rapida sulle droghe

Nell'area metropolitana di Bologna nel 2016, rispetto all'anno precedente, diminuisce il numero di decessi per overdose e rimane stabile il numero di accessi ai PS per overdose non letali. In diminuzione anche l'età media, che è di 31.5 anni per i decessi e di 37.9 anni per gli accessi ai PS. Tra i decessi aumenta la quota di non nativi e di persone non conosciute al SERT.

	Il sistema di allerta rapida*			
	Decessi per overdose		Accessi ai PS per overdose	
	Numero	Età media	Numero	Età media
2012	16	36.9	113	36.4
2013	19	38.7	112	37.9
2014	12	39.4	98	38.0
2015	15	44.1	86	38.2
2016	10	31.5	85	37.9

* <https://allertarapidadroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

10 – Il gioco d'azzardo problematico

Il numero di soggetti che si presentano ai SERT per problemi dovuti al gioco è in aumento nel tempo (32 utenti nel 2009, 183 utenti nel 2016). In aumento anche l'età media (49.5 anni) e la percentuale di femmine (20%). Nel periodo 2000/2015, utilizzando i dati degli utenti dei Centri di Salute Mentale, dei SERD e dei ricoveri ospedalieri, nell'area metropolitana di Bologna si stima una prevalenza di persone con problemi dovuti al gioco che necessitano di un trattamento di 1.8 per mille residenti.

11 – I risultati degli studi dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze pubblicati nella letteratura internazionale

Nel corso del 2016 sono stati pubblicati in riviste internazionali alcuni studi condotti nell'area metropolitana di Bologna. Qui di seguito la sintesi dei risultati.

Accessi al Pronto soccorso per overdose e rischio di decesso per overdose¹ - Studio di follow up su 294 accessi per overdose nei reparti di Pronto Soccorso (PS) dell'ASL Bologna nel periodo 1997/2013. Il rischio di una successiva overdose letale è molto elevato. Risultano avere un rischio maggiore i maschi, i soggetti con età superiore a 30 anni, i pazienti che rifiutano i trattamenti proposti, chi è stato precedentemente in contatto con un servizio di Salute Mentale. Il rischio è più elevato nell'anno successivo al primo accesso al PS: i soggetti che si presentano ad un PS rappresentano un target specifico per interventi di prevenzione mirati.

Prima consumatori, poi socialmente integrati: risultati di uno studio su 100 consumatori italiani di sostanze illegali che non si sono mai rivolti ad un servizio pubblico o privato per le dipendenze² - Dalle interviste emergono traiettorie di consumo discontinue nel tempo in relazione a variazioni nella disponibilità di denaro e nel rapporto con le sostanze. La maggior parte degli intervistati teme di essere stigmatizzato o etichettato come un tossicodipendente e di procurarsi danni fisici, psicologici o economici. Solo una minoranza teme di sviluppare dipendenza. Il comportamento protettivo più diffuso consiste nell'acquistare le sostanze da canali di fiducia diretti, nel limitare frequenza e dosaggio, e di consumare solo in stati emotivi positivi.

Consumi a rischio, motivi d'uso, status migratorio e normalizzazione: i risultati di uno studio italiano su minori di età compresa tra 13 e 16 anni³ - 2095 minori sono stati intervistati nelle scuole medie inferiori (terza) e superiori (prima e seconda) in quattro regioni italiane (Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Campania). I giovani nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero (seconda generazione) si distinguono per una elevata prevalenza di disturbi psichici percepiti e per particolari stili di vita correlati all'abuso di alcol, uso di marijuana e consumo intensivo di tabacco. I minori di seconda generazione presentano sintomi di malessere psicologico, ansia e depressione e l'uso di sostanze psicoattive sembra realizzare una particolare forma di autocura.

¹ Pavarin, R. M., Berardi, D., & Gambini, D. (2016). Emergency department presentation and mortality rate due to overdose: A retrospective cohort study on nonfatal overdoses. *Substance abuse*, 37(4), 558-563.

² Pavarin, R. M. (2016). First consumers, then socially integrated: results of a study on 100 Italian drug users who had never turned to public or private addiction services. *Substance use & misuse*, 51(7), 892-901.

³ Pavarin, R. M., Emiliani, F., Passini, S., Mameli, C., & Palaretti, L. (2016). Risky consumption, reasons for use, migratory status and normalization: the results of an Italian study on minors aged between 13 and 16. *International Journal of Migration, Health and Social Care*, 12(4).

Crisi economica, consumo socialmente integrato e riduzione del danno. Nuove idee per la prevenzione⁴ - Questo contributo è strutturato in quattro sezioni: 1) una parte teorica, che riporta in modo sintetico il cammino percorso per arrivare alla definizione di consumo socialmente integrato; 2) una parte empirica, dove viene commentato il risultato di alcune recenti ricerche condotte nella regione Emilia Romagna, i cui risultati offrono ulteriori spunti di discussione; 3) una riflessione su come la crisi economica stia modificando il mercato e le abitudini dei consumatori; 4) una proposta per nuovi modelli di prevenzione.

⁴ Pavarin R (2016). Economic Crisis, Socially Integrated Consumption and Harm Reduction: New Ideas for Prevention. SALUTE E SOCIETÀ, vol. 2, p. 19-35

Anno 2016 e precedenti: tabelle dei dati

- Tab. 1 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2016
- Tab. 2 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2016
- Tab. 3 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2016
- Tab. 4 Consumatori problematici di eroina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2016
- Tab. 5 Caratteristiche soggetti con problemi alcol correlati. Periodo 2009-2016
- Tab. 6 Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2016
- Tab. 7 Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2016
- Tab. 8 Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2009-2016
- Tab. 9 Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di sostanze illegali: casi incidenti per anno. Periodo 2009-2016
- Tab. 10 Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di alcol: casi incidenti per anno. Periodo 2009-2016
- Tab. 11 Ricoveri ospedalieri per abuso/dipendenza sostanze illegali. Periodo 2009-2016
- Tab. 12 Ricoveri ospedalieri per abuso/dipendenza alcol. Periodo 2009-2016
- Tab. 13 Giocatori d'azzardo problematici in carico al SERT. Periodo 2009-2016
- Tab. 14 Utenti GAP 2016: esito del programma terapeutico per durata del trattamento
- Tab. 15 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche nuovi utenti in carico al SERT- Periodo 2009-2016
- Tab. 16 Consumo problematico alcol. Caratteristiche nuovi utenti in carico al SERT- Periodo 2009-2016
- Tab. 17 Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2016
- Tab. 18 Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2016
- Tab. 19 Consumo problematico sostanze psicoattive. Stima del sommerso. Periodo 2009-2016
- Tab. 20 Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2016
- Tab. 21 Deceduti per overdose in Emilia Romagna, ovunque residenti

Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2016

	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	3368		3348		3405		3461		3440		3636		3862		3771	
nuovi contatti	729	21.6	636	19.0	751	22.1	737	21.3	738	21.5	828	22.8	837	21.7	898	23.8
età media	40.0		39.6		39.3		38.1		37.9		38.1		37.7		37.0	
maschi	2702	80.2	2723	81.3	2777	81.6	2839	82.0	2775	80.7	2880	79.2	3050	79.0	2998	79.5
femmine	666	19.8	625	18.7	630	18.5	622	18.0	665	19.3	756	20.8	812	21.0	773	20.5
nativi	2608	77.4	2575	76.9	2620	76.9	2697	77.9	2699	78.5	2890	79.5	3101	80.3	3083	81.8
non nativi	753	22.4	772	23.1	780	22.9	758	21.9	741	21.5	746	20.5	761	19.7	688	18.2
residenti area metropolitana	2452	72.8	2490	74.4	2507	73.6	2467	71.3	2388	69.4	2572	70.7	2707	70.1	2611	69.2
residenti fuori area metropolitana	837	24.9	809	24.2	840	24.7	931	26.9	1011	29.4	1060	29.2	1081	28.0	1093	29.0
senza fissa dimora (SFD)	177	5.3	174	5.2	195	5.7	168	4.9	132	3.8	123	3.4	223	5.8	207	5.5
decesso overdose	10	0.3	15	0.4	12	0.4	19	0.5	16	0.5	8	0.2	5	0.1	8	0.2

oppioidi	2273	67.5	2400	71.7	2534	74.4	2474	71.5	2598	75.5	2703	74.3	2817	72.9	2839	75.3
di cui eroina	2152	63.9	2298	68.6	2349	69.0	2363	68.3	2485	72.2	2612	71.8	2732	70.7	2704	71.7
cocaina	1100	32.7	1058	31.6	1001	29.4	920	26.6	821	23.9	790	21.7	921	23.8	1142	30.3
di cui solo cocaina	608	18.1	549	16.4	511	15.0	508	14.7	434	12.6	426	11.7	456	11.8	439	11.6
cannabinoidi	563	16.7	487	14.5	510	15.0	522	15.1	417	12.1	376	10.3	378	9.8	461	12.2
di cui solo cannabinoidi	204	6.1	205	6.1	217	6.4	238	6.9	193	5.6	166	4.6	141	3.7	132	3.5
altre sostanze illegali	421	12.5	290	8.7	339	10.0	315	9.1	326	9.5	356	9.8	359	9.3	418	11.1
benzodiazepine	77	2.3	55	1.6	55	1.6	56	1.6	77	2.2	101	2.8	100	2.6	95	2.5
anche altri farmaci**	104	3.1	68	2.0	89	2.6	54	1.6	70	2.0	121	3.3	205	5.3	162	4.3
anche alcol	505	15.0	465	13.9	476	14.0	460	13.3	444	12.9	484	13.3	526	13.6	623	16.5
uso vena	1056	31.4	1114	33.3	1146	33.7	1180	34.1	1254	36.5	1362	37.5	1473	38.1	1371	36.4

Ospedale	254	7.5	250	7.5	283	8.3	187	5.4	215	6.3	265	7.3	326	8.4	214	5.7
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	3.4	162	4.3
Pronto soccorso	490	14.5	371	11.1	480	14.1	685	19.8	632	18.4	610	16.8	408	10.6	449	11.9
SERT	2742	81.4	2837	84.7	2854	83.8	2858	82.6	2908	84.5	3029	83.3	3189	82.6	3027	80.3
di cui anche Carcere	525	15.6	609	18.2	637	18.7	624	18.0	693	20.1	690	19.0	654	16.9	522	13.8
di cui anche Unità Mobile Metadone	149	4.4	172	5.1	181	5.3	131	3.8	140	4.1	147	4.0	196	5.1	172	4.6

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

** psicofarmaci, antidepressivi, barbiturici e anche altri farmaci non specificati

Tab. 2 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2016

	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	753		772		780		758		741		746		761		688	
nuovi contatti	278	36.9	209	27.1	246	32.5	239	31.5	261	34.4	265	35.0	271	35.8	239	31.5
età media	34.7		34.6		33.7		33.6		32.8		32.9		32.7		32.2	
maschi	655	87.0	697	90.3	716	91.8	696	91.8	683	92.2	660	88.5	673	88.4	615	89.4
femmine	98	13.0	75	9.7	64	8.2	62	8.2	58	7.8	86	11.5	88	11.6	73	10.6
residenti area metropolitana	283	37.6	285	36.9	272	35.9	253	33.4	228	30.8	249	33.4	257	33.8	236	34.3
residenti fuori area metropolitana	415	55.1	449	58.2	460	60.7	458	60.4	484	65.3	496	66.5	457	60.1	427	62.1
senza fissa dimora (SFD)	99	13.1	72	9.3	98	12.9	72	9.5	46	6.2	54	7.2	70	9.2	61	8.9
decesso overdose	2	0.3	1	0.1	1	0.1	4	0.5	5	0.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0

oppioidi	450	59.8	501	64.9	528	69.7	494	65.2	500	67.5	526	70.5	537	70.6	501	72.8
di cui eroina	417	55.4	477	61.8	491	64.8	465	61.3	484	65.3	494	66.2	519	68.2	477	69.3
cocaina	319	42.4	312	40.4	295	38.9	249	32.8	222	30.0	182	24.4	203	26.7	295	42.9
di cui solo cocaina	180	23.9	160	20.7	153	20.2	139	18.3	131	17.7	107	14.3	106	13.9	104	15.1
cannabinoidi	168	22.3	142	18.4	173	22.8	157	20.7	118	15.9	80	10.7	74	9.7	110	16.0
di cui solo cannabinoidi	50	6.6	54	7.0	59	7.8	60	7.9	59	8.0	44	5.9	26	3.4	22	3.2
altre sostanze illegali***	93	12.4	71	9.2	77	10.2	74	9.8	69	9.3	67	9.0	75	9.9	82	11.9
benzodiazepine	12	1.6	14	1.8	17	2.2	10	1.3	14	1.9	15	2.0	11	1.4	16	2.3
anche altri farmaci**	16	2.1	14	1.8	14	1.8	11	1.5	11	1.5	23	3.1	29	3.8	29	4.2
anche alcol	109	14.5	99	12.8	92	12.1	87	11.5	95	12.8	83	11.1	87	11.4	105	15.3
uso vena	100	13.3	115	14.9	117	15.4	115	15.2	117	15.8	126	16.9	132	17.3	100	14.5

Ospedale	36	4.8	46	6.0	43	5.7	35	4.6	34	4.6	39	5.2	43	5.7	26	3.8
Pronto soccorso	141	18.7	100	13.0	107	14.1	145	19.1	122	16.5	115	15.4	107	14.1	82	11.9
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3.3	29	4.2
SERT	594	78.9	634	82.1	657	86.7	616	81.3	620	83.7	618	82.8	623	81.9	539	78.3
di cui anche Carcere	313	41.6	368	47.7	405	53.4	380	50.1	423	57.1	392	52.5	369	48.5	344	50.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	101	13.4	111	14.4	120	15.8	80	10.6	77	10.4	85	11.4	105	13.8	81	11.8

Area provenienza																
Europa Est	165	21.9	161	20.9	145	7.2	130	6.5	130	6.5	137	6.8	146	7.3	130	6.5
Altri paesi europei	67	8.9	73	9.5	77	9.9	91	12.0	78	10.5	90	12.1	102	13.4	95	13.8
Africa Mediterranea	397	52.7	417	54.0	438	21.7	420	20.9	424	21.1	412	20.5	413	20.5	368	18.3
Altra Africa	23	3.1	30	3.9	23	1.1	27	1.3	22	1.1	27	1.3	24	1.2	23	1.1
Asia	58	7.7	47	6.1	47	6.0	46	6.1	50	6.7	40	5.4	39	5.1	38	5.5
America Latina	40	5.3	33	4.3	37	1.8	28	1.4	26	1.3	30	1.5	29	1.4	28	1.4
USA e Canada	2	0.3	0	0.0	2	0.1	4	0.2	3	0.1	4	0.2	3	0.1	5	0.2
Altro	1	0.1	11	1.4	11	0.5	12	0.6	8	0.4	6	0.3	5	0.2	1	0.0

Nazione																
Tunisia	196	26.0	208	26.9	230	29.5	206	27.2	201	27.1	181	24.3	168	22.1	140	20.3
Marocco	164	21.8	159	20.6	157	20.1	158	20.8	166	22.4	161	21.6	168	22.1	145	21.1
Romania	38	5.0	36	4.7	37	4.7	28	3.7	33	4.5	31	4.2	28	3.7	19	2.8
Algeria	33	4.4	49	6.3	50	6.4	55	7.3	57	7.7	68	9.1	76	10.0	83	12.1
Albania	28	3.7	27	3.5	32	4.1	31	4.1	25	3.4	19	2.5	31	4.1	27	3.9

Tab. 3 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2009-2016

	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	729		636		751		737		738		828		837		898	
età media	34.8		34.8		35.3		32.2		33.9		35.5		35.7		35.0	
maschi	578	79.3	513	80.7	596	79.4	609	82.6	596	80.8	631	76.2	624	74.6	704	78.4
femmine	151	20.7	123	19.3	155	20.6	128	17.4	142	19.2	197	23.8	213	25.4	194	21.6
nativi	448	61.5	427	67.1	505	67.2	498	67.6	477	64.6	563	68.0	566	67.6	659	73.4
non nativi	278	38.1	209	32.9	246	32.8	239	32.4	261	35.4	265	32.0	271	32.4	239	26.6
residenti area metropolitana	380	52.1	366	57.5	441	58.7	417	56.6	347	47.0	448	54.1	421	50.3	441	49.1
residenti fuori area metropolitana	314	43.1	255	40.1	292	38.9	299	40.6	376	50.9	379	45.8	387	46.2	423	47.1
senza fissa dimora (SFD)	36	4.9	32	5.0	46	6.1	24	3.3	25	3.4	17	2.1	54	6.5	44	4.9
decesso overdose	5	0.7	8	1.3	9	1.2	5	0.7	7	0.9	3	0.4	2	0.2	3	0.3
oppioidi	257	35.3	243	38.2	353	47.0	248	33.6	325	44.0	379	45.8	385	46.0	488	54.3
di cui eroina	194	26.6	214	33.6	239	31.8	193	26.2	269	36.4	288	34.8	344	41.1	421	46.9
cocaina	272	37.3	241	37.9	238	31.7	208	28.2	182	24.7	177	21.4	159	19.0	268	29.8
di cui solo cocaina	200	27.4	172	27.0	166	22.1	159	21.6	139	18.8	141	17.0	120	14.3	132	14.7
cannabinoidi	197	27.0	161	25.3	205	27.3	235	31.9	161	21.8	126	15.2	96	11.5	137	15.3
di cui solo cannabinoidi	100	13.7	99	15.6	125	16.6	151	20.5	111	15.0	95	11.5	67	8.0	51	5.7
altre sostanze illegali***	195	26.7	137	21.5	169	22.5	169	22.9	180	24.4	206	24.9	270	32.3	259	28.8
benzodiazepine	12	1.6	12	1.9	6	0.8	10	1.4	15	2.0	0	0.0	38	4.5	17	1.9
anche altri farmaci**	30	4.1	26	4.1	54	7.2	21	2.8	23	3.1	62	7.5	135	16.1	63	7.0
anche alcol	112	15.4	104	16.4	130	17.3	121	16.4	138	18.7	129	15.6	75	9.0	156	17.4
uso vena	41	5.6	56	8.8	75	10.0	47	6.4	98	13.3	98	11.8	105	12.5	103	11.5

Ospedale	106	14.5	99	15.6	171	22.8	73	9.9	82	11.1	133	16.1	188	22.5	101	11.2
Pronto soccorso	254	34.8	176	27.7	232	30.9	348	47.2	307	41.6	271	32.7	195	23.3	261	29.1
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2.6	73	8.1
SERT	373	51.2	370	58.2	369	49.1	333	45.2	370	50.1	450	54.3	466	55.7	459	51.1
di cui anche Carcere	165	22.6	117	18.4	119	15.8	123	16.7	196	26.6	193	23.3	177	21.1	197	21.9
di cui anche Unità Mobile Metadone	32	4.4	43	6.8	58	7.7	27	3.7	0	0.0	30	3.6	61	7.3	33	3.7

Tab. 4 – Consumatori problematici di eroina. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2009-2016

	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	194		214		239		193		269		288		344		421	
età media	32.3		33.6		34.4		31.4		32.3		32.1		30.7		30.1	
maschi	158	81.4	179	83.6	191	79.9	165	85.5	221	82.2	244	84.7	293	85.2	356	84.6
femmine	36	18.6	35	16.4	48	20.1	28	14.5	48	17.8	44	15.3	51	14.8	68	16.2
nativi	93	47.9	129	60.3	138	57.7	111	57.5	155	57.6	177	61.5	198	57.6	289	68.6
non nativi	101	52.1	85	39.7	101	42.3	82	42.5	114	42.4	111	38.5	146	42.4	132	31.4
residenti area metropolitana	71	36.6	90	42.1	98	41.0	63	32.6	74	27.5	108	37.5	97	28.2	148	35.2
residenti fuori area metropolitana	109	56.2	112	52.3	136	56.9	114	59.1	184	68.4	179	62.2	226	65.7	247	58.7
decesso overdose	5	2.6	8	3.7	9	3.8	5	2.6	7	2.6	3	1.0	0	0.0	0	0.0

Cocaina	61	31.4	69	32.2	65	27.2	46	23.8	41	15.2	27	9.4	39	11.3	128	30.4
Cannabinoidi	26	13.4	15	7.0	31	13.0	40	20.7	20	7.4	14	4.9	19	5.5	52	12.4
altre sostanze illegali***	3	1.5	6	2.8	19	7.9	2	1.0	7	2.6	6	2.1	2	0.6	14	3.3
benzodiazepine	2	1.0	4	1.9	0	0.0	1	0.5	2	0.7	0	0.0	1	0.3	6	1.4
anche altri farmaci**	5	2.6	13	6.1	11	4.6	3	1.6	6	2.2	1	0.3	9	2.6	24	5.7
anche alcol	7	3.6	13	6.1	16	6.7	7	3.6	19	7.1	10	3.5	13	3.8	44	10.5
uso vena	35	18.0	53	24.8	73	30.5	47	24.4	98	36.4	96	33.3	103	29.9	99	23.5

Ospedale	0	0.0	6	2.8	8	3.3	5	2.6	3	1.1	6	2.1	3	0.9	8	1.9
Pronto Soccorso	16	8.2	21	9.8	56	23.4	23	11.9	44	16.4	16	5.6	22	6.4	28	6.7
SERT	176	90.7	191	89.3	203	84.9	171	88.6	239	88.8	285	99.0	317	92.2	329	78.1
di cui anche Carcere	75	38.7	52	24.3	62	25.9	61	31.6	124	46.1	114	39.6	119	34.6	131	31.1
di cui anche Unità Mobile Metadone	28	14.4	42	19.6	58	24.3	26	13.5	30	11.2	30	10.4	58	16.9	32	7.6

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 5 - Caratteristiche soggetti con problemi alcol correlati. Periodo 2009-2016

	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	2579		2639		3158		2823		2784		2633		2906		2857	
nuovi contatti	1013	39.3	1059	40.1	1680	53.2	1288	45.6	1284	46.1	1214	46.1	933	32.1	1058	37.0
età media	49.0		48.8		47.9		47.1		47.9		47.6		46.7		46.0	
maschi	1885	73.1	1975	74.8	2322	73.5	2114	74.9	2081	74.7	1997	75.8	2181	75.1	2160	75.6
femmine	694	26.9	664	25.2	836	26.5	709	25.1	703	25.3	636	24.2	725	24.9	697	24.4
nativi	1945	75.4	2009	76.1	2349	74.4	2113	74.8	2085	74.9	2030	77.1	2304	79.3	2295	80.3
non nativi	617	23.9	630	23.9	809	25.6	710	25.2	699	25.1	603	22.9	602	20.7	562	19.7
residenti area metropolitana	2121	82.2	2203	83.5	2505	79.3	2261	80.1	2243	80.6	2138	81.2	2389	82.2	2289	80.1
residenti fuori area metropolitana	399	15.5	410	15.5	628	19.9	493	17.5	533	19.1	495	18.8	478	16.4	532	18.6
senza fissa dimora (SFD)	57	2.2	58	2.2	76	2.4	72	2.6	47	1.7	45	1.7	124	4.3	111	3.9

Alcolisti SERT	984	38.2	1049	39.7	1035	32.8	1022	36.2	943	33.9	951	36.1	1071	36.9	1029	36.0
Tossicodipendente concomitante SERT	183	7.1	200	7.6	181	5.7	182	6.4	171	6.1	184	7.0	175	6.0	187	6.5
anche Carcere	82	3.2	104	3.9	73	2.3	58	2.1	43	1.5	61	2.3	39	1.3	14	0.5
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	2.4	95	3.3
Ospedale	611	23.7	608	23.0	736	23.3	637	22.6	654	23.5	644	24.5	676	23.3	614	21.5
Pronto Soccorso	1196	46.4	1162	44.0	1678	53.1	1490	52.8	1509	54.2	1259	47.8	796	27.4	858	30.0

Tab. 6 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2009-2016

	nuovi 2016	%	nuovi 2015	%	nuovi 2014	%	nuovi 2013	%	nuovi 2012	%	nuovi 2011	%	nuovi 2010	%	nuovi 2009	%
Totale	1013		1059		1680		1288		1284		1214		933		1058	
Età media	45.5		46.0		45.9		43.6		45.0		44.3		44.6		44.4	
maschi	715	70.6	787	74.3	1218	72.5	947	73.5	942	73.4	908	74.8	687	73.6	812	76.7
femmine	298	29.4	272	25.7	462	27.5	341	26.5	342	26.6	306	25.2	246	26.4	246	23.3
nativi	675	66.6	753	71.1	1158	68.9	858	66.6	851	66.3	831	68.5	620	66.5	743	70.2
non nativi	325	32.1	306	28.9	522	31.1	430	33.4	433	33.7	383	31.5	313	33.5	315	29.8
residenti area metropolitana	708	69.9	791	74.7	1189	70.8	903	70.1	908	70.7	869	71.6	666	71.4	729	68.9
residenti fuori area metropolitana	272	26.9	258	24.4	481	28.6	332	25.8	375	29.2	343	28.3	249	26.7	311	29.4
senza fissa dimora (SFD)	9	0.9	12	1.1	12	0.7	14	1.1	8	0.6	2	0.2	25	2.7	18	1.7

Alcolisti SERT	145	14.3	171	16.1	183	10.9	179	13.9	161	12.5	153	12.6	141	15.1	158	14.9
Tossicodipendente concomitante SERT	19	1.9	28	2.6	25	1.5	22	1.7	17	1.3	21	1.7	14	1.5	19	1.8
anche Carcere	28	2.8	24	2.3	15	0.9	16	1.2	9	0.7	13	1.1	8	0.9	26	2.5
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.0	15	1.4
Ospedale	250	24.7	264	24.9	431	25.7	266	20.7	277	21.6	324	26.7	311	33.3	341	32.2
Pronto Soccorso	670	66.1	680	64.2	1162	69.2	924	71.7	949	73.9	825	68.0	522	55.9	611	57.8

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 7 – Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2016

	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	617		630		809		710		699		603		602		562	
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	325	52.7	306	48.6	522	64.5	430	60.6	433	61.9	383	63.5	313	52.0	315	56.0
età media	39.8		40.5		39.6		39.4		39.3		39.2		38.2		38.5	
maschi	449	72.8	454	72.1	595	73.5	520	73.2	511	73.1	448	74.3	459	76.2	422	75.1
femmine	168	27.2	176	27.9	214	26.5	190	26.8	188	26.9	155	25.7	143	23.8	140	24.9
residenti area metropolitana	374	60.6	390	61.9	484	59.8	413	58.2	432	61.8	367	60.9	369	61.3	328	58.4
residenti fuori area metropolitana	207	33.5	223	35.4	308	38.1	240	33.8	262	37.5	236	39.1	213	35.4	219	39.0
senza fissa dimora (SFD)	26	4.2	21	3.3	28	3.5	32	4.5	22	3.1	23	3.8	39	6.5	27	4.8

oppioidi	27	4.4	31	4.9	31	3.8	26	3.7	32	4.6	33	5.5	71	11.8	83	14.8
cocaina	43	7.0	42	6.7	34	4.2	22	3.1	21	3.0	15	2.5	32	5.3	57	10.1
di cui solo cocaina	40	6.5	39	6.2	31	3.8	20	2.8	16	2.3	12	2.0	19	3.2	23	4.1
cannabinoidi	23	3.7	19	3.0	25	3.1	26	3.7	25	3.6	10	1.7	6	1.0	15	2.7
di cui solo cannabinoidi	12	1.9	17	2.7	19	2.3	23	3.2	22	3.1	9	1.5	6	1.0	10	1.8
altre sostanze illegali***	35	5.7	16	2.5	26	3.2	26	3.7	31	4.4	24	4.0	25	4.2	38	6.8
benzodiazepine	13	2.1	5	0.8	12	1.5	11	1.5	8	1.1	2	0.3	3	0.5	11	2.0
anche altri farmaci**	18	2.9	31	4.9	25	3.1	17	2.4	23	3.3	13	2.2	13	2.2	34	6.0
uso vena	4	0.6	6	1.0	7	0.9	6	0.8	8	1.1	7	1.2	26	4.3	24	4.3

Ospedale	115	18.6	109	17.3	136	16.8	98	13.8	106	15.2	99	16.4	96	15.9	80	14.2
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.5	21	3.7
Pronto soccorso	379	61.4	353	56.0	549	67.9	491	69.2	501	71.7	391	64.8	314	52.2	271	48.2

Alcolisti SERT	179	29.0	204	32.4	196	24.2	193	27.2	164	23.5	153	25.4	172	28.6	147	26.2
Tossicodipendente concomitante SERT	33	5.3	38	6.0	34	4.2	31	4.4	24	3.4	28	4.6	74	12.3	82	14.6
di cui anche Carcere	50	8.1	56	8.9	40	4.9	32	4.5	20	2.9	24	4.0	50	8.3	46	8.2
di cui anche Unità Mobile Metadone	12	1.9	14	2.2	15	1.9	15	2.1	12	1.7	13	2.2	19	3.2	24	4.3

Area provenienza

Europa Est	280	45.4	271	43.0	368	45.5	288	40.6	276	39.5	232	38.5	210	34.9	186	33.1
Europa Nord	3	0.5	5	0.8	12	1.5	12	1.7	14	2.0	12	2.0	19	3.2	14	2.5
Europa Ovest	34	5.5	47	7.5	46	5.7	46	6.5	49	7.0	38	6.3	54	8.8	59	10.5
Asia Medio Orientale	11	1.8	10	1.6	13	1.6	12	1.7	18	2.6	13	2.2	16	2.7	13	2.3
Asia Orientale	6	1.0	12	1.9	11	1.4	10	1.4	14	2.0	4	0.7	6	1.0	7	1.2
Regione Indiana	33	5.3	43	6.8	46	5.7	35	4.9	49	7.0	36	6.0	30	5.0	33	5.9
Altra Asia o Sud Est Asiatico	6	1.0	5	0.8	11	1.4	7	1.0	5	0.7	8	1.3	7	1.2	7	1.2
Africa Mediterranea	166	26.9	162	25.7	208	25.7	185	26.0	172	24.6	154	25.5	180	30.0	152	27.0
Altra Africa	34	5.5	40	6.3	45	5.6	36	5.1	38	5.4	46	7.6	39	6.5	43	7.7
USA e Canada	6	1.0	5	0.8	8	1.0	7	1.0	3	0.4	4	0.7	5	0.8	11	2.0
America Latina	35	5.7	28	4.4	39	4.8	33	4.7	45	6.4	35	5.8	36	6.0	35	6.2
Altro	3	0.5	2	0.3	2	0.2	39	5.4	16	2.3	21	3.5	0	0.0	2	0.4

Tab. 8 Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2004-2016

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
KG HEROINA	39.3	44.5	9.4	65.9	37.7	22.5	52.7	25.3	9.2	30.6	2.4	11.9	3.9
KG COCAINA	76.1	89.3	88.8	82.9	54.1	39.9	38.4	33.5	28.4	35.0	22.0	10.7	54.4
KG HASCISH	310.7	183.3	153.6	229.9	905.5	506.8	66.7	140.7	157.7	38.2	41.8	63.1	69.5
KG MARIJUANA	3.5	8.5	5.0	13.2	2.2	41.0	4.44	89.7	170.7	68.0	75.2	69.2	46.8
operazioni	545	669	742	713	664	544	483	616	574	652	489	328	448
denunce	759	897	1202	1041	922	825	696	888	709	616	606	398	572
arresti	598	703	983	825	788	708	573	790	621	542	493	308	471
minori denunciati	50	38	45	29	22	23	14	17	11	12	9	15	16
non nativi denunciati	510	504	709	625	529	451	385	569	461	410	375	286	466

* I dati statistici riferiti al 2016 sono da considerare provvisori in attesa di consolidamento

Tab. 9 - Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di sostanze illegali: casi incidenti per anno. Periodo 2009-2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero soggetti	886	686	806	777	453	416	516	256
Più di un accesso	18.7	21.0	22.2	16.9	16.8	18.3	24.6	14.8

Caratteristiche

Femmine	25.2	20.1	24.4	18.8	22.3	21.2	17.8	22.3
età media	37.43	35.68	36.26	35.72	36.66	37.48	33.99	36.35
non nativi	30.1	30.6	24.6	23.8	19.0	17.8	26.7	19.9
Europa Est	10.5	6.3	4.7	5.8	6.0	3.1	4.7	4.7
Africa Mediterranea	13.0	14.3	12.2	11.1	7.1	9.4	13.0	6.3
non residenti	34.5	35.9	32.1	34.0	30.2	25.7	38.2	33.6

Arrivo

arrivo al ps di notte (dalle 20 alle 8)	47.7	49.3	41.6	50.5	39.3	43.0	48.3	42.2
arrivo nel week end	34.8	40.4	36.7	39.3	32.7	33.2	37.2	30.1
accesso al ps coatto	5.8	8.3	6.3	4.8	3.1	3.6	8.9	3.9

Triage

rosso	5.5	5.4	5.5	3.9	4.6	4.3	3.5	6.3
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Esito

rifiuta ogni trattamento	2.0	2.5	3.0	2.7	2.9	3.1	2.9	2.0
dimissione volontaria dal pronto soccorso	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.7	1.0	3.1

Sostanze

Anche alcol	27.9	25.8	26.4	18.9	17.2	21.4	16.1	16.0
Anche psicofarmaci	8.4	7.3	9.2	7.1	6.6	5.3	5.2	6.3
Oppioidi	17.5	23.2	28.0	40.4	53.9	54.8	41.5	63.7
Cocaina	24.5	26.4	19.1	22.1	20.8	20.2	23.1	12.5
Cannabis	15.7	19.1	18.9	22.8	16.1	11.3	12.8	7.8
Amfetamine	1.1	1.9	2.1	1.9	0.7	1.7	1.6	2.0
Altre sostanze illegali non indicate	45.5	27.4	34.7	24.5	23.6	16.6	24.0	20.7

Altri disturbi correlati

disturbi sistema cardiocircolatorio	27.5	26.2	12.5	24.3	20.3	20.9	15.9	13.3
disturbi apparato digerente	22.8	23.0	13.2	19.2	22.5	18.8	15.7	18.8
disturbi psichici e comportamentali	34.8	36.0	17.4	24.3	21.4	20.9	23.3	20.3
Traumatismi	26.6	22.6	13.4	19.0	19.0	19.7	15.5	16.8
Autolesione e tentato suicidio	8.2	6.3	4.1	5.1	3.5	3.8	2.7	5.5
Aggressioni e atti violenti	4.6	2.8	2.4	4.1	4.6	2.4	3.5	1.6
Incidenti stradali	7.2	6.4	3.7	4.8	4.0	6.3	4.5	5.1
Cadute accidentali	6.5	6.4	2.7	3.9	4.9	6.7	4.1	4.3
Overdose	4.6	7.7	5.3	6.2	0.0	0.0	3.9	0.0

Tab. 10 - Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di alcol: casi incidenti per anno. Periodo 2009-2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero soggetti	2007	2004	2426	2056	1386	1247	1570	1656
Più di un accesso	21.2	20.7	19.4	19.4	21.4	20.9	24.6	20.3
Caratteristiche								
Femmine	29.5	28.6	28.1	26.7	25.0	25.3	29.0	27.5
età media	44.39	43.85	43.26	42.22	45.30	43.83	39.19	41.65
residenti fuori area metropolitana	29.8	28.6	31.4	31.4	27.3	30.6	36.7	34.8
non nativi	32.2	30.9	34.6	33.1	33.8	30.8	38.0	31.5
Europa Est	14.2	12.4	14.4	14.1	13.8	12.5	14.4	11.2
Africa Mediterranea	7.8	7.3	8.3	7.7	8.0	8.4	8.6	7.7
Arrivo								
arrivo al ps di notte (dalle 20 alle 8)	57.9	60.1	33.8	59.0	56.3	59.3	26.2	60.4
arrivo nel week end	46.5	46.3	27.0	44.8	44.8	48.0	20.6	46.1
accesso al ps coatto	3.9	4.1	8.7	8.6	5.1	4.7	7.6	6.8
codice triage rosso	3.8	3.4	3.1	2.9	3.0	1.8	3.0	2.6
rifiuta ogni trattamento	2.6	3.5	3.0	3.2	4.6	3.2	3.1	2.2
dimissione volontaria dal pronto soccorso	0.5	0.6	0.7	2.8	3.6	1.8	1.5	2.7
successivo ricovero ospedaliero	11.9	7.3	11.3	2.9	1.8	1.5	2.0	2.1
Disturbi alcol-correlati								
sindrome astinenza	2.2	1.7	1.1	1.6	1.1	1.9	1.2	0.9
psicosi	1.5	2.0	1.4	1.0	1.0	0.9	0.5	1.6
intossicazione acuta	5.7	6.7	2.7	3.4	3.0	3.7	11.4	13.0
coma etilico	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	1.3	1.1
Uso sostanze								
Almeno un'altra sostanze psicoattiva illegale	4.4	9.1	8.7	11.5	8.2	7.6	8.3	6.5
Cannabis	1.8	2.0	2.1	1.9	1.9	1.0	1.1	0.8
Cocaina	2.7	2.6	1.6	1.8	0.9	1.1	1.2	1.0
Oppioidi	1.4	2.5	3.2	2.2	1.7	2.6	2.2	2.2
Anche psicofarmaci	6.1	7.6	4.7	3.8	3.4	3.1	3.4	5.0
Complicazioni								
Traumatismi	32.0	29.7	29.3	30.2	28.8	29.8	23.2	24.0
Autolesione e tentato suicidio	4.7	5.1	3.1	4.1	4.3	3.7	2.4	3.1
Aggressioni e atti violenti	6.2	4.8	5.8	5.0	3.4	3.4	3.2	3.4
Incidenti stradali	9.0	6.6	7.2	7.4	7.1	6.5	5.8	6.1
Cadute accidentali	14.1	13.6	11.8	12.5	12.6	14.2	10.0	9.8

Tab. 11 - Ricoveri ospedalieri per abuso/dipendenza sostanze illegali. Periodo 2009-2016*

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale ricoveri	440	449	342	342	409	442	427	467
Soggetti	343	335	295	310	365	393	361	395
media ricoveri per soggetto	1.28	1.34	1.16	1.10	1.12	1.12	1.18	1.18
Maschi	65.0	65.3	73.1	60.2	52.3	49.5	55.3	46.5
Femmine	35.0	34.7	26.9	39.8	47.7	50.5	44.7	53.5
età media	45.8	44.8	44.2	46.8	47.6	48.9	47.2	47.2
nativi	86.1	83.5	86.8	84.8	84.6	86.4	87.8	89.1
non nativi	13.9	16.5	13.2	15.2	14.7	13.6	12.2	10.9
residenti area metropolitana	90.2	89.1	89.2	88.9	90.5	88.5	87.1	91.4
residenti fuori area metropolitana	9.3	10.7	10.8	11.1	9.3	11.5	12.9	8.6
Dipendenza da droghe	17.0	20.0	31.0	26.6	24.2	23.1	23.7	22.3
Dipendenza da oppioidi	8.9	10.5	19.6	14.9	14.7	12.0	12.2	12.8
Dipendenza da cocaina	4.1	4.0	3.2	5.6	2.4	2.9	2.3	2.8
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	2.5	3.3	2.9	2.3	1.7	2.3	2.6	3.2
Altra dipendenza da droga	2.5	3.1	1.8	0.3	2.7	3.2	4.7	5.4
Dipendenza da cannabinoidi	1.4	1.1	2.0	3.8	1.2	0.5	0.2	0.4
Dipendenza da barbiturici	0.9	1.1	2.3	0.9	1.7	1.6	1.4	1.1
Dipendenza da amfetamine	0.2	0.7	0.0	1.2	0.5	0.0	0.2	0.2
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	0.2	0.2	1.5	0.3	0.5	1.8	0.0	0.0
Dipendenza da allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4
Abuso di droghe senza dipendenza	53.6	51.9	49.4	37.7	32.0	31.2	46.4	34.3
Abuso di cocaina	15.9	8.7	9.4	6.1	5.1	4.8	4.9	3.0
Altri abusi misti non specificati	15.7	17.4	14.6	10.5	9.0	13.8	21.1	16.1
Abuso di cannabinoidi	12.7	11.1	11.1	11.4	4.2	5.0	5.2	4.3
Abuso di barbiturici	8.2	8.2	9.4	5.3	5.1	2.5	4.4	6.0
Abuso di oppioidi	8.0	9.4	8.2	4.1	6.1	4.5	6.8	5.1
Abuso di amfetamine	0.9	2.0	0.3	1.2	0.2	0.2	0.7	0.0
Abuso di antidepressivi	0.7	1.6	0.3	2.0	3.2	1.1	0.7	0.4
Abuso di allucinogeni	0.2	1.1	0.9	0.0	0.5	0.5	0.0	0.2
Psicosi indotte da droghe	12.7	11.8	12.6	9.9	8.1	7.7	8.0	6.0
Disturbi psichici vari	8.9	8.5	7.0	6.4	4.2	3.4	4.0	3.4
Intossicazione patologica	3.2	2.7	4.7	2.0	2.4	3.6	3.0	1.9
Sindrome astinenza	1.1	0.7	0.9	1.5	1.5	0.7	0.9	0.6
Avvelenamenti	19.5	16.0	7.9	26.0	31.1	31.7	26.2	29.6
da altre sostanze	16.6	14.3	3.5	22.5	25.9	28.5	24.6	25.9
da oppiacei	2.3	1.8	5.0	3.2	5.1	3.4	1.6	3.0
da metadone	0.5	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.4
da eroina	0.2	0.2	0.3	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2

* Non sono considerate le dimissioni di soggetti non residenti del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Tab. 12 - Ricoveri ospedalieri per abuso/dipendenza alcol. Periodo 2009-2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale ricoveri	828	868	1032	926	977	946	1039	1043
Soggetti	619	613	739	637	660	657	686	727
Media ricoveri per soggetto	1.34	1.42	1.40	1.45	1.48	1.44	1.51	1.43
Maschi	74.3	77.0	71.9	76.3	77.4	78.1	76.5	76.0
Femmine	25.7	23.0	28.1	23.7	22.6	21.9	23.5	24.0
Età media	56.6	56.9	55.8	55.2	56.2	57.1	56.7	56.3
Nativi	82.1	83.1	82.5	84.8	85.4	86.3	88.0	88.4
Non nativi	17.3	16.8	17.4	14.7	14.4	13.7	12.0	11.4
Residenti area metropolitana	91.8	93.8	90.4	90.9	91.9	91.2	92.5	91.5
Residenti fuori area metropolitana	8.0	6.1	9.6	9.1	8.0	8.8	7.4	8.4
Dipendenza	23.4	21.4	31.0	25.2	20.4	21.1	22.4	25.6
Abuso	23.7	21.9	20.7	19.9	20.2	18.0	14.9	18.3
Danni epatici	53.4	55.8	49.4	53.2	58.4	59.8	60.3	53.9
Altri danni organici	3.4	3.8	2.2	3.3	2.4	4.1	5.4	3.1
Effetti tossici	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	1.4
Psicosi alcoliche	5.4	3.8	5.1	5.1	5.5	5.9	5.8	0.3
Altri interventi	0.7	0.9	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	1.1

** Non sono considerate le dimissioni di soggetti non residenti del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi*

Tab. 13 - Giocatori d'azzardo problematici in carico al SERT. Periodo 2009-2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	183	171	145	84	55	36	38	32

% nuovi	40.4	50.3	55.9	66.7	54.5	41.7	21.1	46.9
età media	49.5	45.1	48.5	49.2	45.7	46.1	46.9	47.5
% femmine	19.7	18.7	22.8	26.2	20.0	19.4	10.5	18.8
% non nativi	8.7	11.1	11.7	11.9	7.3	8.3	7.9	6.3
% residenti fuori area metropolitana	6.0	5.8	9.0	8.3	5.5	5.6	5.3	3.1
% coniugato	33.9	32.7	35.2	38.1	34.5	55.6	60.5	53.1
% media sup/laurea	47.1	44.5	42.8	50.0	47.3	52.8	47.4	50.0
% disoccupato	16.4	16.4	11.7	13.1	12.0	11.1	13.2	12.5

durata media programma in mesi	14.5	7.5	5.6	9.4	21.0	20.0	35.0	39.4
% programma completato	5.5	3.5	3.4	0.0	1.8	19.4	28.9	28.1
% dimissione concordata	7.1	4.7	6.9	3.6	3.6	5.6	7.9	12.5
% passaggio altra struttura	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	8.3	7.9	3.1
% abbandono	7.7	5.8	5.5	1.2	3.6	8.3	7.9	6.3
% chiusura d'ufficio	18.6	22.8	20.7	31.0	9.1	19.4	26.3	25.0
% programma in corso	61.2	62	62.1	64.3	80.0	36.1	18.4	21.9
% altre dipendenze	6.6	3.0	7.0	10.7	25.5	30.6	26.3	25.0
di cui % alcol	3.8	1.8	2.8	4.8	14.5	25.0	18.4	18.8
di cui % cocaina	1.1	0.6	1.4	1.2	7.3	5.6	2.6	0.0
di cui % eroina	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.6	3.1
di cui % tabacco	0.0	0.6	2.1	2.4	1.8	0.0	2.6	3.1
di cui % altro	1.6	0	0.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Tab. 14 Utenti GAP 2016: esito del programma terapeutico per durata del trattamento

	da 0-6 mesi	da 6 a 12 mesi	>12 mesi	Totale
Numero utenti	67	39	77	183
In corso	55.2	56.4	68.8	61.2
Completato	0	2.6	11.7	5.5
Dimesso	3	10.3	9.1	7.1
Passaggio altra struttura	0	0	0	0
Arresto	0	0	0	0
Decesso	0	0	0	0
Abbandono	6	20.5	2.6	7.7
Fuga/espulsione	0	0	0	0
Chiusura d'ufficio	35.8	10.3	7.8	18.6

Tab. 15 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche nuovi utenti in carico al SERT- Periodo 2009-2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	422	442	422	376	408	457	532	491
età media	32.7	33.1	32.8	32.5	32.2	32.0	31.6	34.8
% maschi	86.3	86.4	84.1	88.3	85.3	85.3	86.5	84.7
% Femmine	13.7	13.6	15.9	11.7	14.7	14.7	13.5	15.3
% nativi	56.4	67.6	62.8	66.2	58.1	65.2	63.5	68.2
% non nativi	43.6	32.4	37.0	33.2	41.9	34.8	36.5	31.8
% residenti area metropolitana	50.2	57.2	53.3	53.5	41.9	44.0	41.7	43.2
% residenti fuori area metropolitana	43.1	40.0	42.9	43.1	55.1	55.6	54.5	54.4
% Senza fissa dimora	9.7	8.1	12.3	8.0	7.1	2.6	8.3	6.3
% Sup/laurea	29.4	31.9	36.0	31.9	28.4	29.8	29.9	28.9
% Non lavora	46.2	67.4	56.2	55.9	65.0	63.5	63.9	61.9
% studia	7.1	7.2	4.5	7.7	4.2	6.8	7.0	5.7
% EpaC+	5.5	8.4	10.4	7.7	7.4	5.9	7.3	6.5
% HIV+	0.7	1.6	2.1	1.1	1.0	0.9	1.3	1.6
% oppioidi	49.5	56.6	59.7	56.4	66.9	63.2	69.4	73.3
% di cui eroina	46.9	55.2	56.9	53.2	64.7	61.9	68.6	71.9
% Cocaina	54.7	51.6	45.0	42.6	32.1	28.0	24.8	40.9
% solo cocaina	37.9	31.0	27.3	27.4	22.5	21.4	18.6	20.6
% Cannabis	34.6	25.3	29.1	33.8	22.1	15.3	12.8	22.2
% Solo cannabis	11.4	10.6	10.9	14.4	10.3	10.7	7.5	5.1
% altre sostanze illegali	5.2	5.4	7.6	5.6	3.7	7.4	5.3	4.9
% benzodiazepine	1.4	2.0	0.2	1.6	1.0	0.2	0.8	1.6
% anche altri farmaci	1.7	1.8	1.2	2.1	0.7	0.9	0.6	3.1
% anche Alcol	8.1	8.1	9.7	9.8	6.4	6.3	3.6	7.7
% uso vena	12.1	17.2	21.6	16.2	25.7	20.4	24.6	23.6
% Carcere	38.9	31.0	0.0	33.0	47.3	42.9	37.6	37.7
% Ospedale	3.1	3.6	2.1	2.4	1.5	2.2	1.7	2.2
% Decesso overdose	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
% Pronto soccorso	4.7	5.0	7.8	7.4	5.4	5.7	3.9	4.3
% Area Disagio	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6
% Unità Mobile Metadone	8.1	11.3	14.9	8.5	8.8	5.9	4.5	7.3

Tab. 16 - Consumo problematico alcol. Caratteristiche nuovi utenti in carico al SERT- Periodo 2009-2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	181	234	225	236	204	185	195	184
età media	46.3	45.4	45.8	45.3	46.7	46.2	44.8	45.6
% maschi	64.1	72.2	68.4	66.9	74.5	69.7	77.4	76.6
% Femmine	35.9	27.8	31.6	33.1	25.5	30.3	22.6	23.4
% nativi	72.9	75.2	72.0	69.1	77.5	76.8	72.8	80.4
% non nativi	27.1	24.8	27.6	30.9	22.5	23.2	27.2	19.6
% residenti area metropolitana	87.3	85.0	93.3	87.3	86.8	91.4	82.6	88.0
% residenti fuori area metropolitana	11.6	14.1	6.7	11.9	12.7	8.6	17.4	11.4
% Senza fissa dimora	5.5	3.0	3.6	7.6	4.4	2.7	4.6	1.6
% Sup/laurea	41.4	40.2	42.2	44.1	47.1	44.9	31.8	29.9
% Non lavora	47.5	52.6	46.2	37.7	59.3	48.1	47.2	47.8
% studia	1.1	0.9	1.8	0.4	1.0	1.1	2.6	0.0
% EpaC+	1.7	4.7	4.4	2.1	4.9	2.2	4.1	2.7
% oppioidi	1.1	2.1	0.9	0.8	1.0	1.1	1.5	0.5
% Cocaina	3.3	4.7	4.0	6.4	5.9	4.3	3.6	4.3
% Cannabis	5.0	4.3	4.0	4.7	3.9	2.2	3.1	2.7
% altre sostanze illegali	3.9	1.7	1.8	2.5	2.0	2.2	2.1	6.0
% benzodiazepine	2.2	0.9	2.2	1.7	2.5	1.6	1.0	1.6
% anche altri farmaci	2.2	1.3	2.7	2.1	3.9	2.2	1.5	3.3
% uso vena	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% gioco d'azzardo	0.6	1.3	1.3	0.8	0.5	0.0	0.0	1.6
% Carcere	10.5	12.4	5.3	5.5	3.4	3.8	9.2	3.3
% Ospedale	12.7	13.2	14.2	15.7	17.6	17.3	12.3	22.3
% Pronto soccorso	18.8	15.4	20.0	20.3	21.6	18.4	11.3	15.8

Tab. 17 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2004-2016

	Maschi								Femmine							
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Illegali	1.00	1.10	1.11	1.24	0.97	1.17	1.14	1.13	0.32	0.28	0.34	0.27	0.29	0.36	0.43	0.35
Alcol	1.33	1.69	1.92	1.91	1.85	1.83	1.58	1.72	0.64	0.61	0.79	0.73	0.71	0.64	0.52	0.62
Oppioidi	0.26	0.28	0.31	0.31	0.37	0.45	0.44	0.61	0.12	0.11	0.16	0.09	0.11	0.13	0.14	0.20
Cocaina	0.36	0.48	0.48	0.57	0.34	0.39	0.46	0.33	0.06	0.10	0.09	0.08	0.05	0.07	0.07	0.08
Cannabis	0.29	0.36	0.42	0.50	0.36	0.32	0.28	0.29	0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	0.05	0.04	0.04

	Nativi								Non nativi							
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Illegali	0.60	0.64	0.66	0.69	0.54	0.71	0.72	0.70	0.97	0.92	1.07	1.07	1.13	1.09	1.23	1.01
Alcol	0.80	1.00	1.11	1.09	1.02	0.98	0.82	0.94	2.05	1.96	2.70	2.62	2.79	2.80	2.70	2.85
Oppioidi	0.17	0.18	0.22	0.19	0.22	0.27	0.26	0.39	0.27	0.27	0.29	0.26	0.32	0.40	0.45	0.54
Cocaina	0.19	0.06	0.05	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.32	1.63	1.68	1.81	1.09	1.46	1.82	1.56
Cannabis	0.16	0.05	0.06	0.06	0.07	0.04	0.03	0.02	0.3	1.17	1.33	1.67	1.06	1.15	1.11	1.35

Tab. 18 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2004-2016

	Maschi								Femmine							
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Illegali	6.98	7.21	7.26	7.15	6.76	7.16	7.52	7.34	1.91	1.83	1.86	1.85	1.91	2.06	2.23	2.14
Alcol	4.51	4.87	5.40	5.02	4.84	4.78	5.52	5.35	1.76	1.70	2.07	1.83	1.75	1.54	1.95	1.88
Oppioidi	4.67	5.09	5.31	5.02	5.14	5.35	5.51	5.50	1.43	1.46	1.54	1.44	1.56	1.57	1.60	1.62
Cocaina	2.24	2.14	2.04	1.91	1.62	1.67	1.89	2.07	0.45	0.50	0.42	0.37	0.34	0.31	0.39	0.43
Cannabis	1.17	1.10	1.08	1.09	0.94	0.90	0.85	0.91	0.25	0.22	0.21	0.19	0.17	0.13	0.14	0.21

	Nativi								Non nativi							
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Illegali	4.58	4.66	4.70	4.70	4.54	4.77	5.00	4.82	3.47	3.52	3.45	3.16	2.92	3.40	3.83	3.85
Alcol	2.89	3.03	3.32	3.13	2.93	2.87	3.49	3.38	4.44	4.65	5.97	5.01	5.45	4.96	5.39	5.28
Oppioidi	3.23	3.48	3.63	3.47	3.59	3.65	3.43	3.67	1.89	1.95	2.06	1.71	1.74	2.11	1.88	2.49
Cocaina	1.37	1.34	1.26	1.16	0.99	1.02	1.18	1.25	1.17	1.14	0.95	0.95	0.92	0.76	0.81	1.17
Cannabis	0.71	0.64	0.63	0.64	0.54	0.05	0.52	0.56	0.68	0.70	0.71	0.64	0.64	0.47	0.38	0.54

Tab.19 - Stima del sommerso. Periodo 2009-2016

	2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
oppioidi	2987	2578-3397	3480	2844-4115	4364	3593-5135	3206	2746-3667	2986	2652-3319	2878	2567-3188	2864	2542-3185	3076	2705-3447
cocaina	1255	1028-1483	1288	1016-1559	1341	1005-1677	902	732-1071	767	621-913	858	664-1051	967	755-1178	919	772-1066
cannabis	771	559-983	709	493-925	1043	581-1505	896	559-1233	544	357-730	592	354-829	543	343-743	890	446-1334
alcol	3743	3117-4368	3345	2847-3842	3986	3387-4585	3553	3033-4072	3445	2916-3974	3747	3116-4377	4139	3482-4797	3362	2866-3859

Sconosciuti/Conosciuti	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
oppioidi	1.55	1.75	2.16	1.59	1.43	1.32	1.30	1.38
cocaina	1.79	1.87	2.14	1.60	1.50	1.73	1.61	1.32
cannabis	2.35	2.51	4.01	3.42	2.26	2.34	2.08	3.01
alcol	4.53	3.80	4.43	3.94	4.19	4.56	4.48	3.74

Tab. 20 - Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Totale	16	19	12	15	10	113	112	98	86	85
Età media	36.9	38.7	39.4	44.1	31.5	36.3	37.9	38.0	38.2	37.9
% Femmine	6.3	5.3	8.3	0.0	20.0	24.8	10.7	11.2	11.6	23.5
% Non residenti	31.3	42.1	33.3	40.0	60.0	47.8	55.4	45.9	51.8	47.1
% Non nativi	31.3	21.1	8.3	6.7	20.0	12.4	24.1	19.4	22.4	31.8
% Sconosciuti al SERT	43.8	26.3	33.3	26.7	50.0	87.6	73.2	46.9	52.9	49.4

Metodologia utilizzata: note

Definizione di caso – Come “consumatori problematici” sono stati considerati i soggetti che si sono rivolti ad un servizio pubblico o privato per problemi dovuti all’uso/abuso di sostanze psicoattive.

I soggetti inclusi nel presente studio sono stati selezionati dai sistemi informativi di SERT e Carcere (cartella socio-sanitaria informatizzata SISTER), Pronto Soccorso dell’AUSL di Bologna (sistema informativo SIO), Ospedali e case di cura private convenzionate (Scheda di Dimissione Ospedaliera), servizi a bassa soglia di accesso del Comune di Bologna (SIDS: Sistema Informativo Disagio Sociale – dato disponibile fino al 31/12/2010), Registro Mortalità dell’AUSL di Bologna (Scheda ISTAT). Il periodo di riferimento è compreso tra il 2009 ed il 2016, il territorio è l’area metropolitana di Bologna.

Materiali e metodi - Dall’archivio dei SERT sono stati selezionati i soggetti presi in carico come tossicodipendenti o come alcolisti. Dal data base degli accessi al Pronto Soccorso sono stati selezionati i soggetti che si sono rivolti al servizio per problemi collegati all’uso di sostanze psicoattive⁵. Dai data base dei servizi a bassa soglia sono stati selezionati i soggetti con tipologia di disagio “tossicodipendente” o “alcolista” e con sostanza di abuso specificata. Per quanto riguarda i ricoveri, sono stati utilizzati i dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e sono stati selezionati i soggetti con diagnosi di dimissione abuso o dipendenza da sostanze psicoattive in base alla classificazione ICD-9. Dall’archivio delle schede di morte ISTAT sono stati selezionati i soggetti deceduti in area metropolitana con causa di decesso ICD-9 304, ICD-10 X40-X49.

Un soggetto nello stesso periodo di riferimento può essere stato in contatto con più servizi e quindi essere presente in più archivi. Per ogni soggetto le informazioni sono state riunite in unico record ed aggiornate anno per anno. L’archivio finale distingue i “nuovi” contatti (soggetti presenti nell’anno considerato, ma non negli anni precedenti). Per indicare la nazionalità si è tenuto conto del paese di nascita e si sono costruite due categorie “nativi” (nati in Italia) e “non nativi” (nati all’estero).

Analisi - Per la stima del sommerso è stato utilizzato il metodo “cattura/ricattura” a due fonti (A*B/C) e sono stati calcolati i relativi intervalli di confidenza al 95%: A) i soggetti che hanno usufruito di servizi SERT (esclusi quelli che sono stati seguiti solo dal Carcere); B) i soggetti dimessi da Ospedali e case di cura private convenzionate⁶; C) i soggetti comuni tra le due fonti.

Per tutte le stime sono stati utilizzati i soggetti di età compresa tra 15 e 64 anni; per le sostanze illegali i soggetti con abuso di oppioidi, cocaina e cannabis.

Incidenza e prevalenza sono calcolati i soli soggetti residenti di età compresa tra 15-64 anni distintamente per sesso e nazionalità (utenti residenti/popolazione residente*1000). La popolazione residente è stata ricavata dal sito web della Regione Emilia-Romagna⁷, la popolazione residente straniera dal sito web dell’ISTAT⁸. Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando i software SPSS 12.0 e STATA 14.0.

⁵ Pavarin, R.M. (2014), *Access to the health services for problematic use of illegal psychoactive substances among natives and non-natives: a study in the metropolitan area of Bologna*, Ann Ist Super Sanità, 50(1): 40-46

⁶ Vedi Pavarin, R.M. (2007), *Consumo, consumo problematico e dipendenza*, Franco Angeli, Milano: 37;56. Pavarin, R.M. (1998), *Stima della prevalenza di tossicodipendenti nella città di Bologna nel 1997 e analisi del sommerso*, Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo, 3:7-11

⁷ http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/statistica/pagine/statistica_self_service.htm

⁸ <http://demo.istat.it/>