



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Rapporto 2017 sulle dipendenze in area metropolitana

*quadro epidemiologico
caratteristiche tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d'azzardo problematici,
attività dei servizi*

A cura di Raimondo Maria Pavarin
Con la collaborazione di Silvia Marani ed Elsa Turino

Azienda USL di Bologna
DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Via S. Isaia, 94/A
Tel. 051/6584313 – Fax. 051/6584315
<http://www.ausl.bologna.it/oem>

Si ringraziano

*Luana Capitani – AUSL di Bologna – U.O.S.D Ser. T Bologna Ovest
Simonetta Cioni – AUSL Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Orietta Venturi – AUSL di Bologna – Equipe carcere U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Stefania Bongiovanni e Daniele Campedelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Pianura Ovest
Catia Leoni – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Sert Bologna Est
Elisabetta Bacchini – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert Budrio
Giorgia Paoletti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T San Lazzaro di Savena
Leonardo Piscitelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Vergato
Cristina Nasonte – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert San Giorgio di Piano
Simona Sarti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Zola*

*Moreno Astorri – Opera Padre Marella, Comunità “La Sorgente”
Marco Sirotti – Cooperativa Sociale “Il Pettiroso”
Manuela Civettini – Opengroup Dipendenze
Hazem Cavina – Cooperativa Sociale “ASAT”*

*Vincenza Perlangeli – Ausl Bologna – U.O.C. Epidemiologia, promozione della salute e comunicazione del rischio
Antonietta Moschetti – Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi – Tecnologie e Sistemi Informatici*

Sono inoltre disponibili on line sul sito dell'Osservatorio.

<http://www.ausl.bologna.it/oem>

1 – Dati statistici

2 – Mappa dei servizi pubblici e privati per le dipendenze in area metropolitana

Il consumo problematico di sostanze illegali

Rispetto agli anni precedenti diminuisce il numero di consumatori problematici di stupefacenti (nel dettaglio, diminuiscono per l'eroina e la cannabis, mentre invece aumentano per la cocaina). In particolare, calano gli utenti dei SERT (compresi Unità Mobile e Carcere) ed aumentano gli accessi al Pronto Soccorso. Cambiano le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche: rispetto all'anno precedente è in aumento l'età media, il numero di residenti e di persone senza fissa dimora. Si segnala il calo del numero di non nativi e di non residenti. Si segnala la diminuzione dell'uso di sostanze per via iniettiva e del numero di decessi per overdose (11 nel 2017 rispetto ai 17 nel 2016). Tra gli utenti SERT diminuisce il numero di positivi all'HIV.

Il consumo problematico di alcol

Aumenta il numero complessivo e quello di nuovi accessi di persone con consumo problematico di alcol. In aumento il numero di accessi ai SERD ed al Pronto Soccorso.

I non nativi

I non nativi con consumo problematico di alcol e di sostanze illegali non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea.

I residenti

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti, in entrambi i sessi, rispetto all'anno precedente è in aumento l'incidenza di consumo problematico di alcol, cocaina e cannabis ed in diminuzione per l'eroina. L'incidenza è più elevata tra i maschi ed i non nativi. Tra le persone con consumo problematico di sostanze illegali, sia tra i nativi che tra i non nativi si segnalano i CP con età inferiore a 35 anni. Tra i soggetti con abuso di alcol, tra i nativi l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 15 e 19 anni, tra i non nativi nelle classi di età estreme: 15-19 anni e 60-64 anni.

I minori

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 17 anni è in aumento l'incidenza del consumo problematico di alcol in entrambi i sessi. In diminuzione invece il consumo problematico di sostanze illegali tra i non nativi, ed in aumento tra i nativi. In controtendenza rispetto agli anni scorsi, si segnala la diminuzione dell'incidenza del consumo problematico di eroina e di cocaina.

Il gioco d'azzardo problematico

Aumenta il numero di soggetti che si presentano ai SERT per problemi dovuti al gioco. In aumento anche l'età media (49.6 anni) e la percentuale di non nativi (10%).

Cosa emerge dagli studi

- Nell'area metropolitana di Bologna, si stima una prevalenza di 1,78 Giocatori Problematici ogni mille residenti.
- Tra i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni emerge un processo di normalizzazione dell'abuso degli alcolici, fenomeno che sembra tollerato, accettato e condiviso da ampi strati della popolazione giovanile.
- Nel corso del tempo, tra i consumatori di cocaina, la mortalità e le cause di morte sono cambiate e a partire dal 2010 la prima causa di morte sono i suicidi.
- Tra soggetti con abuso primario di eroina si evidenzia un elevato rischio di morte in tutte le classi di età, in calo fino al 2009 ed in aumento a partire dal 2010. Nel corso del tempo la mortalità per AIDS e per overdose è diminuita, mentre la mortalità per malattie epatiche e per tumori sono aumentate, diventando le cause più diffuse di morte nell'ultimo periodo.

1 - Il consumo problematico di sostanze illegali

Rispetto agli anni precedenti, aumenta l'età media, ma diminuisce il numero di soggetti che si sono rivolti ad un SERT, o ad un pronto soccorso o che sono stati ricoverati in un ospedale per problemi dovuti al consumo di sostanze illegali (Consumo Problematico – CP).

Calano gli utenti dei SERT (compresi Unità Mobile e Carcere), aumentano i ricoveri ospedalieri e gli accessi al Pronto Soccorso. Per quanto riguarda le caratteristiche anagrafiche, aumentano i residenti ed i soggetti senza fissa dimora, calano le femmine, i nativi ed i non residenti. Per quanto riguarda le sostanze, diminuisce il numero di CP di oppioidi e di cannabis, aumentano i CP di cocaina.

Tra i residenti, mediamente più anziani rispetto ai non residenti, osserviamo una quota più elevata di femmine e di accessi al SERT. Tra i non residenti invece troviamo una percentuale più alta di non nativi e di CP di cocaina. I non nativi si caratterizzano per l'elevata prevalenza di soggetti con CP di oppioidi e di cocaina.

Per quanto riguarda le sostanze di abuso, il 96% dei soggetti con problemi dovuti ad abuso di oppioidi sono seguiti dai SERT. Tra le persone con consumo problematico di cannabis osserviamo la quota più elevata di non residenti; le persone con consumo problematico di cannabis si rivolgono ai servizi sanitari ospedalieri in percentuale più elevata rispetto ai consumatori problematici di oppioidi e di cocaina. Da rilevare che l'incidenza su mille residenti è più elevata tra i CP di cocaina ed il rapporto sconosciuti/conosciuti (consumatori stimati/consumatori che si rivolgono al SERT) è più alto tra i CP di cannabis.

Le sostanze di abuso

		Oppioidi	Cocaina	Cannabis
Caratteristiche	Numero	2126	1269	550
	% nuovi	9.0	24.2	41.3
	Età media	42.2	38.6	33.4
	% femmine	21.5	16.1	14.0
	% non residenti	18.3	28.0	30.0
	% non nativi	15.4	26.1	26.5
Servizi	% SERT	95.9	84.9	72.5
	% Pronto Soccorso	6.5	14.9	22.9
	% Ospedale	6.6	9.8	10.9
Dati epidemiologici	Incidenza x 1000 residenti	0.17	0.29	0.24
	Prevalenza x 1000 residenti	3.10	1.62	0.71
	Stima numero oscuro	2370	1509	890
	Rapporto sconosciuti/conosciuti	1.27	1.80	3.06

Per quanto riguarda i servizi, l'accesso è più frequente al SERT, soprattutto per soggetti con problemi dovuti all'eroina. L'ospedale si caratterizza per una fascia di utenza con età mediamente più elevata e per la maggiore presenza di femmine; il Pronto Soccorso per la maggiore presenza di non residenti e di non nativi. Altro aspetto degno di nota riguarda i nuovi contatti: i servizi sanitari di emergenza (PS) ed il Carcere, assieme al SERT, si confermano tra i principali punti di primo accesso per il consumo problematico di sostanze illegali.

Nel corso del tempo è diminuita la percentuale degli utenti SERT positivi all' HIV ed all'Epatite B, mentre invece è in aumento rispetto all'anno precedente la quota di positivi all'Epatite C . Complessivamente, si segnala l'aumento della quota di soggetti con almeno un test effettuato.

Il monitoraggio dello stato di salute degli utenti SERT

		HIV	Epatite C	Epatite B
% positivi	2017	8.8	46.9	44.5
	2016	9.1	42.2	48.3
	2015	10.0	51.3	49.9
% con almeno un test	2017	74.7	72.1	75.7
	2016	72.2	72.9	73.7
	2015	69.2	70.4	74.3

2 - Il consumo problematico di alcol

Alcohol use disorders (AUD): dati epidemiologici

	2017	2016	2015	2014
Incidenza x 1000 residenti	1.03	0.98	1.14	1.35
Prevalenza x 1000 residenti	3.10	3.12	3.27	3.71
Stima numero oscuro	3495	3743	3345	3986
Conosciuti/sconosciuti	4.05	4.5	3.8	4.4

Rispetto agli anni precedenti, aumentano l'età media ed il numero complessivo di persone con CP di alcol (AUD). Mentre le femmine diminuiscono rispetto all'anno precedente, l'aumento coinvolge diverse tipologie di soggetti (non nativi, persone senza fissa dimora, residenti e non residenti). Aumentano in modo particolare gli alcolisti seguiti dal SERT e gli accessi al Pronto Soccorso. L'incremento del numero di soggetti con problemi alcol correlati si conferma anche utilizzando i dati relativi ai residenti, aumenta infatti l'incidenza e rimane stabile la prevalenza. Da segnalare la diminuzione della stima del sommerso e del rapporto sconosciuti/conosciuti.

3 – I non nativi

I non nativi con consumo problematico di alcol e di sostanze illegali non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea. In particolare per l'alcol si evidenziano nell'ordine i nativi dell'Europa dell'Est, dell'Africa mediterranea e dell'Asia; per le sostanze illegali i nativi dell'Africa mediterranea, dell'Europa dell'Est e di altri paesi europei. Per quanto riguarda le sostanze illegali, il 55% ha un consumo problematico dovuto ad uso oppioidi (in diminuzione), il 50% dovuto ad uso di cocaina (in aumento).

Zona di provenienza dei non nativi

	Sostanze illegali	Alcol
Totale	709	669
% Europa Est	23.1	45.7
% Altri paesi europei	9.3	7.9
% Asia	8.7	9.0
% Africa Mediterranea	49.2	22.3
% Altra Africa	4.2	6.4
% America Latina	5.4	7.6
% Altro	0.0	1.0

Per quanto riguarda i settori di contatto, la maggior parte dei soggetti con abuso di sostanze illegali si rivolge al SERT (in diminuzione), in molti casi in seguito ad una carcerazione, mentre invece chi ha problemi con l'alcol accede di preferenza al Pronto Soccorso.

I servizi a cui si rivolgono i non nativi

	Sostanze illegali	Alcol
% Ospedale	5.9	17.9
% Pronto soccorso	18.3	60.8
% SERT	80.3	30.9
% di cui anche Carcere	39.5	7.0
% di cui anche Unità Mobile	13.1	2.1

4 – I residenti

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti, in entrambi i sessi, rispetto all'anno precedente è in aumento l'incidenza di consumo problematico di alcol, cocaina e cannabis. Per quanto riguarda invece il consumo problematico di oppioidi, l'incidenza è in diminuzione a partire dal 2009 tra i maschi e rispetto all'anno precedente tra le femmine.

Consumo problematico di sostanze illegali e di alcol – incidenza per mille residenti

	Alcol		Oppioidi		Cocaina		Cannabis	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
2017	1.45	0.62	0.25	0.10	0.48	0.11	0.41	0.08
2016	1.33	0.32	0.26	0.12	0.36	0.06	0.29	0.07
2015	1.69	0.61	0.28	0.11	0.48	0.10	0.36	0.07
2014	1.92	0.79	0.31	0.16	0.48	0.09	0.42	0.08
2013	1.91	0.73	0.31	0.09	0.57	0.08	0.50	0.09
2012	1.85	0.71	0.37	0.11	0.34	0.05	0.36	0.06
2011	1.83	0.64	0.45	0.13	0.39	0.07	0.32	0.05
2010	1.58	0.52	0.44	0.14	0.46	0.07	0.28	0.04
2009	1.72	0.62	0.61	0.20	0.33	0.08	0.29	0.04

Tra le persone con consumo problematico di sostanze illegali, l'incidenza su mille residenti è più elevata tra i non nativi, in particolare tra i soggetti nella fascia di età compresa tra 20 e 24 anni.

Sia tra i nativi che tra i non nativi si segnalano i CP con età inferiore a 35 anni.

Tra i soggetti con abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi in tutte le classi di età; tra i nativi l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 15 e 19 anni, tra i non nativi nelle classi di età estreme: 15-19 anni e 60-64 anni.

Nativi e non nativi: incidenza per mille residenti

	Sostanze illegali		Alcol	
	Nativi	Non nativi	Nativi	Non nativi
Totale	0.64	0.90	0.85	2.02
15-19 anni	1.34	1.23	1.12	2.87
20-24 anni	0.99	3.21	0.99	1.44
25-29 anni	1.11	1.52	0.89	1.93
30-34 anni	1.33	1.03	1.01	1.74
35-39 anni	0.81	0.82	0.59	2.25
40-44 anni	0.60	0.37	0.82	1.77
45-49 anni	0.37	0.23	0.75	2.38
50-54 anni	0.39	0.30	0.80	2.54
55-59 anni	0.27	0.19	0.97	0.93
60-64 anni	0.08	0.00	0.82	2.74

Per quanto riguarda il genere, sia per il consumo problematico di sostanze illegali, che per l'abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i maschi in tutte le classi di età.

Per quanto riguarda le sostanze illegali, l'incidenza è più elevata per i maschi di età compresa tra 30 e 34 anni, tra le femmine nella fascia di età compresa tra 20 e 24 anni.

Per quanto riguarda l'alcol, tra i maschi l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 25 e 29 anni, tra le femmine nella fascia di età compresa tra 15 e 19 anni.

Differenze di genere: incidenza per mille residenti

	Sostanze illegali		Alcol	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Totale	1.06	0.30	1.45	0.62
15-19 anni	1.91	0.69	1.70	0.98
20-24 anni	1.96	0.75	1.85	0.23
25-29 anni	1.78	0.64	1.92	0.34
30-34 anni	2.01	0.51	1.89	0.51
35-39 anni	1.32	0.31	1.29	0.65
40-44 anni	1.00	0.14	1.46	0.48
45-49 anni	0.66	0.08	1.29	0.64
50-54 anni	0.64	0.14	1.19	0.76
55-59 anni	0.21	0.32	1.24	0.70
60-64 anni	0.12	0.04	1.09	0.83

5 – Gli accessi al pronto soccorso

Il numero di soggetti che accedono ai PS per consumo problematico di sostanze illegali è in aumento rispetto al 2016. Diminuiscono l'età media e la percentuale di femmine e di non nativi, aumentano i non residenti. Diminuisce la percentuale di "codici rossi", di accessi coatti e gli arrivi di notte e nei week end. Diminuisce la quota di accessi per CP di oppioidi, abuso concomitante di alcol e di psicofarmaci. Aumenta la percentuale di accessi per cannabis e cocaina. Per quanto riguarda i problemi correlati, aumenta la percentuale di accessi per aggressioni/atti violenti, diminuisce invece per incidenti stradali e cadute accidentali. Stabile la quota degli accessi per overdose.

Il numero di soggetti che accedono ai PS per CP di alcol è in aumento rispetto al 2016. Oltre all'età media, diminuisce la percentuale di femmine; in aumento la quota di non residenti e di non nativi (35%).

Si segnala inoltre l'aumento della percentuale di soggetti che vengono ricoverati, doppia rispetto all'anno precedente

Per quanto riguarda gli eventi traumatici, anche se in leggero calo, si confermano le percentuali elevate di accessi per cadute accidentali, incidenti stradali e si segnala l'aumento di aggressioni/atti violenti.

6 – I ricoveri ospedalieri

Rispetto al 2016, è in aumento sia il numero di ricoveri che il numero di ricoverati per abuso/dipendenza da sostanze illegali. Si segnala la diminuzione dell'età media, della quota di non residenti e di non nativi. Per quanto riguarda le sostanze, in aumento la percentuale di soggetti con abuso/dipendenza da oppioidi, da cannabis e da cocaina. In aumento anche la percentuale di soggetti con abuso di cocaina senza dipendenza.

Per quanto riguarda i ricoveri per problemi alcol correlati, è in aumento il numero di ricoveri ed in diminuzione il numero di soggetti. Mentre cala l'età media al ricovero, aumenta la percentuale di femmine, di non nativi e residenti. Si segnala l'aumento del numero di ricoveri per danni epatici.

7 – I nuovi utenti dei SERD

Il numero di nuovi accessi ai SERD per CP di sostanze illegali è in diminuzione rispetto allo scorso anno: aumentano l'età media, la quota di residenti, la percentuale di soggetti con uso di cocaina, con uso di sostanze in vena, positivi all'epatite C ed all'HIV. Per quanto riguarda l'HIV si tratta di N persone.....

In calo il numero di persone con uso di oppioidi (45%) e di cannabis (32%), la percentuale di non residenti, di non nativi (37%) e di persone senza fissa dimora (8%). Si segnala inoltre la diminuzione del numero di accessi tramite il carcere (32%) e l'aumento dei nuovi utenti con scolarità medio alta (38%) e senza lavoro (51%).

Il numero di nuovi utenti SERT con dipendenza da alcol è in aumento rispetto al 2016. Diminuiscono l'età media, la percentuale di femmine, di disoccupati e di residenti. In aumento la percentuale di non residenti, di non nativi (33%) e di accessi dall'Ospedale.

8 – I minori

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 17 anni è in aumento l'incidenza (nuovi casi su 1000 residenti) del consumo problematico di alcol in entrambi i sessi ed in relazione alla nazione di nascita.

In diminuzione invece il consumo problematico di sostanze illegali in entrambi i sessi e tra i non nativi, ed in aumento tra i nativi.

In controtendenza rispetto agli anni scorsi, si segnala la diminuzione dell'incidenza del consumo problematico di eroina e di cocaina.

Alcol: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-17 anni

Alcol <18	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale	0.63	0.83	0.93	1.00	0.46	0.61
Maschi	0.74	1.00	1.11	1.17	0.45	0.61
Femmine	0.52	0.66	0.74	0.82	0.47	0.60
Nativi	0.58	0.82	0.97	0.84	0.48	0.54
Non nativi	0.93	0.88	0.68	2.07	0.35	1.07

Sostanze illegali: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-17 anni

Illegali <18	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale	0.38	0.42	0.45	0.40	0.64	0.52
Maschi	0.59	0.57	0.74	0.59	0.85	0.70
Femmine	0.16	0.25	0.15	0.19	0.43	0.32
Nativi	0.17	0.40	0.36	0.35	0.53	0.75
Non nativi	1.68	0.53	1.03	0.69	1.41	0.89
Eroina	0.00	0.07	0.05	0.07	0.11	0.02
Cocaina	0.00	0.00	0.02	0.02	0.07	0.00
Cannabis	0.23	0.22	0.31	0.30	0.32	0.45

9 – Il sistema di allerta rapida sulle droghe

Nell'area metropolitana di Bologna nel 2017, rispetto all'anno precedente, diminuisce sia il numero di decessi per overdose che il numero di accessi ai PS per overdose non letali. In aumento l'età media per i decessi (42.4 anni) ed in diminuzione per gli accessi ai PS (36.4 anni). Tra i decessi aumenta la quota di non residenti e di persone non conosciute al SERT.

	Il sistema di allerta rapida*			
	Decessi per overdose		Accessi ai PS per overdose	
	Numero	Età media	Numero	Età media
2012	16	36.9	113	36.3
2013	23	40.0	112	37.9
2014	13	39.0	98	38.0
2015	17	40.6	86	38.2
2016	17	40.7	85	37.9
2017	11	42.4	69	36.4

* <https://allertarapidadroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

10 – Il gioco d'azzardo problematico

Il numero di soggetti che si presentano ai SERT per problemi dovuti al gioco è in aumento nel tempo (32 utenti nel 2009, 200 utenti nel 2017). In aumento anche l'età media (49.6 anni) e la percentuale di non nativi (10%). In calo la quota di femmine e quella di soggetti con scolarità medio alta.

11 – I risultati degli studi dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze pubblicati nella letteratura internazionale

Nel corso del 2017 sono stati pubblicati in riviste internazionali alcuni studi condotti nell'area metropolitana di Bologna. Qui di seguito la sintesi dei risultati.

Gioco Problematico: evidenze empiriche e riflessioni per la prevenzione¹ - Un conto è giocare, un altro giocare molto e magari rovinarsi, un altro è la dipendenza. Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l'enfaticizzazione del numero di giocatori problematici (GP), dato che potrebbe risultare controproducente (una stima precisa aiuta le politiche di prevenzione) e mascherare altre problematiche correlate (crisi economica, solitudine degli anziani, mancanza di spazi di socializzazione).

Nell'articolo vengono riportati i risultati di sei studi condotti nel Nord Italia nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2015, che hanno indagato l'abitudine al gioco in target diversificati (popolazione generale, giovani adulti, donne intervistate al supermercato, frequentatori dei bar di periferia, clienti di tabaccherie) e stimato il numero sommerso di persone con problemi dovuti al gioco d'azzardo problematico utilizzando i dati dei servizi sanitari territoriali (SERD, CSM) ed ospedalieri (ricoveri).

Stima della prevalenza dei soggetti con problemi dovuti al gioco problematico che richiedono un trattamento: uno studio nell'Italia del nord² - Nel periodo 2000/2015 sono stati identificati 495 residenti che si sono rivolti ad un SERD, ad un Centro di Salute Mentale o ad un Ospedale per dipendenza da gioco.

Si stima un numero di 1570 Giocatori problematici e una prevalenza di 1,78 per 1000 residenti. La maggior parte dei pazienti sono maschi, di età compresa tra 40 e 50 anni, il 12% è nato all'estero, uno su tre soffre di altri disturbi mentali, il 9% ha dipendenza da alcol, l'8% da sostanze illegali. Si segnala il basso livello di scolarità e l'alto numero di disoccupati.

Abusi di alcolici tra i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. I risultati preliminari di uno studio condotto nell'Area metropolitana di Bologna³ - Questo studio riporta i dati relativi all'abuso episodico di alcol (Heavy Episodic Drinking-HED) tra i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni nell'Area Metropolitana di Bologna. Nel corso dell'ultimo anno l'80% ha usato tabacco, il 62% cannabis, il 12% MDMA, l'11% cocaina, il 7% Speed o Anfetamine. L'84% ha avuto almeno un episodio di HED nel corso dell'ultimo anno, il 13% con una frequenza di almeno 3 episodi la settimana, il 39% nel week end. Relativamente all'ultimo episodio di HED, il 43% ha bevuto più di 4/5 unità alcoliche, il 29% le ha consumate entro due ore. Dai risultati dello studio emerge un processo di normalizzazione dell'abuso degli alcolici, fenomeno che sembra tollerato, accettato e condiviso da ampi strati della popolazione giovanile.

¹ Pavarin R M (2017). Gioco problematico: evidenze empiriche e riflessioni per la prevenzione. PRISMA, vol. 3, p. 16-40.

² Pavarin R, Zenesini C, Fioritti A (2017). Estimate of the prevalence of subjects with gambling-related problems requiring treatment: a study in Northern Italy. ANNALI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, vol. 53, p. 322-329

³ Pavarin R (2017). Heavy episodic drinking among youngster aged 18-29. Preliminary results of a study performed in the Metropolitan Area of Bologna. RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA DELL'ADOLESCENZA, vol. 15, p. 35-39

L'andamento della mortalità tra i consumatori di cocaina utenti dei SERD nel periodo 1989/2013⁴ -
Durante tutto il periodo considerato, i tumori sono la principale cause di morte, a partire dal 2010 la prima causa di morte divengono i suicidi. L'eccesso di mortalità rispetto alla popolazione generale (SMR) era di 6.24, più alto tra le femmine. Il tasso standardizzato di mortalità è di 5,31 per mille anni persona, più alto per le donne, in calo dopo il 2009.

Nel corso del tempo, tra i consumatori di cocaina, la mortalità e le cause di morte sono cambiate; per gli utenti SERD va prestata particolare attenzione alla prevenzione dei decessi per suicidio.

L'andamento della mortalità tra i consumatori di eroina utenti dei SERD nel periodo 1975/2013⁵ -

Questo studio documenta una elevata mortalità tra soggetti con abuso primario di eroina, con un elevato rischio di morte in tutte le classi di età, in calo fino al 2009 ed in aumento a partire dal 2010. L'AIDS è la prima causa di morte, seguita dall'overdose e dalle malattie fegato correlate.

Nel corso del tempo la mortalità per AIDS e per overdose è diminuita, mentre la mortalità per malattie epatiche e per tumori sono aumentate nel tempo, diventando le cause più diffuse di morte nell'ultimo periodo. L'eccesso di mortalità rispetto alla popolazione generale (SMR) era di 13.2, più elevato tra le femmine.

Nel corso del tempo, tra i consumatori di eroina la mortalità e le cause di morte sono cambiate; per gli utenti SERD dovrebbe essere prestata una particolare attenzione alla prevenzione ed al trattamento delle malattie epatiche.

⁴ Pavarin R, Fioritti A (2017). Mortality trends among cocaine users treated between 1989 and 2013 in Northern Italy: Results of a longitudinal study. JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS, p. 1-7

⁵ Pavarin R, Fioritti A, Sanchini S (2017). Mortality trends among heroin users treated between 1975 and 2013 in Northern Italy: Results of a longitudinal study . JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT, vol. 77, p. 166-173

Anno 2017 e precedenti: tabelle dei dati

- Tab. 1 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2017
- Tab. 2 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2017
- Tab. 3 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2017
- Tab. 4 Consumatori problematici di eroina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2017
- Tab. 5 Caratteristiche soggetti con problemi alcol correlati. Periodo 2009-2017
- Tab. 6 Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2017
- Tab. 7 Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2017
- Tab. 8 Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2009-2017
- Tab. 9 Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di sostanze illegali: casi incidenti per anno. Periodo 2009-2017
- Tab. 10 Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di alcol: casi incidenti per anno. Periodo 2009-2017
- Tab. 11 Ricoveri ospedalieri per abuso/dipendenza sostanze illegali. Periodo 2009-2017
- Tab. 12 Ricoveri ospedalieri per abuso/dipendenza alcol. Periodo 2009-2017
- Tab. 13 Giocatori d'azzardo problematici in carico al SERT. Periodo 2009-2017
- Tab. 14 Utenti GAP 2017: esito del programma terapeutico per durata del trattamento. Confronto 2017-2016
- Tab. 15 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche nuovi utenti in carico al SERT- Periodo 2009-2017
- Tab. 16 Consumo problematico alcol. Caratteristiche nuovi utenti in carico al SERT- Periodo 2009-2017
- Tab. 17 Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2017
- Tab. 18 Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2017
- Tab. 19 – Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2017.
- Tab. 20 – Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2017.
- Tab. 21 Consumo problematico sostanze psicoattive. Stima del sommerso. Periodo 2009-2017
- Tab. 22 Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2017
- Tab. 23 Deceduti per overdose in Emilia Romagna, ovunque residenti. Periodo 2012-2017

Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2017

	2017	%	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	3255		3368		3348		3405		3461		3440		3636		3862		3771	
nuovi contatti	678	20.8	729	21.6	636	19.0	751	22.1	737	21.3	738	21.5	828	22.8	837	21.7	898	23.8
età media	40.6		40.0		39.6		39.3		38.1		37.9		38.1		37.7		37.0	
maschi	2620	80.5	2702	80.2	2723	81.3	2777	81.6	2839	82.0	2775	80.7	2880	79.2	3050	79.0	2998	79.5
femmine	635	19.5	666	19.8	625	18.7	630	18.5	622	18.0	665	19.3	756	20.8	812	21.0	773	20.5
nativi	2538	78.0	2608	77.4	2575	76.9	2620	76.9	2697	77.9	2699	78.5	2890	79.5	3101	80.3	3083	81.8
non nativi	709	21.8	753	22.4	772	23.1	780	22.9	758	21.9	741	21.5	746	20.5	761	19.7	688	18.2
residenti area metropolitana	2537	77.9	2452	72.8	2490	74.4	2507	73.6	2467	71.3	2388	69.4	2572	70.7	2707	70.1	2611	69.2
residenti fuori area metropolitana	615	18.9	837	24.9	809	24.2	840	24.7	931	26.9	1011	29.4	1060	29.2	1081	28.0	1093	29.0
senza fissa dimora (SFD)	186	5.7	177	5.3	174	5.2	195	5.7	168	4.9	132	3.8	123	3.4	223	5.8	207	5.5
decesso overdose	11	0.3	10	0.3	15	0.4	12	0.4	19	0.5	16	0.5	8	0.2	5	0.1	8	0.2

oppioidi	2126	65.3	2273	67.5	2400	71.7	2534	74.4	2474	71.5	2598	75.5	2703	74.3	2817	72.9	2839	75.3
di cui eroina	2018	62.0	2152	63.9	2298	68.6	2349	69.0	2363	68.3	2485	72.2	2612	71.8	2732	70.7	2704	71.7
cocaina	1269	39.0	1100	32.7	1058	31.6	1001	29.4	920	26.6	821	23.9	790	21.7	921	23.8	1142	30.3
di cui solo cocaina	683	21.0	608	18.1	549	16.4	511	15.0	508	14.7	434	12.6	426	11.7	456	11.8	439	11.6
cannabinoidi	550	16.9	563	16.7	487	14.5	510	15.0	522	15.1	417	12.1	376	10.3	378	9.8	461	12.2
di cui solo cannabinoidi	226	6.9	204	6.1	205	6.1	217	6.4	238	6.9	193	5.6	166	4.6	141	3.7	132	3.5
altre sostanze illegali	327	10.0	421	12.5	290	8.7	339	10.0	315	9.1	326	9.5	356	9.8	359	9.3	418	11.1
benzodiazepine	91	2.8	77	2.3	55	1.6	55	1.6	56	1.6	77	2.2	101	2.8	100	2.6	95	2.5
anche altri farmaci**	64	2.0	104	3.1	68	2.0	89	2.6	54	1.6	70	2.0	121	3.3	205	5.3	162	4.3
anche alcol	510	15.7	505	15.0	465	13.9	476	14.0	460	13.3	444	12.9	484	13.3	526	13.6	623	16.5
uso vena	981	30.1	1056	31.4	1114	33.3	1146	33.7	1180	34.1	1254	36.5	1362	37.5	1473	38.1	1371	36.4

Ospedale	277	8.5	254	7.5	250	7.5	283	8.3	187	5.4	215	6.3	265	7.3	326	8.4	214	5.7
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	3.4	162	4.3
Pronto soccorso	482	14.8	490	14.5	371	11.1	480	14.1	685	19.8	632	18.4	610	16.8	408	10.6	449	11.9
SERT	2671	82.1	2742	81.4	2837	84.7	2854	83.8	2858	82.6	2908	84.5	3029	83.3	3189	82.6	3027	80.3
di cui anche Carcere	485	14.9	525	15.6	609	18.2	637	18.7	624	18.0	693	20.1	690	19.0	654	16.9	522	13.8
di cui anche Unità Mobile Metadone	145	4.5	149	4.4	172	5.1	181	5.3	131	3.8	140	4.1	147	4.0	196	5.1	172	4.6

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

** psicofarmaci, antidepressivi, barbiturici e anche altri farmaci non specificati

Tab. 2 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2017

	2017	%	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	709		753		772		780		758		741		746		761		688	
nuovi contatti	227	32.0	278	36.9	209	27.1	246	32.5	239	31.5	261	34.4	265	35.0	271	35.8	239	31.5
età media	34.8		34.7		34.6		33.7		33.6		32.8		32.9		32.7		32.2	
maschi	622	87.7	655	87.0	697	90.3	716	91.8	696	91.8	683	92.2	660	88.5	673	88.4	615	89.4
femmine	87	12.3	98	13.0	75	9.7	64	8.2	62	8.2	58	7.8	86	11.5	88	11.6	73	10.6
residenti area metropolitana	302	42.6	283	37.6	285	36.9	272	35.9	253	33.4	228	30.8	249	33.4	257	33.8	236	34.3
residenti fuori area metropolitana	338	47.7	415	55.1	449	58.2	460	60.7	458	60.4	484	65.3	496	66.5	457	60.1	427	62.1
senza fissa dimora (SFD)	93	13.1	99	13.1	72	9.3	98	12.9	72	9.5	46	6.2	54	7.2	70	9.2	61	8.9
decesso overdose	1	0.1	2	0.3	1	0.1	1	0.1	4	0.5	5	0.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0

oppioidi	389	54.9	450	59.8	501	64.9	528	69.7	494	65.2	500	67.5	526	70.5	537	70.6	501	72.8
di cui eroina	365	51.5	417	55.4	477	61.8	491	64.8	465	61.3	484	65.3	494	66.2	519	68.2	477	69.3
cocaina	355	50.1	319	42.4	312	40.4	295	38.9	249	32.8	222	30.0	182	24.4	203	26.7	295	42.9
di cui solo cocaina	202	28.5	180	23.9	160	20.7	153	20.2	139	18.3	131	17.7	107	14.3	106	13.9	104	15.1
cannabinoidi	165	23.3	168	22.3	142	18.4	173	22.8	157	20.7	118	15.9	80	10.7	74	9.7	110	16.0
di cui solo cannabinoidi	63	8.9	50	6.6	54	7.0	59	7.8	60	7.9	59	8.0	44	5.9	26	3.4	22	3.2
altre sostanze illegali***	85	12.0	93	12.4	71	9.2	77	10.2	74	9.8	69	9.3	67	9.0	75	9.9	82	11.9
benzodiazepine	16	2.3	12	1.6	14	1.8	17	2.2	10	1.3	14	1.9	15	2.0	11	1.4	16	2.3
anche altri farmaci**	12	1.7	16	2.1	14	1.8	14	1.8	11	1.5	11	1.5	23	3.1	29	3.8	29	4.2
anche alcol	114	16.1	109	14.5	99	12.8	92	12.1	87	11.5	95	12.8	83	11.1	87	11.4	105	15.3
uso vena	90	12.7	100	13.3	115	14.9	117	15.4	115	15.2	117	15.8	126	16.9	132	17.3	100	14.5

Ospedale	42	5.9	36	4.8	46	6.0	43	5.7	35	4.6	34	4.6	39	5.2	43	5.7	26	3.8
Pronto soccorso	130	18.3	141	18.7	100	13.0	107	14.1	145	19.1	122	16.5	115	15.4	107	14.1	82	11.9
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3.3	29	4.2
SERT	569	80.3	594	78.9	634	82.1	657	86.7	616	81.3	620	83.7	618	82.8	623	81.9	539	78.3
di cui anche Carcere	280	39.5	313	41.6	368	47.7	405	53.4	380	50.1	423	57.1	392	52.5	369	48.5	344	50.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	93	13.1	101	13.4	111	14.4	120	15.8	80	10.6	77	10.4	85	11.4	105	13.8	81	11.8

Area provenienza																		
Europa Est	164	23.1	165	21.9	161	20.9	145	7.2	130	6.5	130	6.5	137	6.8	146	7.3	130	6.5
Altri paesi europei	66	9.3	67	8.9	73	9.5	77	9.9	91	12.0	78	10.5	90	12.1	102	13.4	95	13.8
Africa Mediterranea	349	49.2	397	52.7	417	54.0	438	21.7	420	20.9	424	21.1	412	20.5	413	20.5	368	18.3
Altra Africa	30	4.2	23	3.1	30	3.9	23	1.1	27	1.3	22	1.1	27	1.3	24	1.2	23	1.1
Asia	62	8.7	58	7.7	47	6.1	47	6.0	46	6.1	50	6.7	40	5.4	39	5.1	38	5.5
America Latina	38	5.4	40	5.3	33	4.3	37	1.8	28	1.4	26	1.3	30	1.5	29	1.4	28	1.4
USA e Canada	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.1	4	0.2	3	0.1	4	0.2	3	0.1	5	0.2
Altro	0	0.0	1	0.1	11	1.4	11	0.5	12	0.6	8	0.4	6	0.3	5	0.2	1	0.0

Nazione																		
Tunisia	151	21.3	196	26.0	208	26.9	230	29.5	206	27.2	201	27.1	181	24.3	168	22.1	140	20.3
Marocco	160	22.6	164	21.8	159	20.6	157	20.1	158	20.8	166	22.4	161	21.6	168	22.1	145	21.1
Romania	32	4.5	38	5.0	36	4.7	37	4.7	28	3.7	33	4.5	31	4.2	28	3.7	19	2.8
Algeria	34	4.8	33	4.4	49	6.3	50	6.4	55	7.3	57	7.7	68	9.1	76	10.0	83	12.1
Albania	25	3.5	28	3.7	27	3.5	32	4.1	31	4.1	25	3.4	19	2.5	31	4.1	27	3.9

Tab. 3 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2009-2017

	2017	%	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	678		729		636		751		737		738		828		837		898	
età media	35.3		34.8		34.8		35.3		32.2		33.9		35.5		35.7		35.0	
maschi	543	80.1	578	79.3	513	80.7	596	79.4	609	82.6	596	80.8	631	76.2	624	74.6	704	78.4
femmine	135	19.9	151	20.7	123	19.3	155	20.6	128	17.4	142	19.2	197	23.8	213	25.4	194	21.6
nativi	449	66.2	448	61.5	427	67.1	505	67.2	498	67.6	477	64.6	563	68.0	566	67.6	659	73.4
non nativi	227	33.5	278	38.1	209	32.9	246	32.8	239	32.4	261	35.4	265	32.0	271	32.4	239	26.6
residenti area metropolitana	404	59.6	380	52.1	366	57.5	441	58.7	417	56.6	347	47.0	448	54.1	421	50.3	441	49.1
residenti fuori area metropolitana	256	37.8	314	43.1	255	40.1	292	38.9	299	40.6	376	50.9	379	45.8	387	46.2	423	47.1
senza fissa dimora (SFD)	22	3.2	36	4.9	32	5.0	46	6.1	24	3.3	25	3.4	17	2.1	54	6.5	44	4.9
decesso overdose	5	0.7	5	0.7	8	1.3	9	1.2	5	0.7	7	0.9	3	0.4	2	0.2	3	0.3
oppioidi	192	28.3	257	35.3	243	38.2	353	47.0	248	33.6	325	44.0	379	45.8	385	46.0	488	54.3
di cui eroina	155	22.9	194	26.6	214	33.6	239	31.8	193	26.2	269	36.4	288	34.8	344	41.1	421	46.9
cocaina	307	45.3	272	37.3	241	37.9	238	31.7	208	28.2	182	24.7	177	21.4	159	19.0	268	29.8
di cui solo cocaina	231	34.1	200	27.4	172	27.0	166	22.1	159	21.6	139	18.8	141	17.0	120	14.3	132	14.7
cannabinoidi	227	33.5	197	27.0	161	25.3	205	27.3	235	31.9	161	21.8	126	15.2	96	11.5	137	15.3
di cui solo cannabinoidi	134	19.8	100	13.7	99	15.6	125	16.6	151	20.5	111	15.0	95	11.5	67	8.0	51	5.7
altre sostanze illegali***	139	20.5	195	26.7	137	21.5	169	22.5	169	22.9	180	24.4	206	24.9	270	32.3	259	28.8
benzodiazepine	26	3.8	12	1.6	12	1.9	6	0.8	10	1.4	15	2.0	0	0.0	38	4.5	17	1.9
anche altri farmaci**	25	3.7	30	4.1	26	4.1	54	7.2	21	2.8	23	3.1	62	7.5	135	16.1	63	7.0
anche alcol	123	18.1	112	15.4	104	16.4	130	17.3	121	16.4	138	18.7	129	15.6	75	9.0	156	17.4
uso vena	47	6.9	41	5.6	56	8.8	75	10.0	47	6.4	98	13.3	98	11.8	105	12.5	103	11.5

Ospedale	123	18.1	106	14.5	99	15.6	171	22.8	73	9.9	82	11.1	133	16.1	188	22.5	101	11.2
Pronto soccorso	248	36.6	254	34.8	176	27.7	232	30.9	348	47.2	307	41.6	271	32.7	195	23.3	261	29.1
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2.6	73	8.1
SERT	342	50.4	373	51.2	370	58.2	369	49.1	333	45.2	370	50.1	450	54.3	466	55.7	459	51.1
di cui anche Carcere	126	18.6	165	22.6	117	18.4	119	15.8	123	16.7	196	26.6	193	23.3	177	21.1	197	21.9
di cui anche Unità Mobile Metadone	28	4.1	32	4.4	43	6.8	58	7.7	27	3.7	0	0.0	30	3.6	61	7.3	33	3.7

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 4 – Consumatori problematici di eroina. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2009-2017

	2017	%	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	155		194		214		239		193		269		288		344		421	
età media	33.0		32.3		33.6		34.4		31.4		32.3		32.1		30.7		30.1	
maschi	123	79.4	158	81.4	179	83.6	191	79.9	165	85.5	221	82.2	244	84.7	293	85.2	356	84.6
femmine	32	20.6	36	18.6	35	16.4	48	20.1	28	14.5	48	17.8	44	15.3	51	14.8	68	16.2
nativi	92	59.4	93	47.9	129	60.3	138	57.7	111	57.5	155	57.6	177	61.5	198	57.6	289	68.6
non nativi	63	40.6	101	52.1	85	39.7	101	42.3	82	42.5	114	42.4	111	38.5	146	42.4	132	31.4
residenti area metropolitana	78	50.3	71	36.6	90	42.1	98	41.0	63	32.6	74	27.5	108	37.5	97	28.2	148	35.2
residenti fuori area metropolitana	68	43.9	109	56.2	112	52.3	136	56.9	114	59.1	184	68.4	179	62.2	226	65.7	247	58.7
decesso overdose	4	2.6	5	2.6	8	3.7	9	3.8	5	2.6	7	2.6	3	1.0	0	0.0	0	0.0
Cocaina	70	45.2	61	31.4	69	32.2	65	27.2	46	23.8	41	15.2	27	9.4	39	11.3	128	30.4
Cannabinoidi	22	14.2	26	13.4	15	7.0	31	13.0	40	20.7	20	7.4	14	4.9	19	5.5	52	12.4
altre sostanze illegali***	3	1.9	3	1.5	6	2.8	19	7.9	2	1.0	7	2.6	6	2.1	2	0.6	14	3.3
benzodiazepine	1	0.6	2	1.0	4	1.9	0	0.0	1	0.5	2	0.7	0	0.0	1	0.3	6	1.4
anche altri farmaci**	2	1.3	5	2.6	13	6.1	11	4.6	3	1.6	6	2.2	1	0.3	9	2.6	24	5.7
anche alcol	6	3.9	7	3.6	13	6.1	16	6.7	7	3.6	19	7.1	10	3.5	13	3.8	44	10.5
uso vena	44	28.4	35	18.0	53	24.8	73	30.5	47	24.4	98	36.4	96	33.3	103	29.9	99	23.5
Ospedale	6	3.9	0	0.0	6	2.8	8	3.3	5	2.6	3	1.1	6	2.1	3	0.9	8	1.9
Pronto Soccorso	19	12.3	16	8.2	21	9.8	56	23.4	23	11.9	44	16.4	16	5.6	22	6.4	28	6.7
SERT	141	91.0	176	90.7	191	89.3	203	84.9	171	88.6	239	88.8	285	99.0	317	92.2	329	78.1
di cui anche Carcere	45	29.0	75	38.7	52	24.3	62	25.9	61	31.6	124	46.1	114	39.6	119	34.6	131	31.1
di cui anche Unità Mobile Metadone	23	14.8	28	14.4	42	19.6	58	24.3	26	13.5	30	11.2	30	10.4	58	16.9	32	7.6

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 5 - Caratteristiche soggetti con problemi alcol correlati. Periodo 2009-2017

	2017	%	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	2609		2579		2639		3158		2823		2784		2633		2906		2857	
nuovi contatti	1043	40.0	1013	39.3	1059	40.1	1680	53.2	1288	45.6	1284	46.1	1214	46.1	933	32.1	1058	37.0
età media	49.1		49.0		48.8		47.9		47.1		47.9		47.6		46.7		46.0	
maschi	1930	74.0	1885	73.1	1975	74.8	2322	73.5	2114	74.9	2081	74.7	1997	75.8	2181	75.1	2160	75.6
femmine	679	26.0	694	26.9	664	25.2	836	26.5	709	25.1	703	25.3	636	24.2	725	24.9	697	24.4
nativi	1915	73.4	1945	75.4	2009	76.1	2349	74.4	2113	74.8	2085	74.9	2030	77.1	2304	79.3	2295	80.3
non nativi	669	25.6	617	23.9	630	23.9	809	25.6	710	25.2	699	25.1	603	22.9	602	20.7	562	19.7
residenti area metropolitana	2141	82.1	2121	82.2	2203	83.5	2505	79.3	2261	80.1	2243	80.6	2138	81.2	2389	82.2	2289	80.1
residenti fuori area metropolitana	411	15.8	399	15.5	410	15.5	628	19.9	493	17.5	533	19.1	495	18.8	478	16.4	532	18.6
senza fissa dimora (SFD)	67	2.6	57	2.2	58	2.2	76	2.4	72	2.6	47	1.7	45	1.7	124	4.3	111	3.9
Alcolisti SERT	1003	38.4	984	38.2	1049	39.7	1035	32.8	1022	36.2	943	33.9	951	36.1	1071	36.9	1029	36.0
Tossicodipendente concomitante SERT	181	6.9	183	7.1	200	7.6	181	5.7	182	6.4	171	6.1	184	7.0	175	6.0	187	6.5
anche Carcere	82	3.1	82	3.2	104	3.9	73	2.3	58	2.1	43	1.5	61	2.3	39	1.3	14	0.5
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	2.4	95	3.3
Ospedale	600	23.0	611	23.7	608	23.0	736	23.3	637	22.6	654	23.5	644	24.5	676	23.3	614	21.5
Pronto Soccorso	1220	46.8	1196	46.4	1162	44.0	1678	53.1	1490	52.8	1509	54.2	1259	47.8	796	27.4	858	30.0

Tab. 6 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2009-2017

	nuovi 2017	%	nuovi 2016	%	nuovi 2015	%	nuovi 2014	%	nuovi 2013	%	nuovi 2012	%	nuovi 2011	%	nuovi 2010	%	nuovi 2009	%
Totale	1043		1013		1059		1680		1288		1284		1214		933		1058	
Età media	45.9		45.5		46.0		45.9		43.6		45.0		44.3		44.6		44.4	
maschi	749	71.8	715	70.6	787	74.3	1218	72.5	947	73.5	942	73.4	908	74.8	687	73.6	812	76.7
femmine	294	28.2	298	29.4	272	25.7	462	27.5	341	26.5	342	26.6	306	25.2	246	26.4	246	23.3
nativi	708	67.9	675	66.6	753	71.1	1158	68.9	858	66.6	851	66.3	831	68.5	620	66.5	743	70.2
non nativi	333	31.9	325	32.1	306	28.9	522	31.1	430	33.4	433	33.7	383	31.5	313	33.5	315	29.8
residenti area metropolitana	744	71.3	708	69.9	791	74.7	1189	70.8	903	70.1	908	70.7	869	71.6	666	71.4	729	68.9
residenti fuori area metropolitana	287	27.5	272	26.9	258	24.4	481	28.6	332	25.8	375	29.2	343	28.3	249	26.7	311	29.4
senza fissa dimora (SFD)	9	0.9	9	0.9	12	1.1	12	0.7	14	1.1	8	0.6	2	0.2	25	2.7	18	1.7
Alcolisti SERT	140	13.4	145	14.3	171	16.1	183	10.9	179	13.9	161	12.5	153	12.6	141	15.1	158	14.9
Tossicodipendente concomitante SERT	19	1.8	19	1.9	28	2.6	25	1.5	22	1.7	17	1.3	21	1.7	14	1.5	19	1.8
anche Carcere	22	2.1	28	2.8	24	2.3	15	0.9	16	1.2	9	0.7	13	1.1	8	0.9	26	2.5
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.0	15	1.4
Ospedale	283	27.1	250	24.7	264	24.9	431	25.7	266	20.7	277	21.6	324	26.7	311	33.3	341	32.2
Pronto Soccorso	670	64.2	670	66.1	680	64.2	1162	69.2	924	71.7	949	73.9	825	68.0	522	55.9	611	57.8

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 7 – Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2017

	2017	%	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	669		617		630		809		710		699		603		602		562	
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	333	49.8	325	52.7	306	48.6	522	64.5	430	60.6	433	61.9	383	63.5	313	52.0	315	56.0
età media	40.6		39.8		40.5		39.6		39.4		39.3		39.2		38.2		38.5	
maschi	489	73.1	449	72.8	454	72.1	595	73.5	520	73.2	511	73.1	448	74.3	459	76.2	422	75.1
femmine	180	26.9	168	27.2	176	27.9	214	26.5	190	26.8	188	26.9	155	25.7	143	23.8	140	24.9
residenti area metropolitana	410	61.3	374	60.6	390	61.9	484	59.8	413	58.2	432	61.8	367	60.9	369	61.3	328	58.4
residenti fuori area metropolitana	232	34.7	207	33.5	223	35.4	308	38.1	240	33.8	262	37.5	236	39.1	213	35.4	219	39.0
senza fissa dimora (SFD)	23	3.4	26	4.2	21	3.3	28	3.5	32	4.5	22	3.1	23	3.8	39	6.5	27	4.8
oppioidi	29	4.3	27	4.4	31	4.9	31	3.8	26	3.7	32	4.6	33	5.5	71	11.8	83	14.8
cocaina	48	7.2	43	7.0	42	6.7	34	4.2	22	3.1	21	3.0	15	2.5	32	5.3	57	10.1
di cui solo cocaina	40	6.0	40	6.5	39	6.2	31	3.8	20	2.8	16	2.3	12	2.0	19	3.2	23	4.1
cannabinoidi	24	3.6	23	3.7	19	3.0	25	3.1	26	3.7	25	3.6	10	1.7	6	1.0	15	2.7
di cui solo cannabinoidi	21	3.1	12	1.9	17	2.7	19	2.3	23	3.2	22	3.1	9	1.5	6	1.0	10	1.8
altre sostanze illegali***	33	4.9	35	5.7	16	2.5	26	3.2	26	3.7	31	4.4	24	4.0	25	4.2	38	6.8
benzodiazepine	7	1.0	13	2.1	5	0.8	12	1.5	11	1.5	8	1.1	2	0.3	3	0.5	11	2.0
anche altri farmaci**	25	3.7	18	2.9	31	4.9	25	3.1	17	2.4	23	3.3	13	2.2	13	2.2	34	6.0
uso vena	7	1.0	4	0.6	6	1.0	7	0.9	6	0.8	8	1.1	7	1.2	26	4.3	24	4.3
Ospedale	120	17.9	115	18.6	109	17.3	136	16.8	98	13.8	106	15.2	99	16.4	96	15.9	80	14.2
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.5	21	3.7
Pronto soccorso	407	60.8	379	61.4	353	56.0	549	67.9	491	69.2	501	71.7	391	64.8	314	52.2	271	48.2
Alcolisti SERT	207	30.9	179	29.0	204	32.4	196	24.2	193	27.2	164	23.5	153	25.4	172	28.6	147	26.2
Tossicodipendente concomitante SERT	37	5.5	33	5.3	38	6.0	34	4.2	31	4.4	24	3.4	28	4.6	74	12.3	82	14.6
di cui anche Carcere	47	7.0	50	8.1	56	8.9	40	4.9	32	4.5	20	2.9	24	4.0	50	8.3	46	8.2
di cui anche Unità Mobile Metadone	14	2.1	12	1.9	14	2.2	15	1.9	15	2.1	12	1.7	13	2.2	19	3.2	24	4.3
Area provenienza																		
Europa Est	304	45.4	280	45.4	271	43.0	368	45.5	288	40.6	276	39.5	232	38.5	210	34.9	186	33.1
Europa Nord	9	1.3	3	0.5	5	0.8	12	1.5	12	1.7	14	2.0	12	2.0	19	3.2	14	2.5
Europa Ovest	46	6.9	34	5.5	47	7.5	46	5.7	46	6.5	49	7.0	38	6.3	54	8.8	59	10.5
Asia Medio Orientale	7	1.0	11	1.8	10	1.6	13	1.6	12	1.7	18	2.6	13	2.2	16	2.7	13	2.3
Asia Orientale	12	1.8	6	1.0	12	1.9	11	1.4	10	1.4	14	2.0	4	0.7	6	1.0	7	1.2
Regione Indiana	38	5.7	33	5.3	43	6.8	46	5.7	35	4.9	49	7.0	36	6.0	30	5.0	33	5.9
Altra Asia o Sud Est Asiatico	5	0.7	6	1.0	5	0.8	11	1.4	7	1.0	5	0.7	8	1.3	7	1.2	7	1.2
Africa Mediterranea	149	22.3	166	26.9	162	25.7	208	25.7	185	26.0	172	24.6	154	25.5	180	30.0	152	27.0
Altra Africa	41	6.1	34	5.5	40	6.3	45	5.6	36	5.1	38	5.4	46	7.6	39	6.5	43	7.7
USA e Canada	7	1.0	6	1.0	5	0.8	8	1.0	7	1.0	3	0.4	4	0.7	5	0.8	11	2.0
America Latina	49	7.3	35	5.7	28	4.4	39	4.8	33	4.7	45	6.4	35	5.8	36	6.0	35	6.2
Altro	2	0.3	3	0.5	2	0.3	2	0.2	39	5.4	16	2.3	21	3.5	0	0.0	2	0.4

Tab. 8 Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2004-2017

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
KG HEROINA	39.3	44.5	9.4	65.9	37.7	22.5	52.7	25.3	9.2	30.6	2.4	11.9	3.9	31.5
KG COCAINA	76.1	89.3	88.8	82.9	54.1	39.9	38.4	33.5	28.4	35.0	22.0	10.7	54.4	46.3
KG HASCISH	310.7	183.3	153.6	229.9	905.5	506.8	66.7	140.7	157.7	38.2	41.8	63.1	69.5	546.3
KG MARIJUANA	3.5	8.5	5.0	13.2	2.2	41.0	4.44	89.7	170.7	68.0	75.2	69.2	46.8	641.2
operazioni	545	669	742	713	664	544	483	616	574	652	489	328	448	411
denunce	759	897	1202	1041	922	825	696	888	709	616	606	398	572	574
arresti	598	703	983	825	788	708	573	790	621	542	493	308	471	488
minori denunciati	50	38	45	29	22	23	14	17	11	12	9	15	16	13
non nativi denunciati	510	504	709	625	529	451	385	569	461	410	375	286	466	447

* I dati statistici riferiti al 2017 sono da considerare provvisori in attesa di consolidamento

fonte <http://www.poliziadistato.it/articolo/1258ad97598059a224009644> last visit: 25/06/2018

Tab. 9 - Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di sostanze illegali: casi incidenti per anno. Periodo 2009-2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero soggetti	902	886	686	806	777	453	416	516	256
Più di un accesso	20.4	18.7	21.0	22.2	16.9	16.8	18.3	24.6	14.8

Caratteristiche

femmine	22.1	25.2	20.1	24.4	18.8	22.3	21.2	17.8	22.3
età media	36.63	37.43	35.68	36.26	35.72	36.66	37.48	33.99	36.35
non nativi	28.5	30.1	30.6	24.6	23.8	19.0	17.8	26.7	19.9
Europa Est	6.8	10.5	6.3	4.7	5.8	6.0	3.1	4.7	4.7
Africa Mediterranea	10.2	13.0	14.3	12.2	11.1	7.1	9.4	13.0	6.3
non residenti	35.9	34.5	35.9	32.1	34.0	30.2	25.7	38.2	33.6

Arrivo

arrivo al ps di notte (dalle 20 alle 8)	45.3	47.7	49.3	41.6	50.5	39.3	43.0	48.3	42.2
arrivo nel week end	35.1	34.8	40.4	36.7	39.3	32.7	33.2	37.2	30.1
accesso al ps coatto	3.3	5.8	8.3	6.3	4.8	3.1	3.6	8.9	3.9

Triage

rosso	4.5	5.5	5.4	5.5	3.9	4.6	4.3	3.5	6.3
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Esito

rifiuta ogni trattamento	3.7	2.7	3.2	3.6	3.2	3.3	3.8	3.9	5.1
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sostanze

Anche alcol	25.9	27.9	25.8	26.4	18.9	17.2	21.4	16.1	16.0
Anche psicofarmaci	7.1	8.4	7.3	9.2	7.1	6.6	5.3	5.2	6.3
Oppioidi	14.1	17.5	23.2	28.0	40.4	53.9	54.8	41.5	63.7
Cocaina	28.9	24.5	26.4	19.1	22.1	20.8	20.2	23.1	12.5
Cannabis	22.2	15.7	19.1	18.9	22.8	16.1	11.3	12.8	7.8
Amfetamine	1.7	1.1	1.9	2.1	1.9	0.7	1.7	1.6	2.0
Altre sostanze illegali non indicate	37.0	45.5	27.4	34.7	24.5	23.6	16.6	24.0	20.7

Altri disturbi correlati

disturbi sistema cardiocircolatorio	27.1	27.5	26.2	12.5	24.3	20.3	20.9	15.9	13.3
disturbi apparato digerente	23.7	22.8	23.0	13.2	19.2	22.5	18.8	15.7	18.8
disturbi psichici e comportamentali	37.8	34.8	36.0	17.4	24.3	21.4	20.9	23.3	20.3
Traumatismi	24.8	26.6	22.6	13.4	19.0	19.0	19.7	15.5	16.8
Autolesione e tentato suicidio	7.3	8.2	6.3	4.1	5.1	3.5	3.8	2.7	5.5
Aggressioni e atti violenti	5.2	4.6	2.8	2.4	4.1	4.6	2.4	3.5	1.6
Incidenti stradali	5.8	7.2	6.4	3.7	4.8	4.0	6.3	4.5	5.1
Cadute accidentali	5.1	6.5	6.4	2.7	3.9	4.9	6.7	4.1	4.3
Overdose	5.0	4.6	7.7	5.3	6.2	0.0	0.0	3.9	0.0

Tab. 10 - Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di alcol: casi incidenti per anno. Periodo 2009-2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero soggetti	2097	2007	2004	2426	2056	1386	1247	1570	1656
Più di un accesso	21.1	21.2	20.7	19.4	19.4	21.4	20.9	24.6	20.3
Caratteristiche									
femmine	28.2	29.5	28.6	28.1	26.7	25.0	25.3	29.0	27.5
età media	44.21	44.39	43.85	43.26	42.22	45.30	43.83	39.19	41.65
non nativi	34.6	32.2	30.9	34.6	33.1	33.8	30.8	38.0	31.5
Europa Est	12.4	14.2	12.4	14.4	14.1	13.8	12.5	14.4	11.2
Africa Mediterranea	5.8	7.8	7.3	8.3	7.7	8.0	8.4	8.6	7.7
residenti fuori area metropolitana	33.0	29.8	28.6	31.4	31.4	27.3	30.6	36.7	34.8
Arrivo									
arrivo al ps di notte (dalle 20 alle 8)	58.6	57.9	60.1	33.8	59.0	56.3	59.3	26.2	60.4
arrivo nel week end	45.9	46.5	46.3	27.0	44.8	44.8	48.0	20.6	46.1
accesso al ps coatto	0.9	3.9	4.1	8.7	8.6	5.1	4.7	7.6	6.8
codice triage rosso	3.5	3.8	3.4	3.1	2.9	3.0	1.8	3.0	2.6
rifiuta ogni trattamento	3.4	2.6	3.5	3.0	3.2	4.6	3.2	3.1	2.2
successivo ricovero ospedaliero	20.9	11.9	7.3	11.3	2.9	1.8	1.5	2.0	2.1
Disturbi alcol-correlati									
sindrome astinenza	2.7	2.2	1.7	1.1	1.6	1.1	1.9	1.2	0.9
psicosi	1.0	1.5	2.0	1.4	1.0	1.0	0.9	0.5	1.6
intossicazione acuta	4.7	5.7	6.7	2.7	3.4	3.0	3.7	11.4	13.0
coma etilico	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	1.3	1.1
Uso sostanze									
Almeno un'altra sostanze psicoattiva illegale	10.4	4.4	9.1	8.7	11.5	8.2	7.6	8.3	6.5
Cannabis	2.4	1.8	2.0	2.1	1.9	1.9	1.0	1.1	0.8
Cocaina	2.9	2.7	2.6	1.6	1.8	0.9	1.1	1.2	1.0
Oppioidi	0.9	1.4	2.5	3.2	2.2	1.7	2.6	2.2	2.2
Anche psicofarmaci	5.1	6.1	7.6	4.7	3.8	3.4	3.1	3.4	5.0
Complicazioni									
Traumatismi	31.2	32.0	29.7	29.3	30.2	28.8	29.8	23.2	24.0
Autolesione e tentato suicidio	4.9	4.7	5.1	3.1	4.1	4.3	3.7	2.4	3.1
Aggressioni e atti violenti	6.2	6.2	4.8	5.8	5.0	3.4	3.4	3.2	3.4
Incidenti stradali	8.0	9.0	6.6	7.2	7.4	7.1	6.5	5.8	6.1
Cadute accidentali	13.1	14.1	13.6	11.8	12.5	12.6	14.2	10.0	9.8

Tab. 11 - Ricoveri ospedalieri per abuso/dipendenza sostanze illegali. Periodo 2009-2017*

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale ricoveri	482	440	449	342	342	409	442	427	467
Soggetti	397	343	335	295	310	365	393	361	395
media ricoveri per soggetto	1.21	1.28	1.34	1.16	1.10	1.12	1.12	1.18	1.18
maschi	62.0	65.0	65.3	73.1	60.2	52.3	49.5	55.3	46.5
femmine	38.0	35.0	34.7	26.9	39.8	47.7	50.5	44.7	53.5
età media	43.7	45.8	44.8	44.2	46.8	47.6	48.9	47.2	47.2
nativi	85.5	86.1	83.5	86.8	84.8	84.6	86.4	87.8	89.1
non nativi	14.1	13.9	16.5	13.2	15.2	14.7	13.6	12.2	10.9
residenti area metropolitana	90.9	90.2	89.1	89.2	88.9	90.5	88.5	87.1	91.4
residenti fuori area metropolitana	8.9	9.3	10.7	10.8	11.1	9.3	11.5	12.9	8.6
Dipendenza da droghe	24.1	17.0	20.0	31.0	26.6	24.2	23.1	23.7	22.3
Dipendenza da oppioidi	11.0	8.9	10.5	19.6	14.9	14.7	12.0	12.2	12.8
Dipendenza da cocaina	5.8	4.1	4.0	3.2	5.6	2.4	2.9	2.3	2.8
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	2.1	2.5	3.3	2.9	2.3	1.7	2.3	2.6	3.2
Altra dipendenza da droga	5.0	2.5	3.1	1.8	0.3	2.7	3.2	4.7	5.4
Dipendenza da cannabinoidi	2.3	1.4	1.1	2.0	3.8	1.2	0.5	0.2	0.4
Dipendenza da barbiturici	2.1	0.9	1.1	2.3	0.9	1.7	1.6	1.4	1.1
Dipendenza da amfetamine	0.0	0.2	0.7	0.0	1.2	0.5	0.0	0.2	0.2
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	0.4	0.2	0.2	1.5	0.3	0.5	1.8	0.0	0.0
Dipendenza da allucinogeni	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4
Abuso di droghe senza dipendenza	50.0	53.6	51.9	49.4	37.7	32.0	31.2	46.4	34.3
Abuso di cocaina	17.0	15.9	8.7	9.4	6.1	5.1	4.8	4.9	3.0
Altri abusi misti non specificati	13.1	15.7	17.4	14.6	10.5	9.0	13.8	21.1	16.1
Abuso di cannabinoidi	11.4	12.7	11.1	11.1	11.4	4.2	5.0	5.2	4.3
Abuso di barbiturici	7.5	8.2	8.2	9.4	5.3	5.1	2.5	4.4	6.0
Abuso di oppioidi	5.8	8.0	9.4	8.2	4.1	6.1	4.5	6.8	5.1
Abuso di amfetamine	0.4	0.9	2.0	0.3	1.2	0.2	0.2	0.7	0.0
Abuso di antidepressivi	1.7	0.7	1.6	0.3	2.0	3.2	1.1	0.7	0.4
Abuso di allucinogeni	0.0	0.2	1.1	0.9	0.0	0.5	0.5	0.0	0.2
Psicosi indotte da droghe	13.3	12.7	11.8	12.6	9.9	8.1	7.7	8.0	6.0
Disturbi psichici vari	7.5	8.9	8.5	7.0	6.4	4.2	3.4	4.0	3.4
Intossicazione patologica	3.9	3.2	2.7	4.7	2.0	2.4	3.6	3.0	1.9
Sindrome astinenza	1.9	1.1	0.7	0.9	1.5	1.5	0.7	0.9	0.6
Avvelenamenti	13.7	19.5	16.0	7.9	26.0	31.1	31.7	26.2	29.6
da altre sostanze	11.4	16.6	14.3	3.5	22.5	25.9	28.5	24.6	25.9
da oppiacei	2.5	2.3	1.8	5.0	3.2	5.1	3.4	1.6	3.0
da metadone	0.0	0.5	0.4	0.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.4
da eroina	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2

* Non sono considerate le dimissioni di soggetti non residenti del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Tab. 12 - Ricoveri ospedalieri per abuso/dipendenza alcol. Periodo 2009-2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale ricoveri	847	828	868	1032	926	977	946	1039	1043
Soggetti	661	619	613	739	637	660	657	686	727
Media ricoveri per soggetto	1.28	1.34	1.42	1.40	1.45	1.48	1.44	1.51	1.43
Maschi	72.7	74.3	77.0	71.9	76.3	77.4	78.1	76.5	76.0
Femmine	27.3	25.7	23.0	28.1	23.7	22.6	21.9	23.5	24.0
Età media	55.9	56.6	56.9	55.8	55.2	56.2	57.1	56.7	56.3
Nativi	81.9	82.1	83.1	82.5	84.8	85.4	86.3	88.0	88.4
Non nativi	17.6	17.3	16.8	17.4	14.7	14.4	13.7	12.0	11.4
Residenti area metropolitana	93.0	91.8	93.8	90.4	90.9	91.9	91.2	92.5	91.5
Residenti fuori area metropolitana	7.0	8.0	6.1	9.6	9.1	8.0	8.8	7.4	8.4
Dipendenza	22.4	23.4	21.4	31.0	25.2	20.4	21.1	22.4	25.6
Abuso	20.3	23.7	21.9	20.7	19.9	20.2	18.0	14.9	18.3
Danni epatici	56.0	53.4	55.8	49.4	53.2	58.4	59.8	60.3	53.9
Altri danni organici	2.8	3.4	3.8	2.2	3.3	2.4	4.1	5.4	3.1
Effetti tossici	1.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	1.4
Psicosi alcoliche	5.3	5.4	3.8	5.1	5.1	5.5	5.9	5.8	0.3
Altri interventi	0.6	0.7	0.9	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	1.1

* Non sono considerate le dimissioni di soggetti non residenti del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Tab. 13 - Giocatori d'azzardo problematici in carico al SERT. Periodo 2009-2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	200	183	171	145	84	55	36	38	32
% nuovi	45.0	40.4	50.3	55.9	66.7	54.5	41.7	21.1	46.9
età media	49.6	49.5	45.1	48.5	49.2	45.7	46.1	46.9	47.5
% femmine	18.5	19.7	18.7	22.8	26.2	20.0	19.4	10.5	18.8
% non nativi	10.0	8.7	11.1	11.7	11.9	7.3	8.3	7.9	6.3
% residenti fuori area metropolitana	5.0	6.0	5.8	9.0	8.3	5.5	5.6	5.3	3.1
% coniugato	33.5	33.9	32.7	35.2	38.1	34.5	55.6	60.5	53.1
% media sup/laurea	40.5	47.1	44.5	42.8	50.0	47.3	52.8	47.4	50.0
% disoccupato	16.0	16.4	16.4	11.7	13.1	12.0	11.1	13.2	12.5
durata media programma in mesi	6.6	14.5	7.5	5.6	9.4	21.0	20.0	35.0	39.4
% programma completato	9.0	5.5	3.5	3.4	0.0	1.8	19.4	28.9	28.1
% dimissione concordata	4.5	7.1	4.7	6.9	3.6	3.6	5.6	7.9	12.5
% passaggio altra struttura	0.0	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	8.3	7.9	3.1
% abbandono	8.5	7.7	5.8	5.5	1.2	3.6	8.3	7.9	6.3
% chiusura d'ufficio	12.0	18.6	22.8	20.7	31.0	9.1	19.4	26.3	25.0
% decesso	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% programma in corso	65.5	61.2	62	62.1	64.3	80.0	36.1	18.4	21.9
% altre dipendenze	5.0	6.6	3.0	7.0	10.7	25.5	30.6	26.3	25.0
di cui % alcol	3.5	3.8	1.8	2.8	4.8	14.5	25.0	18.4	18.8
di cui % cocaina	1.0	1.1	0.6	1.4	1.2	7.3	5.6	2.6	0.0
di cui % eroina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.6	3.1
di cui % tabacco	0.0	0.0	0.6	2.1	2.4	1.8	0.0	2.6	3.1
di cui % altro	0.5	1.6	0	0.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Tab. 14 Utenti GAP 2017: esito del programma terapeutico per durata del trattamento. Confronto 2017-2016

	2017				2016			
	da 0-6 mesi	da 6 a 12 mesi	>12 mesi	Totale	da 0-6 mesi	da 6 a 12 mesi	>12 mesi	Totale
Numero utenti	58	45	97	200	67	39	77	183
In corso	56.9	68.9	69.1	65.5	55.2	56.4	68.8	61.2
Completato	5.2	6.7	12.4	9.0	0	2.6	11.7	5.5
Dimesso	6.9	2.2	4.1	4.5	3	10.3	9.1	7.1
Decesso	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Abbandono	10.3	13.3	5.2	8.5	6	20.5	2.6	7.7
Chiusura d'ufficio	20.7	8.9	8.2	12.0	35.8	10.3	7.8	18.6

Tab. 15 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche nuovi utenti in carico al SERT- Periodo 2009-2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	408	422	442	422	376	408	457	532	491
età media	33.9	32.7	33.1	32.8	32.5	32.2	32.0	31.6	34.8
% maschi	85.8	86.3	86.4	84.1	88.3	85.3	85.3	86.5	84.7
% femmine	14.2	13.7	13.6	15.9	11.7	14.7	14.7	13.5	15.3
% nativi	63.5	56.4	67.6	62.8	66.2	58.1	65.2	63.5	68.2
% non nativi	36.5	43.6	32.4	37.0	33.2	41.9	34.8	36.5	31.8
% residenti area metropolitana	58.6	50.2	57.2	53.3	53.5	41.9	44.0	41.7	43.2
% residenti fuori area metropolitana	37.0	43.1	40.0	42.9	43.1	55.1	55.6	54.5	54.4
% Senza fissa dimora	7.6	9.7	8.1	12.3	8.0	7.1	2.6	8.3	6.3
% Sup/laurea	37.7	29.4	31.9	36.0	31.9	28.4	29.8	29.9	28.9
% Non lavora	51.0	46.2	67.4	56.2	55.9	65.0	63.5	63.9	61.9
% studia	6.1	7.1	7.2	4.5	7.7	4.2	6.8	7.0	5.7
% EpaC+	6.6	5.5	8.4	10.4	7.7	7.4	5.9	7.3	6.5
% HIV+	2.2	0.7	1.6	2.1	1.1	1.0	0.9	1.3	1.6
% oppioidi	45.1	49.5	56.6	59.7	56.4	66.9	63.2	69.4	73.3
% di cui eroina	42.9	46.9	55.2	56.9	53.2	64.7	61.9	68.6	71.9
% Cocaina	59.8	54.7	51.6	45.0	42.6	32.1	28.0	24.8	40.9
% solo cocaina	39.0	37.9	31.0	27.3	27.4	22.5	21.4	18.6	20.6
% Cannabis	32.1	34.6	25.3	29.1	33.8	22.1	15.3	12.8	22.2
% Solo cannabis	13.5	11.4	10.6	10.9	14.4	10.3	10.7	7.5	5.1
% altre sostanze illegali	7.4	5.2	5.4	7.6	5.6	3.7	7.4	5.3	4.9
% benzodiazepine	1.5	1.4	2.0	0.2	1.6	1.0	0.2	0.8	1.6
% anche altri farmaci	0.5	1.7	1.8	1.2	2.1	0.7	0.9	0.6	3.1
% anche Alcol	6.6	8.1	8.1	9.7	9.8	6.4	6.3	3.6	7.7
% uso vena	15.2	12.1	17.2	21.6	16.2	25.7	20.4	24.6	23.6
% Carcere	32.1	38.9	31.0	0.0	33.0	47.3	42.9	37.6	37.7
% Ospedale	5.1	3.1	3.6	2.1	2.4	1.5	2.2	1.7	2.2
% Decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
% Pronto soccorso	6.4	4.7	5.0	7.8	7.4	5.4	5.7	3.9	4.3
% Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6
% Unità Mobile Metadone	8.8	8.1	11.3	14.9	8.5	8.8	5.9	4.5	7.3

Tab. 16 - Consumo problematico alcol. Caratteristiche nuovi utenti in carico al SERT- Periodo 2009-2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	204	181	234	225	236	204	185	195	184
età media	45.7	46.3	45.4	45.8	45.3	46.7	46.2	44.8	45.6
% maschi	71.6	64.1	72.2	68.4	66.9	74.5	69.7	77.4	76.6
% Femmine	28.4	35.9	27.8	31.6	33.1	25.5	30.3	22.6	23.4
% nativi	66.7	72.9	75.2	72.0	69.1	77.5	76.8	72.8	80.4
% non nativi	33.3	27.1	24.8	27.6	30.9	22.5	23.2	27.2	19.6
% residenti area metropolitana	86.8	87.3	85.0	93.3	87.3	86.8	91.4	82.6	88.0
% residenti fuori area metropolitana	12.7	11.6	14.1	6.7	11.9	12.7	8.6	17.4	11.4
% Senza fissa dimora	4.9	5.5	3.0	3.6	7.6	4.4	2.7	4.6	1.6
% Sup/laurea	44.6	41.4	40.2	42.2	44.1	47.1	44.9	31.8	29.9
% Non lavora	44.6	47.5	52.6	46.2	37.7	59.3	48.1	47.2	47.8
% studia	2.0	1.1	0.9	1.8	0.4	1.0	1.1	2.6	0.0
% EpaC+	3.9	1.7	4.7	4.4	2.1	4.9	2.2	4.1	2.7
% oppioidi	0.5	1.1	2.1	0.9	0.8	1.0	1.1	1.5	0.5
% cocaina	5.9	3.3	4.7	4.0	6.4	5.9	4.3	3.6	4.3
% cannabis	3.4	5.0	4.3	4.0	4.7	3.9	2.2	3.1	2.7
% altre sostanze illegali	2.0	3.9	1.7	1.8	2.5	2.0	2.2	2.1	6.0
% benzodiazepine	1.0	2.2	0.9	2.2	1.7	2.5	1.6	1.0	1.6
% anche altri farmaci	1.0	2.2	1.3	2.7	2.1	3.9	2.2	1.5	3.3
% uso vena	0.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% gioco d'azzardo	2.0	0.6	1.3	1.3	0.8	0.5	0.0	0.0	1.6
% Carcere	9.3	10.5	12.4	5.3	5.5	3.4	3.8	9.2	3.3
% Ospedale	13.2	12.7	13.2	14.2	15.7	17.6	17.3	12.3	22.3
% Pronto soccorso	14.2	18.8	15.4	20.0	20.3	21.6	18.4	11.3	15.8

Tab. 17 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2009-2017

		Maschi								Femmine									
		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Maschi		1.45	1.33	1.69	1.92	1.91	1.85	1.83	1.58	1.72	0.62	0.644	0.61	0.79	0.73	0.71	0.64	0.52	0.62
Femmine		0.62	0.644	0.61	0.79	0.73	0.71	0.64	0.52	0.62	0.30	0.32	0.28	0.34	0.27	0.29	0.36	0.43	0.35
	Illegali	1.06	1.00	1.10	1.11	1.24	0.97	1.17	1.14	1.13	0.10	0.12	0.11	0.16	0.09	0.11	0.13	0.14	0.20
	di cui Oppioidi	0.25	0.26	0.28	0.31	0.31	0.37	0.45	0.44	0.61	0.11	0.06	0.10	0.09	0.08	0.05	0.07	0.07	0.08
	di cui Cocaina	0.48	0.36	0.48	0.48	0.57	0.34	0.39	0.46	0.33	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	0.05	0.04	0.04
	di cui Cannabis	0.41	0.29	0.36	0.42	0.50	0.36	0.32	0.28	0.29									
		Nativi								Non nativi									
		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
	Alcol	0.85	0.80	1.00	1.11	1.09	1.02	0.98	0.82	0.94	2.02	2.05	1.96	2.70	2.62	2.79	2.80	2.70	2.85
	Illegali	0.64	0.60	0.64	0.66	0.69	0.54	0.71	0.72	0.70	0.90	0.97	0.92	1.07	1.07	1.13	1.09	1.23	1.01
	di cui Oppioidi	0.16	0.17	0.18	0.22	0.19	0.22	0.27	0.26	0.39	0.28	0.27	0.27	0.29	0.26	0.32	0.40	0.45	0.54
	di cui Cocaina	0.29	0.19	0.06	0.05	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.33	0.32	1.63	1.68	1.81	1.09	1.46	1.82	1.56
	di cui Cannabis	0.24	0.16	0.05	0.06	0.06	0.07	0.04	0.03	0.02	0.29	0.30	1.17	1.33	1.67	1.06	1.15	1.11	1.35

Tab. 18 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2009-2017

		Maschi								Femmine									
		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Alcol		4.58	4.51	4.87	5.40	5.02	4.84	4.78	5.52	5.35	1.65	1.76	1.70	2.07	1.83	1.75	1.54	1.95	1.88
Illegali		7.21	6.98	7.21	7.26	7.15	6.76	7.16	7.52	7.34	1.89	1.91	1.83	1.86	1.85	1.91	2.06	2.23	2.14
di cui Oppioidi		4.83	4.67	5.09	5.31	5.02	5.14	5.35	5.51	5.50	1.42	1.43	1.46	1.54	1.44	1.56	1.57	1.60	1.62
di cui Cocaina		2.66	2.24	2.14	2.04	1.91	1.62	1.67	1.89	2.07	0.61	0.45	0.50	0.42	0.37	0.34	0.31	0.39	0.43
di cui Cannabis		1.18	1.17	1.10	1.08	1.09	0.94	0.90	0.85	0.91	0.25	0.25	0.22	0.21	0.19	0.17	0.13	0.14	0.21
		Nativi								Non nativi									
		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Alcol		2.81	2.89	3.03	3.32	3.13	2.93	2.87	3.49	3.38	4.74	4.44	4.65	5.97	5.01	5.45	4.96	5.39	5.28
Illegali		4.67	4.58	4.66	4.70	4.70	4.54	4.77	5.00	4.82	3.65	3.47	3.52	3.45	3.16	2.92	3.40	3.83	3.85
di cui Oppioidi		3.28	3.23	3.48	3.63	3.47	3.59	3.65	3.43	3.67	2.09	1.89	1.95	2.06	1.71	1.74	2.11	1.88	2.49
di cui Cocaina		1.67	1.37	1.34	1.26	1.16	0.99	1.02	1.18	1.25	1.36	1.17	1.14	0.95	0.95	0.92	0.76	0.81	1.17
di cui Cannabis		0.71	0.71	0.64	0.63	0.64	0.54	0.05	0.52	0.56	0.72	0.68	0.70	0.71	0.64	0.64	0.47	0.38	0.54

Tab. 19 – Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2017.

	Alcol			Gioco			Illegali		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto di Casalecchio	1.67	0.54	1.10	0.18	0.00	0.09	0.73	0.31	0.52
CASALECCHIO DI RENO	1.49	0.26	0.86	0.28	0.00	0.14	0.75	0.26	0.50
MONTE SAN PIETRO	0.86	1.11	0.99	0.29	0.00	0.14	0.57	0.55	0.56
SASSO MARCONI	0.67	0.45	0.56	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.56
VALSAMOGGIA	2.56	0.72	1.64	0.20	0.00	0.10	0.51	0.52	0.51
ZOLA PREDOSA	1.73	0.50	1.11	0.00	0.00	0.00	0.86	0.17	0.51
Distretto Pianura Ovest	1.63	0.77	1.20	0.34	0.12	0.23	1.29	0.23	0.76
ANZOLA DELL'EMILIA	2.35	1.06	1.71	0.78	0.00	0.39	1.30	0.00	0.66
CALDERARA DI RENO	2.80	0.24	1.53	0.23	0.00	0.12	1.17	0.71	0.94
CREVALCORE	0.94	0.95	0.94	0.00	0.47	0.24	1.41	0.24	0.82
SALA BOLOGNESE	0.37	1.11	0.74	0.37	0.37	0.37	1.11	0.00	0.55
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	1.58	0.79	1.19	0.45	0.00	0.23	1.58	0.11	0.85
SANT'AGATA BOLOGNESE	1.22	0.44	0.84	0.00	0.00	0.00	0.41	0.44	0.42
Distretto Pianura Est	1.33	0.77	1.05	0.28	0.04	0.16	0.94	0.22	0.57
ARGELATO	1.29	0.64	0.96	0.32	0.00	0.16	1.29	0.32	0.80
BARICELLA	2.66	0.89	1.78	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.67
BENTIVOGLIO	2.29	2.29	2.29	0.57	0.00	0.29	1.72	0.57	1.14
BUDRIO	0.69	0.86	0.78	0.52	0.00	0.26	0.87	0.00	0.43
CASTELLO D'ARGILE	0.91	0.96	0.93	0.45	0.00	0.23	1.82	0.00	0.93
CASTEL MAGGIORE	1.42	0.84	1.12	0.00	0.00	0.00	1.06	0.51	0.78
CASTENASO	1.10	1.04	1.07	0.22	0.00	0.11	1.10	0.42	0.75
GALLIERA	1.13	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.28
GRANAROLO EMILIA	2.86	0.51	1.67	0.78	0.00	0.39	0.26	0.25	0.26
MALALBERGO	1.40	0.00	0.70	0.00	0.35	0.17	0.70	0.35	0.52
MINERBIO	0.72	0.35	0.53	0.72	0.00	0.35	1.44	0.00	0.71
MOLINELLA	1.03	1.02	1.03	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41
PIEVE DI CENTO	1.85	0.47	1.16	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.23
SAN GIORGIO DI PIANO	0.73	1.45	1.09	0.73	0.36	0.55	0.73	0.00	0.36
SAN PIETRO IN CASALE	1.00	0.25	0.63	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50
Distretto di S. Lazzaro	1.31	0.45	0.87	0.17	0.08	0.12	0.72	0.16	0.44
LOIANO	2.86	0.75	1.83	0.71	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
MONGHIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTERENZIO	0.99	0.50	0.75	0.00	0.50	0.25	1.49	0.00	0.75
OZZANO DELL'EMILIA	1.87	0.45	1.14	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.34
PIANORO	1.90	0.37	1.12	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.66
SAN LAZZARO DI SAVENA	0.73	0.49	0.61	0.31	0.10	0.20	0.42	0.40	0.41
Distretto di Porretta	2.16	0.59	1.39	0.17	0.06	0.12	0.85	0.29	0.58
ALTO RENO TERME	1.90	0.00	0.95	0.47	0.00	0.24	1.42	0.47	0.95
CAMUGNANO	3.58	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASTEL D'AIANO	1.72	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASTEL DI CASIO	2.75	0.97	1.88	0.00	0.00	0.00	0.92	0.97	0.94
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	1.70	1.19	1.46	0.00	0.00	0.00	1.14	0.60	0.87
GAGGIO MONTANO	1.34	1.99	1.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.66	0.67
GRIZZANA MORANDI	3.08	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.40
LIZZANO IN BELVEDERE	1.49	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZABOTTO	2.27	0.00	1.15	0.00	0.46	0.23	0.91	0.00	0.46
MONZUNO	2.39	1.02	1.73	0.48	0.00	0.25	0.96	0.00	0.49
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.38
VERGATO	3.40	0.85	2.13	0.42	0.00	0.21	0.85	0.43	0.64
Distretto Bologna città	1.31	0.60	0.95	0.27	0.03	0.15	1.25	0.38	0.81
BOLOGNA	1.31	0.60	0.95	0.27	0.03	0.15	1.25	0.38	0.81
Area metropolitana	1.45	0.62	1.03	0.25	0.04	0.15	1.06	0.30	0.68

Tab. 20 – Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2017.

	Alcol			Gioco			Illegali		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto di Casalecchio	4.50	1.48	2.97	0.47	0.03	0.25	5.46	1.51	3.46
CASALECCHIO DI RENO	4.29	0.88	2.54	0.65	0.00	0.32	5.41	1.67	3.49
MONTE SAN PIETRO	3.44	2.50	2.96	0.29	0.00	0.14	3.15	1.39	2.26
SASSO MARCONI	2.91	1.34	2.13	0.22	0.00	0.11	6.95	1.12	4.03
VALSAMOGGIA	5.62	1.65	3.65	0.41	0.10	0.26	4.80	1.65	3.24
ZOLA PREDOSA	4.84	1.84	3.32	0.52	0.00	0.26	6.92	1.34	4.08
Distretto Pianura Ovest	5.75	1.65	3.72	0.98	0.19	0.59	6.84	1.34	4.12
ANZOLA DELL'EMILIA	5.21	2.38	3.81	1.82	0.00	0.92	7.56	0.79	4.20
CALDERARA DI RENO	7.24	1.18	4.23	0.47	0.00	0.24	5.84	1.66	3.76
CREVALCORE	4.45	1.66	3.06	0.94	0.71	0.82	8.67	0.47	4.59
SALA BOLOGNESE	3.68	1.85	2.77	1.84	0.37	1.11	5.16	0.74	2.95
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	6.31	1.70	4.01	0.68	0.11	0.40	6.76	1.82	4.29
SANT'AGATA BOLOGNESE	6.48	0.88	3.79	0.81	0.00	0.42	6.48	2.20	4.43
Distretto Pianura Est	4.46	1.83	3.13	0.54	0.12	0.33	6.03	1.45	3.73
ARGELATO	4.18	0.64	2.41	0.32	0.00	0.16	5.47	1.60	3.53
BARICELLA	5.33	2.24	3.79	0.00	0.45	0.22	8.44	0.45	4.46
BENTIVOGLIO	5.16	4.00	4.58	0.57	0.00	0.29	5.16	1.14	3.15
BUDRIO	3.47	1.72	2.59	0.87	0.17	0.52	4.68	0.51	2.59
CASTELLO D'ARGILE	4.09	1.44	2.80	0.45	0.48	0.47	7.28	0.96	4.20
CASTEL MAGGIORE	4.07	2.53	3.28	0.18	0.00	0.09	4.78	2.19	3.45
CASTENASO	2.87	1.66	2.25	0.66	0.00	0.32	7.73	1.04	4.29
GALLIERA	4.50	1.70	3.11	0.00	0.00	0.00	11.26	1.70	6.49
GRANAROLO EMILIA	4.95	1.53	3.22	1.56	0.00	0.77	4.43	1.27	2.83
MALALBERGO	4.56	1.40	2.97	0.35	0.35	0.35	3.85	2.10	2.97
MINERBIO	3.95	2.10	3.01	0.72	0.00	0.35	5.74	3.15	4.43
MOLINELLA	4.74	1.84	3.29	0.41	0.00	0.21	7.00	2.05	4.52
PIEVE DI CENTO	7.88	1.86	4.88	0.46	0.00	0.23	6.03	1.86	3.95
SAN GIORGIO DI PIANO	3.67	2.17	2.91	0.73	0.36	0.55	4.03	0.72	2.37
SAN PIETRO IN CASALE	5.99	1.26	3.64	0.25	0.25	0.25	7.73	1.01	4.39
Distretto di S. Lazzaro	3.76	1.35	2.54	0.30	0.12	0.21	6.42	1.60	3.97
LOIANO	4.29	1.49	2.92	0.71	0.00	0.37	10.01	4.48	7.30
MONGHIDORO	5.10	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	9.35	0.91	5.28
MONTERENZIO	2.97	2.01	2.49	0.00	0.50	0.25	5.94	1.51	3.74
OZZANO DELL'EMILIA	5.61	1.34	3.43	0.23	0.00	0.11	6.78	0.45	3.55
PIANORO	3.99	1.67	2.81	0.19	0.19	0.19	7.59	2.04	4.78
SAN LAZZARO DI SAVENA	2.73	1.19	1.94	0.42	0.10	0.25	4.83	1.58	3.16
Distretto di Porretta	5.80	1.65	3.76	0.63	0.12	0.38	4.95	1.35	3.18
ALTO RENO TERME	4.75	1.89	3.31	0.47	0.47	0.47	3.80	0.94	2.37
CAMUGNANO	7.17	1.82	4.52	1.79	0.00	0.90	3.58	1.82	2.71
CASTEL D'AIANO	10.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.89
CASTEL DI CASIO	3.67	1.93	2.82	0.00	0.00	0.00	2.75	0.97	1.88
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	5.68	1.79	3.78	0.00	0.00	0.00	6.82	1.19	4.08
GAGGIO MONTANO	4.70	2.65	3.67	0.00	0.00	0.00	4.70	1.99	3.34
GRIZZANA MORANDI	6.17	0.85	3.63	0.00	0.00	0.00	5.40	0.85	3.23
LIZZANO IN BELVEDERE	2.99	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.74
MARZABOTTO	8.64	0.93	4.82	0.91	0.46	0.69	6.82	2.78	4.82
MONZUNO	3.83	2.54	3.21	1.44	0.00	0.74	3.35	1.02	2.22
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	3.62	0.80	2.27	0.72	0.00	0.38	3.62	0.00	1.89
VERGATO	8.07	2.13	5.11	1.27	0.00	0.64	8.07	2.13	5.11
Distretto Bologna città	4.39	1.69	3.01	0.54	0.07	0.30	8.77	2.42	5.54
BOLOGNA	4.39	1.69	3.01	0.54	0.07	0.30	8.77	2.42	5.54
Area metropolitana	4.58	1.65	3.10	0.56	0.09	0.32	7.21	1.89	4.52

Tab.21 - Stima del sommerso*. Periodo 2009-2017

	2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
alcol	3495	2932-4058	3743	3117-4368	3345	2847-3842	3986	3387-4585	3553	3033-4072	3445	2916-3974	3747	3116-4377	4139	3482-4797	3362	2866-3859
illegali	5370	4630-6110	5994	5064-6923	7723	6220-9227	8083	6570-9597	5583	4669-6497	4733	4089-5377	6879	5731-8027	8376	6872-9880	6115	5130-7101
di cui oppioidi	2370	2143-2597	2987	2578-3397	3480	2844-4115	4364	3593-5135	3206	2746-3667	2986	2652-3319	2878	2567-3188	2864	2542-3185	3076	2705-3447
di cui cocaina	1509	1283-1734	1255	1028-1483	1288	1016-1559	1341	1005-1677	902	732-1071	767	621-913	858	664-1051	967	755-1178	919	772-1066
di cui cannabis	890	588-1191	771	559-983	709	493-925	1043	581-1505	896	559-1233	544	357-730	592	354-829	543	343-743	890	446-1334
Sconosciuti/ Conosciuti	2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009	
alcol	4.05		4.53		3.80		4.43		3.94		4.19		4.56		4.48		3.74	
illegali	2.30		2.53		3.22		3.41		2.37		1.99		2.76		3.25		2.38	
di cui oppioidi	1.27		1.55		1.75		2.16		1.59		1.43		1.32		1.30		1.38	
di cui cocaina	1.80		1.79		1.87		2.14		1.60		1.50		1.73		1.61		1.32	
di cui cannabis	3.06		2.35		2.51		4.01		3.42		2.26		2.34		2.08		3.01	

* Lo stesso soggetto può essere conteggiato nel calcolo delle stime di più sostanze, poiché può aver utilizzato più di una sostanza (risposta multipla)

Tab. 22 - Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2017

	Decessi*						Accessi					
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Totale	11	17	17	13	23	16	69	85	86	98	112	113
Età media	42.4	40.7	40.6	39.0	40.0	36.9	36.4	37.9	38.2	38.0	37.9	36.3
% Femmine	36.4	17.6	0.0	7.7	8.7	6.3	21.7	23.5	11.6	11.22	10.7	24.8
% Non residenti	9.1	5.9	17.6	8.0	21.7	31.3	21.7	31.8	22.4	19.4	24.1	12.4
% Non nativi	27.3	29.4	35.3	38.5	43.5	31.3	44.9	47.1	51.8	45.9	55.4	47.8
% Sconosciuti al SERT	45.5	47.1	29.4	30.8	21.7	43.8	50.7	49.4	52.4	46.9	73.2	87.6

* Dati consolidati con Registro Mortalità AUSL Bologna fino al 31/12/2017

Tab. 23 - Deceduti per overdose in Emilia Romagna, ovunque residenti* Periodo 2012-2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Totale	25	24	23	23	29	23
Maschi	20	20	20	23	27	21
Femmine	5	4	3	0	2	2
Nativi	23	22	20	21	23	19
Non nativi	2	2	3	2	6	4
Residenti nella provincia del decesso	20	14	19	17	18	18
Non residenti nella provincia del decesso	5	10	4	6	11	5
Di cui, Non residenti nella provincia del decesso, ma residenti in regione ER	0	3	0	1	2	1
Di cui, Non residenti nella provincia del decesso e non residenti in regione ER	5	7	4	5	9	4
Provincia decesso	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bologna	9	19	16	14	22	17
Modena	5	0	0	0	1	0
Parma	2	0	3	1	1	0
Ravenna	1	2	0	1	0	2
Reggio Emilia	3	0	0	1	2	3
Ferrara	0	1	0	0	0	0
Forlì Cesena	2	2	2	5	1	0
Piacenza	1	0	2	1	1	1
Rimini	2	0	0	0	1	0
	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Età media	45.3	39.9	42.3	40.3	37.9	39.0
Età minima	25	19	23	27	16	21
Età massima	62	58	55	56	50	54

* fonte: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseptsanita/rem/analisi-statistica>

Metodologia utilizzata: note

Definizione di caso – Come “consumatori problematici” (CS) sono stati considerati i soggetti che si sono rivolti ad un servizio pubblico o privato per problemi dovuti all’uso/abuso di sostanze psicoattive. Come giocatori problematici sono stati considerati gli utenti dei SERD con diagnosi di gioco problematico (GP).

I soggetti inclusi nel presente studio sono stati selezionati dai sistemi informativi di SERD e Carcere (cartella socio-sanitaria informatizzata SISTER), Pronto Soccorso dell’AUSL di Bologna⁶ (sistema informativo AREAS), Ospedali e case di cura private convenzionate (Scheda di Dimissione Ospedaliera - SDO), servizi a bassa soglia di accesso del Comune di Bologna (SIDS: Sistema Informativo Disagio Sociale – dato disponibile fino al 31/12/2010), Registro Mortalità dell’AUSL di Bologna (Scheda ISTAT- codici ICD 10 F11, F14, F19, X42). Il periodo di riferimento è compreso tra il 2009 ed il 2017, il territorio è l’area metropolitana di Bologna.

Materiali e metodi - Un soggetto nello stesso periodo di riferimento può essere stato in contatto con più servizi ed essere presente in più archivi. Per ogni soggetto le informazioni sono state riunite in unico record ed aggiornate anno per anno. L’archivio finale distingue i “nuovi” contatti (soggetti presenti nell’anno considerato, ma non negli anni precedenti). Per indicare la nazionalità si è tenuto conto del paese di nascita e si sono costruite due categorie “nativi” (nati in Italia) e “non nativi” (nati all’estero). Relativamente alle tabelle 9 e 10 (accessi ai reparti di Pronto Soccorso) i casi incidenti sono stati marchiati in modo univoco con una chiave anonima.

Analisi - Per la stima del sommerso è stato utilizzato il metodo “cattura/ricattura” a due fonti (A*B/C) e sono stati calcolati i relativi intervalli di confidenza al 95%: A) i soggetti che hanno usufruito di servizi SERT (esclusi quelli che sono stati seguiti solo dal Carcere); B) i soggetti dimessi da Ospedali e case di cura private convenzionate⁷; C) i soggetti comuni tra le due fonti.

Per tutte le stime sono stati utilizzati i soggetti di età compresa tra 15 e 64 anni; per le sostanze illegali i soggetti con abuso di oppioidi, cocaina e cannabis.

Incidenza e prevalenza sono state calcolate per i soli soggetti residenti di età compresa tra 15-64 anni distintamente per sesso e nazionalità (utenti residenti/popolazione residente*1000). La popolazione residente (nativi e non nativi) è stata ricavata dal sito web della Regione Emilia-Romagna⁸.

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando i software SPSS 18.0 e STATA 15.0.

⁶ Pavarin, R.M. (2014), *Access to the health services for problematic use of illegal psychoactive substances among natives and non-natives: a study in the metropolitan area of Bologna*, Ann Ist Super Sanità, 50(1): 40-46. Pavarin RM, (2015) Mortality risk among heroin abusers: clients and non-clients of public treatment centers for drug addiction – Substance use and Misuse vol 50 pg 1690-1696

⁷ Vedi Pavarin, R.M. (2007), *Consumo, consumo problematico e dipendenza*, Franco Angeli, Milano: 37;56. Pavarin, R.M. (1998), *Stima della prevalenza di tossicodipendenti nella città di Bologna nel 1997 e analisi del sommerso*, Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo, 3:7-11

⁸ http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/statistica/pagine/statistica_self_service.htm