

---

## Allegato 1: tabelle dati - approfondimenti

Tab. 1	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018
Tab. 2	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018
Tab. 3	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018
Tab. 4	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2018
Tab. 5	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018
Tab. 6	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2018
Tab. 7	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2018
Tab. 8	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018
Tab. 9	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2018
Tab. 10	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018
Tab. 11	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2018
Tab. 12	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018
Tab. 13	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018
Tab. 14	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018
Tab. 15	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018
Tab. 16	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018
Tab. 17	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018
Tab. 18	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018
Tab. 19	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018
Tab. 20	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018
Tab. 21	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018
Tab. 22	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2018
Tab. 23	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018
Tab. 24	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2018
Tab. 25	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018
Tab. 26	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018
Tab. 27	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018
Tab. 28	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018
Tab. 29	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018
Tab. 30	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018
Tab. 31	Gioco problematico. Caratteristiche casi incidenti inclusi nella coorte GAP. Periodo 2009-2018
Tab. 32	Gioco problematico. Caratteristiche soggetti in carico al SERD. Periodo 2009-2018
Tab. 33	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2018
Tab. 34	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2018
Tab. 35	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2018.
Tab. 36	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2018.
Tab. 37	Consumo problematico sostanze psicoattive. Stima del sommerso. Periodo 2009-2018
Tab. 38	Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2009-2018
Tab. 39	Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2018
Tab. 40	Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2018.

Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	3258	3255	3368	3348	3405	3461	3440	3636	3862	3771
nuovi contatti	698	678	729	636	751	737	738	828	837	898
età media	40.8	40.6	40.0	39.6	39.3	38.1	37.9	38.1	37.7	37.0
maschi	2640	2620	2702	2723	2777	2839	2775	2880	3050	2998
femmine	618	635	666	625	630	622	665	756	812	773
nativi	2521	2538	2608	2575	2620	2697	2699	2890	3101	3083
non nativi	730	709	753	772	780	758	741	746	761	688
residenti area metropolitana	2492	2537	2452	2490	2507	2467	2388	2572	2707	2611
residenti fuori area metropolitana	696	615	837	809	840	931	1011	1060	1081	1093
senza fissa dimora (SFD)	186	186	177	174	195	168	132	123	223	207
decesso overdose	20	11	10	15	12	19	16	8	5	8

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	2085	2126	2273	2400	2534	2474	2598	2703	2817	2839
di cui eroina	1986	2018	2152	2298	2349	2363	2485	2612	2732	2704
cocaina	1345	1269	1100	1058	1001	920	821	790	921	1142
di cui solo cocaina**	726	683	608	549	511	508	434	426	456	439
cannabinoidi	578	550	563	487	510	522	417	376	378	461
di cui solo cannabinoidi***	253	226	204	205	217	238	193	166	141	132
altre sostanze illegali	345	327	421	290	339	315	326	356	359	418
di cui allucinogeni	7	9	5	12	7	6	17	20	7	18
di cui amfetamine	27	22	29	27	17	19	18	22	20	22
di cui crack	23	19	21	21	17	19	30	29	12	23
di cui ecstasy	7	6	9	4	4	5	6	11	11	15
di cui GHB	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui ketamina	10	10	7	4	6	7	11	8	8	0
di cui altra non indicata	304	286	381	252	310	282	362	344	316	340

abuso concomitante di psicofarmaci**	103	139	170	115	139	103	136	215	259	238
di cui benzodiazepine	56	91	77	55	55	56	77	101	100	95
di cui antidepressivi	8	6	11	5	12	15	29	31	70	29
di cui barbiturici	10	13	14	9	7	2	12	14	11	13
di cui psicofarmaci	45	61	84	50	73	39	86	127	135	101

anche alcol	506	510	505	465	476	460	444	484	526	623
uso di una qualsiasi sostanza via vena	948	981	1056	1114	1146	1180	1254	1362	1473	1371

Ricovero in Ospedale	291	277	254	250	283	187	215	265	326	214
Accesso al Pronto soccorso	498	482	490	371	480	685	632	610	408	449
Preso in carico al SERD	2648	2671	2742	2837	2854	2858	2908	3029	3189	3027
di cui anche Carcere	453	485	525	609	637	624	693	690	654	522
di cui anche Unità Mobile Metadone	153	145	149	172	181	131	140	147	196	172

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 1 bis – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	3258	3255	3368	3348	3405	3461	3440	3636	3862	3771
% nuovi contatti	21.4	20.8	21.6	19.0	22.1	21.3	21.5	22.8	21.7	23.8
età media	40.8	40.6	40.0	39.6	39.3	38.1	37.9	38.1	37.7	37.0
% maschi	81.0	80.5	80.2	81.3	81.6	82.0	80.7	79.2	79.0	79.5
% femmine	19.0	19.5	19.8	18.7	18.5	18.0	19.3	20.8	21.0	20.5
% nativi	77.4	78.0	77.4	76.9	76.9	77.9	78.5	79.5	80.3	81.8
% non nativi	22.4	21.8	22.4	23.1	22.9	21.9	21.5	20.5	19.7	18.2
% residenti area metropolitana	76.5	77.9	72.8	74.4	73.6	71.3	69.4	70.7	70.1	69.2
% residenti fuori area metropolitana	21.4	18.9	24.9	24.2	24.7	26.9	29.4	29.2	28.0	29.0
% senza fissa dimora (SFD)	5.7	5.7	5.3	5.2	5.7	4.9	3.8	3.4	5.8	5.5
% decesso overdose	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	0.2

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	64.0	65.3	67.5	71.7	74.4	71.5	75.5	74.3	72.9	75.3
% di cui eroina	61.0	62.0	63.9	68.6	69.0	68.3	72.2	71.8	70.7	71.7
% cocaina	41.3	39.0	32.7	31.6	29.4	26.6	23.9	21.7	23.8	30.3
% di cui solo cocaina**	22.3	21.0	18.1	16.4	15.0	14.7	12.6	11.7	11.8	11.6
% cannabinoidi	17.7	16.9	16.7	14.5	15.0	15.1	12.1	10.3	9.8	12.2
% di cui solo cannabinoidi***	7.8	6.9	6.1	6.1	6.4	6.9	5.6	4.6	3.7	3.5
% altre sostanze illegali	10.6	10.0	12.5	8.7	10.0	9.1	9.5	9.8	9.3	11.1
% di cui allucinogeni	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.2	0.5	0.6	0.2	0.5
% di cui amfetamine	0.8	0.7	0.9	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
% di cui crack	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.8	0.3	0.6
% di cui ecstasy	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
% di cui GHB	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui ketamina	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0
% di cui altra non indicata	9.3	8.8	11.3	7.5	9.1	8.1	10.5	9.5	8.2	9.0

% abuso concomitante di psicofarmaci****	3.2	4.3	5.0	3.4	4.1	3.0	4.0	5.9	6.7	6.3
% di cui benzodiazepine	1.7	2.8	2.3	1.6	1.6	1.6	2.2	2.8	2.6	2.5
% di cui antidepressivi	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.4	0.8	0.9	1.8	0.8
% di cui barbiturici	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3
% di cui psicofarmaci	1.4	1.9	2.5	1.5	2.1	1.1	2.5	3.5	3.5	2.7
% anche alcol	15.5	15.7	15.0	13.9	14.0	13.3	12.9	13.3	13.6	16.5
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	29.1	30.1	31.4	33.3	33.7	34.1	36.5	37.5	38.1	36.4

% Ricovero in Ospedale	8.9	8.5	7.5	7.5	8.3	5.4	6.3	7.3	8.4	5.7
% Accesso al Pronto soccorso	15.3	14.8	14.5	11.1	14.1	19.8	18.4	16.8	10.6	11.9
% Presa in carico al SERD	81.3	82.1	81.4	84.7	83.8	82.6	84.5	83.3	82.6	80.3
% di cui anche Carcere	13.9	14.9	15.6	18.2	18.7	18.0	20.1	19.0	16.9	13.8
% di cui anche Unità Mobile Metadone	4.7	4.5	4.4	5.1	5.3	3.8	4.1	4.0	5.1	4.6

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 2 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche “nuovi” contatti. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	698	678	729	636	751	737	738	828	837	898
età media	34.4	35.3	34.8	34.8	35.3	32.2	33.9	35.5	35.7	35.0
maschi	567	543	578	513	596	609	596	631	624	704
femmine	131	135	151	123	155	128	142	197	213	194
nativi	447	449	448	427	505	498	477	563	566	659
non nativi	246	227	278	209	246	239	261	265	271	239
residenti area metropolitana	399	404	380	366	441	417	347	448	421	441
residenti fuori area metropolitana	278	256	314	255	292	299	376	379	387	423
senza fissa dimora (SFD)	33	22	36	32	46	24	25	17	54	44
decesso overdose	9	5	5	8	9	5	7	3	2	3

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	193	192	257	243	353	248	325	379	385	488
di cui eroina	154	155	194	214	239	193	269	288	344	421
cocaina	327	307	272	241	238	208	182	177	159	268
di cui solo cocaina**	247	231	200	172	166	159	139	141	120	132
cannabinoidi	223	227	197	161	205	235	161	126	96	137
di cui solo cannabinoidi***	144	134	100	99	125	151	111	95	67	51
altre sostanze illegali	144	139	195	137	169	169	180	206	270	259
di cui allucinogeni	4	3	1	5	3	5	4	7	0	4
di cui amfetamine	8	8	9	10	9	8	4	7	6	8
di cui crack	7	6	3	3	0	0	0	0	0	2
di cui ecstasy	4	3	5	3	2	2	1	2	2	2
di cui GHB	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui ketamina	3	4	4	1	2	3	3.0	1	4	6
di cui altra non indicata	129	125	181	119	155	151	168	190	259	237

abuso concomitante di psicofarmaci****	36	45	42	37	58	29	36	62	141	79
di cui benzodiazepine	18	26	12	12	6	10	15	0	38	17
di cui antidepressivi	2	2	5	2	9	6	3	12	57	1
di cui barbiturici	5	6	2	3	2	0	0	0	1	1
di cui psicofarmaci	18	25	25	20	41	13	18	50	47	60

anche alcol	117	123	112	104	130	121	138	129	75	156
uso di una qualsiasi sostanza via vena	47	47	41	56	75	47	98	98	105	103

Ricovero in Ospedale	122	123	106	99	171	73	82	133	188	101
Accesso al Pronto soccorso	247	248	254	176	232	348	307	271	195	261
Preso in carico al SERD	343	342	373	370	369	333	370	450	466	459
di cui anche Carcere	112	126	165	117	119	123	196	193	177	197
di cui anche Unità Mobile Metadone	33	28	32	43	58	27	0	30	61	33

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 2 bis – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	698	678	729	636	751	737	738	828	837	898
età media	34.4	35.3	34.8	34.8	35.3	32.2	33.9	35.5	35.7	35.0
% maschi	81.2	80.1	79.3	80.7	79.4	82.6	80.8	76.2	74.6	78.4
% femmine	18.8	19.9	20.7	19.3	20.6	17.4	19.2	23.8	25.4	21.6
% nativi	64.0	66.2	61.5	67.1	67.2	67.6	64.6	68.0	67.6	73.4
% non nativi	35.2	33.5	38.1	32.9	32.8	32.4	35.4	32.0	32.4	26.6
% residenti area metropolitana	57.2	59.6	52.1	57.5	58.7	56.6	47.0	54.1	50.3	49.1
% residenti fuori area metropolitana	39.8	37.8	43.1	40.1	38.9	40.6	50.9	45.8	46.2	47.1
% senza fissa dimora (SFD)	4.7	3.2	4.9	5.0	6.1	3.3	3.4	2.1	6.5	4.9
% decesso overdose	1.3	0.7	0.7	1.3	1.2	0.7	0.9	0.4	0.2	0.3

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	27.7	28.3	35.3	38.2	47.0	33.6	44.0	45.8	46.0	54.3
% di cui eroina	22.1	22.9	26.6	33.6	31.8	26.2	36.4	34.8	41.1	46.9
% cocaina	46.8	45.3	37.3	37.9	31.7	28.2	24.7	21.4	19.0	29.8
% di cui solo cocaina**	35.4	34.1	27.4	27.0	22.1	21.6	18.8	17.0	14.3	14.7
% cannabinoidi	31.9	33.5	27.0	25.3	27.3	31.9	21.8	15.2	11.5	15.3
% di cui solo cannabinoidi***	20.6	19.8	13.7	15.6	16.6	20.5	15.0	11.5	8.0	5.7
% altre sostanze illegali	20.6	20.5	26.7	21.5	22.5	22.9	24.4	24.9	32.3	28.8
% di cui allucinogeni	0.6	0.4	0.1	0.8	0.4	0.7	0.5	0.8	0.0	0.4
% di cui amfetamine	1.1	1.2	1.2	1.6	1.2	1.1	0.5	0.8	0.7	0.9
% di cui crack	1.0	0.9	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
% di cui ecstasy	0.6	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
% di cui GHB	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui ketamina	0.4	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1	0.5	0.7
% di cui altra non indicata	18.5	18.4	24.8	18.7	20.6	20.5	22.8	22.9	30.9	26.4

% abuso concomitante di psicofarmaci****	5.2	6.6	5.8	5.8	7.7	3.9	4.9	7.5	16.8	8.8
% di cui benzodiazepine	2.6	3.8	1.6	1.9	0.8	1.4	2.0	0.0	4.5	1.9
% di cui antidepressivi	0.3	0.3	0.7	0.3	1.2	0.8	0.4	1.4	6.8	0.1
% di cui barbiturici	0.7	0.9	0.3	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
% di cui psicofarmaci	2.6	3.7	3.4	3.1	5.5	1.8	2.4	6.0	5.6	6.7

% anche alcol	16.8	18.1	15.4	16.4	17.3	16.4	18.7	15.6	9.0	17.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	6.7	6.9	5.6	8.8	10.0	6.4	13.3	11.8	12.5	11.5

% Ricovero in Ospedale	17.5	18.1	14.5	15.6	22.8	9.9	11.1	16.1	22.5	11.2
% Accesso al Pronto soccorso	35.4	36.6	34.8	27.7	30.9	47.2	41.6	32.7	23.3	29.1
% Presa in carico al SERD	49.1	50.4	51.2	58.2	49.1	45.2	50.1	54.3	55.7	51.1
% di cui anche Carcere	16.0	18.6	22.6	18.4	15.8	16.7	26.6	23.3	21.1	21.9
% di cui anche Unità Mobile Metadone	4.7	4.1	4.4	6.8	7.7	3.7	0.0	3.6	7.3	3.7

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 3 - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	730	709	753	772	780	758	741	746	761	688
nuovi contatti	246	227	278	209	246	239	261	265	271	239
età media	34.5	34.8	34.7	34.6	33.7	33.6	32.8	32.9	32.7	32.2
maschi	641	622	655	697	716	696	683	660	673	615
femmine	89	87	98	75	64	62	58	86	88	73
residenti area metropolitana	316	302	283	285	272	253	228	249	257	236
residenti fuori area metropolitana	364	338	415	449	460	458	484	496	457	427
senza fissa dimora (SFD)	94	93	99	72	98	72	46	54	70	61
decesso overdose	1	1	2	1	1	4	5	1	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	391	389	450	501	528	494	500	526	537	501
di cui eroina	363	365	417	477	491	465	484	494	519	477
cocaina	382	355	319	312	295	249	222	182	203	295
di cui solo cocaina**	217	202	180	160	153	139	131	107	106	104
cannabinoidi	189	165	168	142	173	157	118	80	74	110
di cui solo cannabinoidi***	77	63	50	54	59	60	59	44	26	22
altre sostanze illegali	84	85	93	71	77	74	69	67	75	82
abuso concomitante di psicofarmaci****	19	27	27	27	31	20	23	38	34	40
di cui benzodiazepine	7	16	12	14	17	10	14	15	11	16
anche alcol	115	114	109	99	92	87	95	83	87	105
uso di una qualsiasi sostanza via vena	93	90	100	115	117	115	117	126	132	100

Ricovero in Ospedale	61	42	36	46	43	35	34	39	43	26
Accesso al Pronto soccorso	144	130	141	100	107	145	122	115	107	82
Preso in carico al SERD	561	569	594	634	657	616	620	618	623	539
di cui anche Carcere	264	280	313	368	405	380	423	392	369	344
di cui anche Unità Mobile Metadone	98	93	101	111	120	80	77	85	105	81

Area provenienza	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Europa Est	190	164	165	161	145	130	130	137	146	130
Altri paesi europei	64	66	67	73	77	91	78	90	102	95
Africa Mediterranea	328	349	397	417	438	420	424	412	413	368
Altra Africa	38	30	23	30	23	27	22	27	24	23
Asia	61	62	58	47	47	46	50	40	39	38
America Latina	46	38	40	33	37	28	26	30	29	28
USA e Canada	3	0	2	0	2	4	3	4	3	5
Altro	0	0	1	11	11	12	8	6	5	1

Nazione	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Tunisia	134	151	196	208	230	206	201	181	168	140
Marocco	158	160	164	159	157	158	166	161	168	145
Romania	40	32	38	36	37	28	33	31	28	19
Algeria	34	34	33	49	50	55	57	68	76	83
Albania	41	25	28	27	32	31	25	19	31	27

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 3 bis - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	730	709	753	772	780	758	741	746	761	688
% nuovi contatti	33.7	32.0	36.9	27.1	31.5	31.5	35.2	35.5	35.6	34.7
età media	34.5	34.8	34.7	34.6	33.7	33.6	32.8	32.9	32.7	32.2
% maschi	87.8	87.7	87.0	90.3	91.8	91.8	92.2	88.5	88.4	89.4
% femmine	12.2	12.3	13.0	9.7	8.2	8.2	7.8	11.5	11.6	10.6
% residenti area metropolitana	43.3	42.6	37.6	36.9	34.9	33.4	30.8	33.4	33.8	34.3
% residenti fuori area metropolitana	49.9	47.7	55.1	58.2	59.0	60.4	65.3	66.5	60.1	62.1
% senza fissa dimora (SFD)	12.9	13.1	13.1	9.3	12.6	9.5	6.2	7.2	9.2	8.9
% decesso overdose	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.7	0.1	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	53.6	54.9	59.8	64.9	67.7	65.2	67.5	70.5	70.6	72.8
% di cui eroina	49.7	51.5	55.4	61.8	62.9	61.3	65.3	66.2	68.2	69.3
% cocaina	52.3	50.1	42.4	40.4	37.8	32.8	30.0	24.4	26.7	42.9
% di cui solo cocaina**	29.7	28.5	23.9	20.7	19.6	18.3	17.7	14.3	13.9	15.1
% cannabinoidi	25.9	23.3	22.3	18.4	22.2	20.7	15.9	10.7	9.7	16.0
% di cui solo cannabinoidi***	10.5	8.9	6.6	7.0	7.6	7.9	8.0	5.9	3.4	3.2
% altre sostanze illegali	11.5	12.0	12.4	9.2	9.9	9.8	9.3	9.0	9.9	11.9
% abuso concomitante di psicofarmaci****	2.6	3.8	3.6	3.5	4.0	2.6	3.1	5.1	4.5	5.8
% di cui benzodiazepine	1.0	2.3	1.6	1.8	2.2	1.3	1.9	2.0	1.4	2.3
% anche alcol	15.8	16.1	14.5	12.8	11.8	11.5	12.8	11.1	11.4	15.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	12.7	12.7	13.3	14.9	15.0	15.2	15.8	16.9	17.3	14.5

% Ricovero in Ospedale	8.4	5.9	4.8	6.0	5.5	4.6	4.6	5.2	5.7	3.8
% Accesso al Pronto soccorso	19.7	18.3	18.7	13.0	13.7	19.1	16.5	15.4	14.1	11.9
% Presa in carico al SERD	76.8	80.3	78.9	82.1	84.2	81.3	83.7	82.8	81.9	78.3
% di cui anche Carcere	36.2	39.5	41.6	47.7	51.9	50.1	57.1	52.5	48.5	50.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	13.4	13.1	13.4	14.4	15.4	10.6	10.4	11.4	13.8	11.8

Area provenienza	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
% Europa Est	26.0	23.1	21.9	20.9	18.6	17.2	17.5	18.4	19.2	18.9
% Altri paesi europei	8.8	9.3	8.9	9.5	9.9	12.0	10.5	12.1	13.4	13.8
% Africa Mediterranea	44.9	49.2	52.7	54.0	56.2	55.4	57.2	55.2	54.3	53.5
% Altra Africa	5.2	4.2	3.1	3.9	2.9	3.6	3.0	3.6	3.2	3.3
% Asia	8.4	8.7	7.7	6.1	6.0	6.1	6.7	5.4	5.1	5.5
% America Latina	6.3	5.4	5.3	4.3	4.7	3.7	3.5	4.0	3.8	4.1
% USA e Canada	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7
% Altro	0.0	0.0	0.1	1.4	1.4	1.6	1.1	0.8	0.7	0.1

Nazione	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
% Tunisia	18.4	21.3	26.0	26.9	29.5	27.2	27.1	24.3	22.1	20.3
% Marocco	21.6	22.6	21.8	20.6	20.1	20.8	22.4	21.6	22.1	21.1
% Romania	5.5	4.5	5.0	4.7	4.7	3.7	4.5	4.2	3.7	2.8
% Algeria	4.7	4.8	4.4	6.3	6.4	7.3	7.7	9.1	10.0	12.1
% Albania	5.6	3.5	3.7	3.5	4.1	4.1	3.4	2.5	4.1	3.9

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 4 - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	246	227	278	209	246	239	261	265	271	239
età media	30.2	30.9	31.6	31.6	29.7	30.5	30.7	30.9	30.7	29.8
maschi	220	200	242	187	219	215	239	216	232	213
femmine	26	27	36	22	27	24	22	49	39	26
residenti area metropolitana	90	75	80	71	90	82	74	80	75	61
residenti fuori area metropolitana	139	141	175	128	144	141	176	185	175	161
senza fissa dimora (SFD)	26	11	31	16	30	16	10	11	25	18
decesso overdose	1	1	1	1	1	3	4	1	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	76	70	117	93	120	101	126	141	158	146
di cui eroina	63	63	101	85	101	82	115	111	146	132
cocaina	130	120	130	86	86	72	69	56	47	88
di cui solo cocaina**	94	82	86	49	54	48	54	45	38	42
cannabinoidi	86	81	91	53	83	74	60	36	21	42
di cui solo cannabinoidi***	47	39	36	29	39	36	36	28	15	8
altre sostanze illegali	41	39	47	41	54	48	51	49	60	52
abuso concomitante di psicofarmaci****	9	12	8	8	9	8	8	16	18	14
di cui benzodiazepine	2	7	3	1	2	3	3	0	5	3
anche alcol	47	39	42	31	34	37	51	39	24	28
uso di una qualsiasi sostanza via vena	15	15	15	15	24	11	30	23	27	19

Ricovero in Ospedale	30	21	17	23	29	15	17	28	25	15
Accesso al Pronto soccorso	93	80	87	61	72	102	81	80	67	67
Preso in carico al SERD	128	132	181	124	151	124	161	166	182	149
di cui anche Carcere	71	89	118	70	86	79	129	121	121	117
di cui anche Unità Mobile Metadone	25	13	23	28	35	18	15	19	33	16

Area provenienza	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Europa Est	72	57	57	44	53	47	54	55	66	50
Altri paesi europei	13	12	11	12	11	21	16	18	22	22
Africa Mediterranea	103	111	156	111	137	128	149	149	146	126
Altra Africa	19	17	11	12	6	13	5	13	9	9
Asia	22	22	29	22	26	15	8	16	9	0
America Latina	14	8	12	8	13	9	24	11	0	12
USA e Canada	3	0	2	0	0	3	0	1	0	0
Altro	0	0	0	0	0	3	5	2	19	20

Nazione	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Tunisia	39	35	75	60	71	59	79	67	74	45
Albania	21	7	17	10	8	13	13	4	16	13
Romania	19	18	18	8	25	16	23	23	21	9
Ucraina	8	10	4	5	4	7	2	5	5	8
Pakistan	7	8	13	5	9	2	6	4	3	3

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci



**Tab. 4 bis - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	246	227	278	209	246	239	261	265	271	239
età media	30.2	30.9	31.6	31.6	29.7	30.5	30.7	30.9	30.7	29.8
% maschi	89.4	88.1	87.1	89.5	89.0	90.0	91.6	81.5	85.6	89.1
% femmine	10.6	11.9	12.9	10.5	11.0	10.0	8.4	18.5	14.4	10.9
% residenti area metropolitana	36.6	33.0	28.8	34.0	36.6	34.3	28.4	30.2	27.7	25.5
% residenti fuori area metropolitana	56.5	62.1	62.9	61.2	58.5	59.0	67.4	69.8	64.6	67.4
% senza fissa dimora (SFD)	10.6	4.8	11.2	7.7	12.2	6.7	3.8	4.2	9.2	7.5
% decesso overdose	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	1.3	1.5	0.4	0.0	0.0

<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
% oppioidi	30.9	30.8	42.1	44.5	48.8	42.3	48.3	53.2	58.3	61.1
% di cui eroina	25.6	27.8	36.3	40.7	41.1	34.3	44.1	41.9	53.9	55.2
% cocaina	52.8	52.9	46.8	41.1	35.0	30.1	26.4	21.1	17.3	36.8
% di cui solo cocaina**	38.2	36.1	30.9	23.4	22.0	20.1	20.7	17.0	14.0	17.6
% cannabinoidi	35.0	35.7	32.7	25.4	33.7	31.0	23.0	13.6	7.7	17.6
% di cui solo cannabinoidi***	19.1	17.2	12.9	13.9	15.9	15.1	13.8	10.6	5.5	3.3
% altre sostanze illegali	16.7	17.2	16.9	19.6	22.0	20.1	19.5	18.5	22.1	21.8
% abuso concomitante di psicofarmaci****	3.7	5.3	2.9	3.8	3.7	3.3	3.1	6.0	6.6	5.9
% di cui benzodiazepine	0.8	3.1	1.1	0.5	0.8	1.3	1.1	0.0	1.8	1.3
% anche alcol	19.1	17.2	15.1	14.8	13.8	15.5	19.5	14.7	8.9	11.7
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	6.1	6.6	5.4	7.2	9.8	4.6	11.5	8.7	10.0	7.9

% Ricovero in Ospedale	12.2	9.3	6.1	11.0	11.8	6.3	6.5	10.6	9.2	6.3
% Accesso al Pronto soccorso	37.8	35.2	31.3	29.2	29.3	42.7	31.0	30.2	24.7	28.0
% Presa in carico al SERD	52.0	58.1	65.1	59.3	61.4	51.9	61.7	62.6	67.2	62.3
% di cui anche Carcere	28.9	39.2	42.4	33.5	35.0	33.1	49.4	45.7	44.6	49.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	10.2	5.7	8.3	13.4	14.2	7.5	5.7	7.2	12.2	6.7

<b>Area provenienza</b>	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
% Europa Est	29.3	25.1	20.5	21.1	21.5	19.7	20.7	20.8	24.4	20.9
% Altri paesi europei	5.3	5.3	4.0	5.7	4.5	8.8	6.1	6.8	8.1	9.2
% Africa Mediterranea	41.9	48.9	56.1	53.1	55.7	53.6	57.1	56.2	53.9	52.7
% Altra Africa	7.7	7.5	4.0	5.7	2.4	5.4	1.9	4.9	3.3	3.8
% Asia	8.9	9.7	10.4	10.5	10.6	6.3	3.1	6.0	3.3	0.0
% America Latina	5.7	3.5	4.3	3.8	5.3	3.8	9.2	4.2	0.0	5.0
% USA e Canada	1.2	0.0	0.7	0.0	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0	0.0
% Altro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	0.8	7.0	8.4

<b>Nazione</b>	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
% Tunisia	15.9	15.4	27.0	28.7	28.9	24.7	30.3	25.3	27.3	18.8
% Albania	8.5	3.1	6.1	4.8	3.3	5.4	5.0	1.5	5.9	5.4
% Romania	7.7	7.9	6.5	3.8	10.2	6.7	8.8	8.7	7.7	3.8
% Ucraina	3.3	4.4	1.4	2.4	1.6	2.9	0.8	1.9	1.8	3.3
% Pakistan	2.8	3.5	4.7	2.4	3.7	0.8	2.3	1.5	1.1	1.3

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 5 - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	43	42	47	25	26	21	20	21	15	18
nuovi contatti	39	29	37	20	22	20	20	20	15	17
età media	16.3	16.3	15.2	16.1	16.3	16.0	15.8	16.4	16.1	16.2
maschi	24	29	34	21	23	15	17	18	9	8
femmine	19	13	13	4	3	6	3	3	6	10
nativi	29	32	32	19	18	17	9	15	12	16
non nativi	14	10	12	6	8	4	11	6	3	2
residenti area metropolitana	39	34	39	21	23	18	15	17	11	16
residenti fuori area metropolitana	3	7	6	4	3	3	3	4	4	2
senza fissa dimora (SFD)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	7	7	8	4	3	3	1	2	3	4
di cui eroina	5	6	8	4	2	1	1	2	2	4
cocaina	9	4	10	3	3	0	0	1	0	0
di cui solo cocaina**	8	3	10	2	3	0	0	1	0	0
cannabinoidi	32	28	26	18	18	12	12	14	7	9
di cui solo cannabinoidi***	23	26	18	15	15	11	12	14	6	7
altre sostanze illegali	6	10	13	5	11	6	8	4	6	8
abuso concomitante di psicofarmaci****	2	1	0	2	1	1	0	1	3	0
di cui benzodiazepine	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
anche alcol	6	6	5	6	5	4	5	6	2	1
uso di una qualsiasi sostanza via vena	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0

Ricovero in Ospedale	8	5	4	2	5	5	0	1	2	3
Accesso al Pronto soccorso	25	23	16	11	12	9	15	11	7	12
Preso in carico al SERD	15	18	29	15	10	6	5	10	7	5
di cui anche Carcere Minorile	3	3	5	-	-	-	-	-	-	-
di cui anche Carcere	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0
di cui anche Unità Mobile Metadone	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 5 bis - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	43	42	47	25	26	21	20	21	15	18
% nuovi contatti	90.7	69.0	78.7	80.0	84.6	95.2	100.0	95.2	100.0	94.4
età media	16.3	16.3	15.2	16.1	16.3	16.0	15.8	16.4	16.1	16.2
% maschi	55.8	69.0	72.3	84.0	88.5	71.4	85.0	85.7	60.0	44.4
% femmine	44.2	31.0	27.7	16.0	11.5	28.6	15.0	14.3	40.0	55.6
% nativi	67.4	76.2	68.1	76.0	69.2	81.0	45.0	71.4	80.0	88.9
% non nativi	32.6	23.8	25.5	24.0	30.8	19.0	55.0	28.6	20.0	11.1
% residenti area metropolitana	90.7	81.0	83.0	84.0	88.5	85.7	75.0	81.0	73.3	88.9
% residenti fuori area metropolitana	7.0	16.7	12.8	16.0	11.5	14.3	15.0	19.0	26.7	11.1
% senza fissa dimora (SFD)	2.3	2.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	16.3	16.7	17.0	16.0	11.5	14.3	5.0	9.5	20.0	22.2
% di cui eroina	11.6	14.3	17.0	16.0	7.7	4.8	5.0	9.5	13.3	22.2
% cocaina	20.9	9.5	21.3	12.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
% di cui solo cocaina**	18.6	7.1	21.3	8.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
% cannabinoidi	74.4	66.7	55.3	72.0	69.2	57.1	60.0	66.7	46.7	50.0
% di cui solo cannabinoidi***	53.5	61.9	38.3	60.0	57.7	52.4	60.0	66.7	40.0	38.9
% altre sostanze illegali	14.0	23.8	27.7	20.0	42.3	28.6	40.0	19.0	40.0	44.4
% abuso concomitante di psicofarmaci****	4.7	2.4	0.0	8.0	3.8	4.8	0.0	4.8	20.0	0.0
% di cui benzodiazepine	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0
% anche alcol	14.0	14.3	10.6	24.0	19.2	19.0	25.0	28.6	13.3	5.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	2.4	0.0	0.0	3.8	0.0	5.0	4.8	6.7	0.0

% Ricovero in Ospedale	18.6	11.9	8.5	8.0	19.2	23.8	0.0	4.8	13.3	16.7
% Accesso al Pronto soccorso	58.1	54.8	34.0	44.0	46.2	42.9	75.0	52.4	46.7	66.7
% Presa in carico al SERD	34.9	42.9	61.7	60.0	38.5	28.6	25.0	47.6	46.7	27.8
% di cui anche Carcere Minorile	7.0	7.1	10.6	-	-	-	-	-	-	-
% di cui anche Carcere	0.0	0.0	2.1	4.0	3.8	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 6 - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche “nuovi” contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	39	29	37	20	22	20	20	20	15	17
età media	16.3	16.1	16.1	16.0	16.4	16.1	15.8	16.4	16.1	16.2
maschi	22	22	30	16	19	14	17	17	9	8
femmine	17	7	4	4	3	6	3	3	6	9
nativi	27	22	24	16	14	16	9	14	12	15
non nativi	12	7	10	4	8	4	11	6	3	2
residenti area metropolitana	35	23	28	17	19	17	15	16	11	15
residenti fuori area metropolitana	3	5	4	3	3	3	3	4	4	2
senza fissa dimora (SFD)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	4	2	5	3	2	3	1	2	3	3
di cui eroina	2	1	5	3	1	1	1	2	2	3
cocaina	8	2	6	1	2	0	0	1	0	0
di cui solo cocaina**	8	1	6	0	2	0	0	1	0	0
cannabinoidi	30	21	20	14	15	11	12	13	7	8
di cui solo cannabinoidi***	22	20	15	13	13	10	12	13	6	7
altre sostanze illegali	6	8	9	5	11	6	8	4	6	8
abuso concomitante di psicofarmaci****	2	1	0	2	1	1	0	1	3	0
di cui benzodiazepine	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
anche alcol	5	6	4	5	5	4	5	6	2	1
uso di una qualsiasi sostanza via vena	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0

Ricovero in Ospedale	8	5	2	2	5	5	0	1	2	3
Accesso al Pronto soccorso	24	22	13	10	11	8	15	11	7	12
Preso in carico al SERD	12	5	20	10	7	5	5	9	7	4
di cui anche Carcere Minorile	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-
di cui anche Carcere	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
di cui anche Unità Mobile Metadone	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 6 bis - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche “nuovi” contatti di soggetti minorenni.  
Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	39	29	37	20	22	20	20	20	15	17
età media	16.3	16.1	16.1	16.0	16.4	16.1	15.8	16.4	16.1	16.2
% maschi	56.4	75.9	81.1	80.0	86.4	70.0	85.0	85.0	60.0	47.1
% femmine	43.6	24.1	10.8	20.0	13.6	30.0	15.0	15.0	40.0	52.9
% nativi	69.2	75.9	64.9	80.0	63.6	80.0	45.0	70.0	80.0	88.2
% non nativi	30.8	24.1	27.0	20.0	36.4	20.0	55.0	30.0	20.0	11.8
% residenti area metropolitana	89.7	79.3	75.7	85.0	86.4	85.0	75.0	80.0	73.3	88.2
% residenti fuori area metropolitana	7.7	17.2	10.8	15.0	13.6	15.0	15.0	20.0	26.7	11.8
% senza fissa dimora (SFD)	2.6	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
% oppioidi	10.3	6.9	13.5	15.0	9.1	15.0	5.0	10.0	20.0	17.6
% di cui eroina	5.1	3.4	13.5	15.0	4.5	5.0	5.0	10.0	13.3	17.6
% cocaina	20.5	6.9	16.2	5.0	9.1	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
% di cui solo cocaina**	20.5	3.4	16.2	0.0	9.1	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
% cannabinoidi	76.9	72.4	54.1	70.0	68.2	55.0	60.0	65.0	46.7	47.1
% di cui solo cannabinoidi***	56.4	69.0	40.5	65.0	59.1	50.0	60.0	65.0	40.0	41.2
% altre sostanze illegali	15.4	27.6	24.3	25.0	50.0	30.0	40.0	20.0	40.0	47.1
% abuso concomitante di psicofarmaci****	5.1	3.4	0.0	10.0	4.5	5.0	0.0	5.0	20.0	0.0
% di cui benzodiazepine	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0
% anche alcol	12.8	20.7	10.8	25.0	22.7	20.0	25.0	30.0	13.3	5.9
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	3.4	0.0	0.0	4.5	0.0	5.0	5.0	6.7	0.0

% Ricovero in Ospedale	20.5	17.2	5.4	10.0	22.7	25.0	0.0	5.0	13.3	17.6
% Accesso al Pronto soccorso	61.5	75.9	35.1	50.0	50.0	40.0	75.0	55.0	46.7	70.6
% Presa in carico al SERD	30.8	17.2	54.1	50.0	31.8	25.0	25.0	45.0	46.7	23.5
% di cui anche Carcere Minorile	5.1	3.4	10.8	-	-	-	-	-	-	-
% di cui anche Carcere	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 7 - Consumo problematico di oppioidi\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	2085	2126	2273	2400	2534	2474	2598	2703	2817	2839
nuovi contatti	193	192	257	243	353	248	325	379	385	488
età media	42.9	42.2	41.3	40.9	40.4	39.4	38.6	38.2	37.2	36.8
maschi	1645	1668	1797	1919	2022	1989	2064	2148	2263	2258
femmine	440	458	476	481	512	485	534	555	554	581
nativi	1690	1732	1819	1899	2006	1980	2098	2177	2280	2338
non nativi	391	389	450	501	528	494	500	526	537	501
residenti area metropolitana	1642	1724	1671	1793	1879	1767	1827	1906	1934	1941
residenti fuori area metropolitana	391	327	550	563	599	652	736	794	814	842
senza fissa dimora (SFD)	149	149	146	163	183	158	123	117	205	190
decesso overdose	7	9	10	15	12	19	11	8	2	5

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
di cui solo oppioidi	1466	1519	1781	1891	2015	2062	2211	2339	2352	2136
di cui eroina	1986	2018	2152	2298	2349	2363	2485	2612	2732	2704
cocaina	619	586	492	509	490	412	387	364	465	703
cannabinoidi	154	159	206	166	187	199	164	170	194	257
altre sostanze illegali	88	68	83	56	134	69	85	78	15	114
abuso concomitante di psicofarmaci****	56	50	104	69	101	60	90	66	80	152
di cui benzodiazepine	31	29	52	39	40	41	56	38	38	64
anche alcol	188	174	187	203	229	199	217	230	222	296
uso di una qualsiasi sostanza via vena	915	956	1026	1086	1127	1163	1241	1334	1438	1352

Ricovero in Ospedale	121	115	110	96	152	105	122	109	99	100
Accesso al Pronto soccorso	170	141	138	134	268	281	321	320	185	222
Presa in carico al SERD	1991	2039	2153	2284	2345	2355	2462	2551	2683	2572
di cui anche Carcere	255	268	344	412	445	438	511	501	491	392
di cui anche Unità Mobile Metadone	139	138	145	171	181	131	138	146	191	172

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di oppioidi.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 7 bis - Consumo problematico di oppioidi\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	2085	2126	2273	2400	2534	2474	2598	2703	2817	2839
% nuovi contatti	9.3	9.0	11.3	10.1	13.9	10.0	12.5	14.0	13.7	17.2
età media	42.9	42.2	41.3	40.9	40.4	39.4	38.6	38.2	37.2	36.8
% maschi	78.9	78.5	79.1	80.0	79.8	80.4	79.4	79.5	80.3	79.5
% femmine	21.1	21.5	20.9	20.0	20.2	19.6	20.6	20.5	19.7	20.5
% nativi	81.1	81.5	80.0	79.1	79.2	80.0	80.8	80.5	80.9	82.4
% non nativi	18.8	18.3	19.8	20.9	20.8	20.0	19.2	19.5	19.1	17.6
% residenti area metropolitana	78.8	81.1	73.5	74.7	74.2	71.4	70.3	70.5	68.7	68.4
% residenti fuori area metropolitana	18.8	15.4	24.2	23.5	23.6	26.4	28.3	29.4	28.9	29.7
% senza fissa dimora (SFD)	7.1	7.0	6.4	6.8	7.2	6.4	4.7	4.3	7.3	6.7
% decesso overdose	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	0.4	0.3	0.1	0.2

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% di cui solo oppioidi	70.3	71.4	78.4	78.8	79.5	83.3	85.1	86.5	83.5	75.2
% di cui eroina	95.3	94.9	94.7	95.8	92.7	95.5	95.7	96.6	97.0	95.2
% cocaina	29.7	27.6	21.6	21.2	19.3	16.7	14.9	13.5	16.5	24.8
% cannabinoidi	7.4	7.5	9.1	6.9	7.4	8.0	6.3	6.3	6.9	9.1
% altre sostanze illegali	4.2	3.2	3.7	2.3	5.3	2.8	3.3	2.9	0.5	4.0
% abuso concomitante di psicofarmaci****	2.7	2.4	4.6	2.9	4.0	2.4	3.5	2.4	2.8	5.4
% di cui benzodiazepine	1.5	1.4	2.3	1.6	1.6	1.7	2.2	1.4	1.3	2.3
% anche alcol	9.0	8.2	8.2	8.5	9.0	8.0	8.4	8.5	7.9	10.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	43.9	45.0	45.1	45.3	44.5	47.0	47.8	49.4	51.0	47.6

% Ricovero in Ospedale	5.8	5.4	4.8	4.0	6.0	4.2	4.7	4.0	3.5	3.5
% Accesso al Pronto soccorso	8.2	6.6	6.1	5.6	10.6	11.4	12.4	11.8	6.6	7.8
% Presa in carico al SERD	95.5	95.9	94.7	95.2	92.5	95.2	94.8	94.4	95.2	90.6
% di cui anche Carcere	12.2	12.6	15.1	17.2	17.6	17.7	19.7	18.5	17.4	13.8
% di cui anche Unità Mobile Metadone	6.7	6.5	6.4	7.1	7.1	5.3	5.3	5.4	6.8	6.1

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di oppioidi.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 8 - Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	193	192	257	243	353	248	325	379	385	488
età media	37.3	36.2	34.2	36.6	37.8	32.5	34.3	34.9	31.9	32.4
maschi	155	141	204	194	270	207	258	297	321	393
femmine	38	51	53	49	83	41	67	82	64	95
nativi	115	121	140	150	230	145	199	238	227	342
non nativi	76	70	117	93	120	101	126	141	158	146
residenti area metropolitana	81	105	104	107	174	88	102	155	117	179
residenti fuori area metropolitana	99	78	134	124	163	142	212	223	243	281
senza fissa dimora (SFD)	25	16	27	28	42	20	24	17	52	41
decesso overdose	1	4	5	8	9	5	4	3	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
di cui solo oppioidi	113	106	185	174	255	199	282	343	346	352
di cui eroina	154	155	194	214	239	193	271	288	344	418
cocaina	80	76	72	69	72	49	43	36	39	136
cannabinoidi	18	23	28	15	35	44	22	17	22	55
altre sostanze illegali	11	5	4	6	28	5	8	12	2	25
abuso concomitante di psicofarmaci****	9	12	18	19	36	11	16	11	18	45
di cui benzodiazepine	3	4	8	7	0	7	5	0	1	9
anche alcol	11	12	14	17	32	10	24	26	16	35
uso di una qualsiasi sostanza via vena	42	44	36	53	73	47	98	97	103	100

Ricovero in Ospedale	31	28	32	20	82	31	19	30	21	24
Accesso al Pronto soccorso	35	33	39	31	74	47	71	82	45	78
Preso in carico al SERD	142	148	188	196	214	182	250	292	323	336
di cui anche Carcere	49	47	85	56	67	69	131	118	123	136
di cui anche Unità Mobile Metadone	28	24	29	42	58	27	30	30	60	33

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci



Tab. 8 bis - Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti . Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	193	192	257	243	353	248	325	379	385	488
età media	37.3	36.2	34.2	36.6	37.8	32.5	34.3	34.9	31.9	32.4
% maschi	80.3	73.4	79.4	79.8	76.5	83.5	79.4	78.4	83.4	80.5
% femmine	19.7	26.6	20.6	20.2	23.5	16.5	20.6	21.6	16.6	19.5
% nativi	59.6	63.0	54.5	61.7	65.2	58.5	61.2	62.8	59.0	70.1
% non nativi	39.4	36.5	45.5	38.3	34.0	40.7	38.8	37.2	41.0	29.9
% residenti area metropolitana	42.0	54.7	40.5	44.0	49.3	35.5	31.4	40.9	30.4	36.7
% residenti fuori area metropolitana	51.3	40.6	52.1	51.0	46.2	57.3	65.2	58.8	63.1	57.6
% senza fissa dimora (SFD)	13.0	8.3	10.5	11.5	11.9	8.1	7.4	4.5	13.5	8.4
% decesso overdose	0.5	2.1	1.9	3.3	2.5	2.0	1.2	0.8	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% di cui solo oppioidi	58.5	55.2	72.0	71.6	72.2	80.2	86.8	90.5	89.9	72.1
% di cui eroina	79.8	80.7	75.5	88.1	67.7	77.8	83.4	76.0	89.4	85.7
% cocaina	41.5	39.6	28.0	28.4	20.4	19.8	13.2	9.5	10.1	27.9
% cannabinoidi	9.3	12.0	10.9	6.2	9.9	17.7	6.8	4.5	5.7	11.3
% altre sostanze illegali	5.7	2.6	1.6	2.5	7.9	2.0	2.5	3.2	0.5	5.1
% abuso concomitante di psicofarmaci****	4.7	6.3	7.0	7.8	10.2	4.4	4.9	2.9	4.7	9.2
% di cui benzodiazepine	1.6	2.1	3.1	2.9	0.0	2.8	1.5	0.0	0.3	1.8
% anche alcol	5.7	6.3	5.4	7.0	9.1	4.0	7.4	6.9	4.2	7.2
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	21.8	22.9	14.0	21.8	20.7	19.0	30.2	25.6	26.8	20.5

% Ricovero in Ospedale	16.1	14.6	12.5	8.2	23.2	12.5	5.8	7.9	5.5	4.9
% Accesso al Pronto soccorso	18.1	17.2	15.2	12.8	21.0	19.0	21.8	21.6	11.7	16.0
% Presa in carico al SERD	73.6	77.1	73.2	80.7	60.6	73.4	76.9	77.0	83.9	68.9
% di cui anche Carcere	25.4	24.5	33.1	23.0	19.0	27.8	40.3	31.1	31.9	27.9
% di cui anche Unità Mobile Metadone	14.5	12.5	11.3	17.3	16.4	10.9	9.2	7.9	15.6	6.8

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 9 - Consumo problematico di cocaina\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1345	1269	1100	1058	1001	920	821	790	921	1142
nuovi contatti	327	307	272	241	238	208	182	177	159	268
età media	38.8	38.6	38.0	37.8	38.0	37.9	37.2	37.6	37.2	35.5
maschi	1139	1065	934	898	859	804	705	684	794	990
femmine	206	204	166	160	142	116	116	106	127	152
nativi	962	912	781	745	705	668	599	608	718	847
non nativi	382	355	319	312	295	249	222	182	203	295
residenti area metropolitana	946	898	735	717	668	623	535	540	618	674
residenti fuori area metropolitana	366	331	336	323	309	276	277	248	295	452
senza fissa dimora (SFD)	78	71	63	55	69	46	27	27	56	95
decesso overdose	2	4	3	2	3	0	0	1	1	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
di cui solo cocaina**	726	683	608	549	511	508	434	426	456	439
oppioidi	619	586	492	509	490	412	387	364	465	703
cannabinoidi	190	177	165	132	112	94	65	46	59	99
altre sostanze illegali	77	93	60	45	80	43	35	34	9	48
abuso concomitante di psicofarmaci**	42	45	44	34	33	28	24	22	44	81
di cui benzodiazepine	25	24	22	15	15	12	13	12	16	22
anche alcol	208	199	188	177	162	136	108	109	156	216
uso di una qualsiasi sostanza via vena	308	307	274	270	271	251	216	230	280	335

Ricovero in Ospedale	111	124	86	70	63	58	45	51	46	45
Accesso al Pronto soccorso	194	189	151	135	152	164	135	132	89	85
Preso in carico al SERD	1148	1078	929	915	859	784	713	686	804	975
di cui anche Carcere	343	354	305	345	323	265	260	243	267	319
di cui anche Unità Mobile Metadone	73	67	56	70	69	41	31	29	33	79

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cocaina.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 9 bis - Consumo problematico di cocaina\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1345	1269	1100	1058	1001	920	821	790	921	1142
% nuovi contatti	24.3	24.2	24.7	22.8	23.8	22.6	22.2	22.4	17.3	23.5
età media	38.8	38.6	38.0	37.8	38.0	37.9	37.2	37.6	37.2	35.5
% maschi	84.7	83.9	84.9	84.9	85.8	87.4	85.9	86.6	86.2	86.7
% femmine	15.3	16.1	15.1	15.1	14.2	12.6	14.1	13.4	13.8	13.3
% nativi	71.5	71.9	71.0	70.4	70.4	72.6	73.0	77.0	78.0	74.2
% non nativi	28.4	28.0	29.0	29.5	29.5	27.1	27.0	23.0	22.0	25.8
% residenti area metropolitana	70.3	70.8	66.8	67.8	66.7	67.7	65.2	68.4	67.1	59.0
% residenti fuori area metropolitana	27.2	26.1	30.5	30.5	30.9	30.0	33.7	31.4	32.0	39.6
% senza fissa dimora (SFD)	5.8	5.6	5.7	5.2	6.9	5.0	3.3	3.4	6.1	8.3
% decesso overdose	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% di cui solo cocaina**	54.0	53.8	55.3	51.9	51.0	55.2	52.9	53.9	49.5	38.4
% oppioidi	46.0	46.2	44.7	48.1	49.0	44.8	47.1	46.1	50.5	61.6
% cannabinoidi	14.1	13.9	15.0	12.5	11.2	10.2	7.9	5.8	6.4	8.7
% altre sostanze illegali	5.7	7.3	5.5	4.3	8.0	4.7	4.3	4.3	1.0	4.2
% abuso concomitante di psicofarmaci**	3.1	3.5	4.0	3.2	3.3	3.0	2.9	2.8	4.8	7.1
% di cui benzodiazepine	1.9	1.9	2.0	1.4	1.5	1.3	1.6	1.5	1.7	1.9
% anche alcol	15.5	15.7	17.1	16.7	16.2	14.8	13.2	13.8	16.9	18.9
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	22.9	24.2	24.9	25.5	27.1	27.3	26.3	29.1	30.4	29.3

% Ricovero in Ospedale	8.3	9.8	7.8	6.6	6.3	6.3	5.5	6.5	5.0	3.9
% Accesso al Pronto soccorso	14.4	14.9	13.7	12.8	15.2	17.8	16.4	16.7	9.7	7.4
% Presa in carico al SERD	85.4	84.9	84.5	86.5	85.8	85.2	86.8	86.8	87.3	85.4
% di cui anche Carcere	25.5	27.9	27.7	32.6	32.3	28.8	31.7	30.8	29.0	27.9
% di cui anche Unità Mobile Metadone	5.4	5.3	5.1	6.6	6.9	4.5	3.8	3.7	3.6	6.9

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cocaina.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 10 - Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	327	307	272	241	238	208	182	177	159	268
età media	34.0	33.9	33.8	34.3	33.5	34.4	33.1	34.3	34.7	32.2
maschi	288	264	235	212	207	193	165	155	140	236
femmine	39	43	37	29	31	15	17	22	19	32
nativi	197	187	142	154	152	135	113	121	112	180
non nativi	130	120	130	86	86	72	69	56	47	88
residenti area metropolitana	174	163	114	125	121	114	81	102	82	95
residenti fuori area metropolitana	142	134	143	111	108	88	97	75	73	165
senza fissa dimora (SFD)	22	13	17	11	23	11	8	4	7	22
decesso overdose	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
di cui solo cocaina**	247	231	200	172	166	159	139	141	120	132
oppioidi	80	76	72	69	72	49	43	36	39	136
cannabinoidi	63	73	72	49	48	42	28	15	7	36
altre sostanze illegali	14	25	10	10	30	7	4	5	0	7
abuso concomitante di psicofarmaci**	11	10	6	10	8	7	4	2	9	22
di cui benzodiazepine	8	6	2	3	3	2	3	0	1	2
anche alcol	58	46	37	41	43	37	24	20	25	42
uso di una qualsiasi sostanza via vena	29	26	21	24	27	21	21	13	15	27

Ricovero in Ospedale	28	40	21	17	25	12	8	19	10	12
Accesso al Pronto soccorso	79	86	60	47	65	65	56	49	30	26
Preso in carico al SERD	227	208	197	190	166	133	119	117	110	190
di cui anche Carcere	92	98	110	85	61	64	74	59	49	109
di cui anche Unità Mobile Metadone	23	15	14	15	25	11	8	7	4	12

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 10 bis - Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	327	307	272	241	238	208	182	177	159	268
età media	34.0	33.9	33.8	34.3	33.5	34.4	33.1	34.3	34.7	32.2
% maschi	88.1	86.0	86.4	88.0	87.0	92.8	90.7	87.6	88.1	88.1
% femmine	11.9	14.0	13.6	12.0	13.0	7.2	9.3	12.4	11.9	11.9
% nativi	60.2	60.9	52.2	63.9	63.9	64.9	62.1	68.4	70.4	67.2
% non nativi	39.8	39.1	47.8	35.7	36.1	34.6	37.9	31.6	29.6	32.8
% residenti area metropolitana	53.2	53.1	41.9	51.9	50.8	54.8	44.5	57.6	51.6	35.4
% residenti fuori area metropolitana	43.4	43.6	52.6	46.1	45.4	42.3	53.3	42.4	45.9	61.6
% senza fissa dimora (SFD)	6.7	4.2	6.3	4.6	9.7	5.3	4.4	2.3	4.4	8.2
% decesso overdose	0.0	0.7	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% di cui solo cocaina**	75.5	75.2	73.5	71.4	69.7	76.4	76.4	79.7	75.5	49.3
% oppioidi	24.5	24.8	26.5	28.6	30.3	23.6	23.6	20.3	24.5	50.7
% cannabinoidi	19.3	23.8	26.5	20.3	20.2	20.2	15.4	8.5	4.4	13.4
% altre sostanze illegali	4.3	8.1	3.7	4.1	12.6	3.4	2.2	2.8	0.0	2.6
% abuso concomitante di psicofarmaci**	3.4	3.3	2.2	4.1	3.4	3.4	2.2	1.1	5.7	8.2
% di cui benzodiazepine	2.4	2.0	0.7	1.2	1.3	1.0	1.6	0.0	0.6	0.7
% anche alcol	17.7	15.0	13.6	17.0	18.1	17.8	13.2	11.3	15.7	15.7
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	8.9	8.5	7.7	10.0	11.3	10.1	11.5	7.3	9.4	10.1

% Ricovero in Ospedale	8.6	13.0	7.7	7.1	10.5	5.8	4.4	10.7	6.3	4.5
% Accesso al Pronto soccorso	24.2	28.0	22.1	19.5	27.3	31.3	30.8	27.7	18.9	9.7
% Presa in carico al SERD	69.4	67.8	72.4	78.8	69.7	63.9	65.4	66.1	69.2	70.9
% di cui anche Carcere	28.1	31.9	40.4	35.3	25.6	30.8	40.7	33.3	30.8	40.7
% di cui anche Unità Mobile Metadone	7.0	4.9	5.1	6.2	10.5	5.3	4.4	4.0	2.5	4.5

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 11 - Consumo problematico di cannabinoidi\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	578	550	563	487	510	522	417	376	378	461
nuovi contatti	223	227	197	161	205	235	161	126	96	137
età media	33.4	33.4	34.4	33.6	33.0	32.2	33.4	33.2	33.0	32.3
maschi	496	473	485	416	446	462	360	330	333	393
femmine	82	77	78	71	64	60	57	46	45	68
nativi	389	385	395	345	336	364	299	296	304	351
non nativi	189	165	168	142	173	157	118	80	74	110
residenti area metropolitana	418	396	384	356	349	351	303	283	269	302
residenti fuori area metropolitana	154	146	166	129	155	166	112	93	107	158
senza fissa dimora (SFD)	19	19	18	15	20	15	8	11	22	26
decesso overdose	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
di cui solo cannabinoidi***	253	226	204	205	217	238	193	166	141	132
cocaina	190	177	165	132	112	94	65	46	59	99
oppioidi	154	159	206	166	187	199	164	170	194	257
altre sostanze illegali	41	37	36	27	40	26	20	13	13	25
abuso concomitante di psicofarmaci****	14	11	11	14	15	16	9	8	12	12
di cui benzodiazepine	9	3	3	4	4	7	4	5	8	5
anche alcol	95	83	90	70	81	74	70	47	45	61
uso di una qualsiasi sostanza via vena	60	62	81	51	51	59	51	73	79	94

Ricovero in Ospedale	83	60	62	55	51	57	35	27	27	26
Accesso al Pronto soccorso	140	126	89	68	103	138	86	68	42	30
Preso in carico al SERD	392	399	443	382	380	370	315	307	320	396
di cui anche Carcere	125	131	134	126	142	116	86	60	65	106
di cui anche Unità Mobile Metadone	8	5	8	4	10	5	6	7	5	13

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cannabinoidi.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 11 bis - Consumo problematico di cannabinoidi\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	578	550	563	487	510	522	417	376	378	461
% nuovi contatti	38.6	41.3	35.0	33.1	40.2	45.0	38.6	33.5	25.4	29.7
età media	33.4	33.4	34.4	33.6	33.0	32.2	33.4	33.2	33.0	32.3
% maschi	85.8	86.0	86.1	85.4	87.5	88.5	86.3	87.8	88.1	85.2
% femmine	14.2	14.0	13.9	14.6	12.5	11.5	13.7	12.2	11.9	14.8
% nativi	67.3	70.0	70.2	70.8	65.9	69.7	71.7	78.7	80.4	76.1
% non nativi	32.7	30.0	29.8	29.2	33.9	30.1	28.3	21.3	19.6	23.9
% residenti area metropolitana	72.3	72.0	68.2	73.1	68.4	67.2	72.7	75.3	71.2	65.5
% residenti fuori area metropolitana	26.6	26.5	29.5	26.5	30.4	31.8	26.9	24.7	28.3	34.3
% senza fissa dimora (SFD)	3.3	3.5	3.2	3.1	3.9	2.9	1.9	2.9	5.8	5.6
% decesso overdose	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% di cui solo cannabinoidi***	43.8	41.1	36.2	42.1	42.5	45.6	46.3	44.1	37.3	28.6
% cocaina	32.9	32.2	29.3	27.1	22.0	18.0	15.6	12.2	15.6	21.5
% oppioidi	26.6	28.9	36.6	34.1	36.7	38.1	39.3	45.2	51.3	55.7
% altre sostanze illegali	7.1	6.7	6.4	5.5	7.8	5.0	4.8	3.5	3.4	5.4
% abuso concomitante di psicofarmaci** **	2.4	2.0	2.0	2.9	2.9	3.1	2.2	2.1	3.2	2.6
% di cui benzodiazepine	1.6	0.5	0.5	0.8	0.8	1.3	1.0	1.3	2.1	1.1
% anche alcol	16.4	15.1	16.0	14.4	15.9	14.2	16.8	12.5	11.9	13.2
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	10.4	11.3	14.4	10.5	10.0	11.3	12.2	19.4	20.9	20.4

% Ricovero in Ospedale	14.4	10.9	11.0	11.3	10.0	10.9	8.4	7.2	7.1	5.6
% Accesso al Pronto soccorso	24.2	22.9	15.8	14.0	20.2	26.4	20.6	18.1	11.1	6.5
% Presa in carico al SERD	67.8	72.5	78.7	78.4	74.5	70.9	75.5	81.6	84.7	85.9
% di cui anche Carcere	21.6	23.8	23.8	25.9	27.8	22.2	20.6	16.0	17.2	23.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	1.4	0.9	1.4	0.8	2.0	1.0	1.4	1.9	1.3	2.8

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cannabinoidi.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 12 - Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	223	227	197	161	205	235	161	126	96	137
età media	27.2	28.9	29.2	28.8	29.1	27.9	29.2	28.5	27.9	28.3
maschi	187	198	173	135	179	204	139	109	87	120
femmine	36	29	24	26	26	31	22	17	9	17
nativi	137	146	106	108	121	161	101	90	75	95
non nativi	86	81	91	53	83	74	60	36	21	42
residenti area metropolitana	146	139	98	102	124	139	101	83	60	66
residenti fuori area metropolitana	73	84	90	58	78	94	58	43	35	70
senza fissa dimora (SFD)	2	4	9	4	6	6	1	1	2	3
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
di cui solo cannabinoidi***	144	134	100	99	125	151	111	95	67	51
cocaina	63	73	72	49	48	42	28	15	7	36
oppioidi	18	23	28	15	35	44	22	17	22	55
altre sostanze illegali	13	10	10	7	21	9	6	2	3	6
abuso concomitante di psicofarmaci****	10	7	0	8	7	6	3	2	3	2
di cui benzodiazepine	8	3	0	1	2	2	1	0	2	0
anche alcol	38	36	26	28	32	34	38	22	11	12
uso di una qualsiasi sostanza via vena	4	11	9	0	8	5	5	3	6	12

Ricovero in Ospedale	36	27	20	23	33	27	16	13	9	14
Accesso al Pronto soccorso	97	90	51	42	65	90	61	42	27	19
Presa in carico al SERD	104	122	129	102	112	127	82	71	62	103
di cui anche Carcere	34	53	60	42	49	47	40	22	12	52
di cui anche Unità Mobile Metadone	2	3	4	2	3	3	1	2	0	2

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci



Tab. 12 bis - Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	223	227	197	161	205	235	161	126	96	137
età media	27.2	28.9	29.2	28.8	29.1	27.9	29.2	28.5	27.9	28.3
% maschi	83.9	87.2	87.8	83.9	87.3	86.8	86.3	86.5	90.6	87.6
% femmine	16.1	12.8	12.2	16.1	12.7	13.2	13.7	13.5	9.4	12.4
% nativi	61.4	64.3	53.8	67.1	59.0	68.5	62.7	71.4	78.1	69.3
% non nativi	38.6	35.7	46.2	32.9	40.5	31.5	37.3	28.6	21.9	30.7
% residenti area metropolitana	65.5	61.2	49.7	63.4	60.5	59.1	62.7	65.9	62.5	48.2
% residenti fuori area metropolitana	32.7	37.0	45.7	36.0	38.0	40.0	36.0	34.1	36.5	51.1
% senza fissa dimora (SFD)	0.9	1.8	4.6	2.5	2.9	2.6	0.6	0.8	2.1	2.2
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% di cui solo cannabinoidi***	64.6	59.0	50.8	61.5	61.0	64.3	68.9	75.4	69.8	37.2
% cocaina	28.3	32.2	36.5	30.4	23.4	17.9	17.4	11.9	7.3	26.3
% oppioidi	8.1	10.1	14.2	9.3	17.1	18.7	13.7	13.5	22.9	40.1
% altre sostanze illegali	5.8	4.4	5.1	4.3	10.2	3.8	3.7	1.6	3.1	4.4
% abuso concomitante di psicofarmaci****	4.5	3.1	0.0	5.0	3.4	2.6	1.9	1.6	3.1	1.5
% di cui benzodiazepine	3.6	1.3	0.0	0.6	1.0	0.9	0.6	0.0	2.1	0.0
% anche alcol	17.0	15.9	13.2	17.4	15.6	14.5	23.6	17.5	11.5	8.8
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	1.8	4.8	4.6	0.0	3.9	2.1	3.1	2.4	6.3	8.8

% Ricovero in Ospedale	16.1	11.9	10.2	14.3	16.1	11.5	9.9	10.3	9.4	10.2
% Accesso al Pronto soccorso	43.5	39.6	25.9	26.1	31.7	38.3	37.9	33.3	28.1	13.9
% Presa in carico al SERD	46.6	53.7	65.5	63.4	54.6	54.0	50.9	56.3	64.6	75.2
% di cui anche Carcere	15.2	23.3	30.5	26.1	23.9	20.0	24.8	17.5	12.5	38.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.9	1.3	2.0	1.2	1.5	1.3	0.6	1.6	0.0	1.5

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 13 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	2648	2671	2742	2837	2854	2858	2908	3029	3189	3027
mai stato in precedenza al SERD	545	408	422	442	422	376	408	457	532	491
età media	41.2	40.7	40.1	39.6	39.3	38.8	38.1	37.5	36.8	36.4
maschi	2167	2181	2241	2333	2353	2356	2373	2478	2609	2460
femmine	481	490	501	504	501	502	535	551	580	567
nativi	2085	2098	2144	2203	2193	2236	2288	2411	2566	2488
non nativi	561	569	594	634	657	616	620	618	623	539
residenti area metropolitana	2066	2112	2004	2113	2098	2048	2045	2125	2218	2146
residenti fuori area metropolitana	518	467	676	677	702	757	825	900	909	845
senza fissa dimora (SFD)	172	175	171	168	189	163	127	120	189	172
decesso overdose	4	1	4	4	4	6	5	2	3	3

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
eroina	1937	1974	2100	2248	2284	2307	2421	2504	2632	2205
cocaina	1098	1034	884	880	829	741	680	652	737	582
cannabinoidi	376	384	423	371	372	352	307	301	307	229
crack	23	19	21	21	17	19	13	16	12	12
amfetamine	5	4	9	11	11	5	4	4	9	7
ecstasy	4	3	7	1	2	1	0	3	8	7

benzodiazepine	28	37	43	42	38	35	38	46	39	34
tramadolo	5	5	1	0	4	3	3	3	4	3
codeina	4	4	0	0	4	4	2	3	0	0
ossicodone	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0

anche gioco	6	7	5	5	4	5	3	0	0	0
anche alcol	171	179	167	196	177	179	169	183	172	160
uso di una qualsiasi sostanza via vena	939	975	1041	1104	1145	1179	1253	1357	1471	1362

anche ricovero in Ospedale	124	107	93	68	74	78	101	85	83	82
anche accesso al Pronto soccorso	149	132	116	115	203	228	214	231	143	140
anche Carcere	441	479	516	597	628	615	687	681	645	481
anche Unità Mobile Metadone	151	143	149	172	180	131	140	145	196	158

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

Tab. 13 bis – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	2648	2671	2742	2837	2854	2858	2908	3029	3189	3027
% mai stato in precedenza al SERD	20.6	15.3	15.4	15.6	14.8	13.2	14.0	15.1	16.7	16.2
età media	41.2	40.7	40.1	39.6	39.3	38.8	38.1	37.5	36.8	36.4
% maschi	81.8	81.7	81.7	82.2	82.4	82.4	81.6	81.8	81.8	81.3
% femmine	18.2	18.3	18.3	17.8	17.6	17.6	18.4	18.2	18.2	18.7
% nativi	78.7	78.5	78.2	77.7	76.8	78.2	78.7	79.6	80.5	82.2
% non nativi	21.2	21.3	21.7	22.3	23.0	21.6	21.3	20.4	19.5	17.8
% residenti area metropolitana	78.0	79.1	73.1	74.5	73.5	71.7	70.3	70.2	69.6	70.9
% residenti fuori area metropolitana	19.6	17.5	24.7	23.9	24.6	26.5	28.4	29.7	28.5	27.9
% senza fissa dimora (SFD)	6.5	6.6	6.2	5.9	6.6	5.7	4.4	4.0	5.9	5.7
% decesso overdose	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% eroina	73.1	73.9	76.6	79.2	80.0	80.7	83.3	82.7	82.5	72.8
% cocaina	41.5	38.7	32.2	31.0	29.0	25.9	23.4	21.5	23.1	19.2
% cannabinoidi	14.2	14.4	15.4	13.1	13.0	12.3	10.6	9.9	9.6	7.6
% crack	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4
% amfetamine	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2
% ecstasy	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2

% benzodiazepine	1.1	1.4	1.6	1.5	1.3	1.2	1.3	1.5	1.2	1.1
% tramadolo	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
% codeina	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
% ossicodone	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% anche gioco	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
% anche alcol	6.5	6.7	6.1	6.9	6.2	6.3	5.8	6.0	5.4	5.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	35.5	36.5	38.0	38.9	40.1	41.3	43.1	44.8	46.1	45.0

% anche ricovero in Ospedale	4.7	4.0	3.4	2.4	2.6	2.7	3.5	2.8	2.6	2.7
% anche accesso al Pronto soccorso	5.6	4.9	4.2	4.1	7.1	8.0	7.4	7.6	4.5	4.6
% anche Carcere	16.7	17.9	18.8	21.0	22.0	21.5	23.6	22.5	20.2	15.9
% anche Unità Mobile Metadone	5.7	5.4	5.4	6.1	6.3	4.6	4.8	4.8	6.1	5.2

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

Tab. 14 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" utenti\* in carico al SERD. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	545	408	422	442	422	376	408	457	532	491
età media	34.8	33.9	32.7	33.1	32.8	32.5	32.2	32.0	31.6	34.8
maschi	481	350	364	382	355	332	348	390	460	416
femmine	64	58	58	60	67	44	60	67	72	75
nativi	345	259	238	299	265	249	237	298	338	335
non nativi	200	149	184	143	156	125	171	159	194	156
residenti area metropolitana	319	239	212	253	225	201	171	201	222	212
residenti fuori area metropolitana	192	151	182	177	181	162	225	254	290	267
senza fissa dimora (SFD)	59	31	41	36	52	30	29	12	44	31
decesso overdose	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
eroina	258	174	198	244	238	199	259	279	364	293
cocaina	335	232	226	220	189	155	129	125	131	131
cannabinoidi	139	126	141	107	119	124	90	70	66	69
crack	12	8	3	4	0	1	0	0	1	2
amfetamine	1	0	3	3	6	2	2	2	2	3
ecstasy	2	0	4	1	1	1	0	0	1	0

benzodiazepine	5	5	4	8	0	3	2	3	4	8
tramadolo	1	1	0	0	1	1	0	2	1	0
codeina	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ossicodone	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

anche gioco	1	0	2	1	0	1	1	0	0	0
anche alcol	24	20	26	30	30	30	23	24	18	38
uso di una qualsiasi sostanza via vena	81	62	51	76	91	61	105	93	131	116

anche ricovero in Ospedale	30	21	13	16	9	9	6	10	9	11
anche accesso al Pronto soccorso	35	26	20	22	33	28	22	26	21	21
anche Carcere	163	131	164	137	129	124	193	196	200	185
anche Unità Mobile Metadone	67	36	34	50	63	32	36	27	64	36

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti al SERD in precedenza

Tab. 14 bis – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	545	408	422	442	422	376	408	457	532	491
età media	34.8	33.9	32.7	33.1	32.8	32.5	32.2	32.0	31.6	34.8
% maschi	88.3	85.8	86.3	86.4	84.1	88.3	85.3	85.3	86.5	84.7
% femmine	11.7	14.2	13.7	13.6	15.9	11.7	14.7	14.7	13.5	15.3
% nativi	63.3	63.5	56.4	67.6	62.8	66.2	58.1	65.2	63.5	68.2
% non nativi	36.7	36.5	43.6	32.4	37.0	33.2	41.9	34.8	36.5	31.8
% residenti area metropolitana	58.5	58.6	50.2	57.2	53.3	53.5	41.9	44.0	41.7	43.2
% residenti fuori area metropolitana	35.2	37.0	43.1	40.0	42.9	43.1	55.1	55.6	54.5	54.4
% senza fissa dimora (SFD)	10.8	7.6	9.7	8.1	12.3	8.0	7.1	2.6	8.3	6.3
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% eroina	47.3	42.6	46.9	55.2	56.4	52.9	63.5	61.1	68.4	59.7
% cocaina	61.5	56.9	53.6	49.8	44.8	41.2	31.6	27.4	24.6	26.7
% cannabinoidi	25.5	30.9	33.4	24.2	28.2	33.0	22.1	15.3	12.4	14.1
% crack	2.2	2.0	0.7	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4
% amfetamine	0.2	0.0	0.7	0.7	1.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6
% ecstasy	0.4	0.0	0.9	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0

% benzodiazepine	0.9	1.2	0.9	1.8	0.0	0.8	0.5	0.7	0.8	1.6
% tramadolo	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0
% codeina	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% ossicodone	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% anche gioco	0.2	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
% anche alcol	4.4	4.9	6.2	6.8	7.1	8.0	5.6	5.3	3.4	7.7
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	14.9	15.2	12.1	17.2	21.6	16.2	25.7	20.4	24.6	23.6

% anche ricovero in Ospedale	5.5	5.1	3.1	3.6	2.1	2.4	1.5	2.2	1.7	2.2
% anche accesso al Pronto soccorso	6.4	6.4	4.7	5.0	7.8	7.4	5.4	5.7	3.9	4.3
% anche Carcere	29.9	32.1	38.9	31.0	30.6	33.0	47.3	42.9	37.6	37.7
% anche Unità Mobile Metadone	12.3	8.8	8.1	11.3	14.9	8.5	8.8	5.9	12.0	7.3

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti al SERD in precedenza

Tab. 15 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	498	482	490	371	480	685	632	610	408	449
nuovi contatti	247	248	254	176	232	348	307	271	195	261
età media	37.1	37.7	37.9	36.6	37.0	36.1	37.0	38.9	36.5	38.8
maschi	399	381	364	288	372	533	491	455	312	333
femmine	99	101	126	83	108	152	141	155	96	116
nativi	350	350	346	270	369	538	510	495	301	367
non nativi	144	130	141	100	107	145	122	115	107	82
residenti area metropolitana	343	327	339	263	342	491	426	448	276	325
residenti fuori area metropolitana	150	143	132	106	132	181	205	161	122	120
senza fissa dimora (SFD)	20	23	14	11	23	35	24	22	28	22
decesso overdose	0	1	1	0	0	1	5	0	1	1

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	170	141	138	134	268	281	321	320	185	222
di cui eroina	141	113	102	108	214	234	289	239	144	153
cocaina	194	189	151	135	152	174	147	132	89	90
di cui solo cocaina**	121	125	100	86	74	105	81	69	40	27
cannabinoidi	140	126	89	68	103	139	90	68	42	33
di cui solo cannabinoidi***	102	86	51	53	70	87	67	41	26	20
altre sostanze illegali	197	195	280	142	225	257	234	198	125	255
abuso concomitante di psicofarmaci****	66	70	72	56	61	69	79	122	59	100
di cui benzodiazepine	31	40	29	15	20	27	39	46	28	37
anche alcol	175	192	184	136	171	209	224	233	135	154
uso di una qualsiasi sostanza via vena	65	59	51	63	126	139	159	141	91	93

anche ricovero in Ospedale	69	72	44	39	54	66	68	57	56	63
anche presa in carico al SERD	149	132	116	115	203	242	245	231	143	140
di cui anche Carcere	11	21	21	14	28	25	28	27	28	10
di cui anche Unità Mobile Metadone	17	19	10	9	21	24	22	19	15	16

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 15 bis – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso.  
Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	498	482	490	371	480	685	632	610	408	449
% nuovi contatti	49.6	51.5	51.8	47.4	48.3	50.8	48.6	44.4	47.8	58.1
età media	37.1	37.7	37.9	36.6	37.0	36.1	37.0	38.9	36.5	38.8
% maschi	80.1	79.0	74.3	77.6	77.5	77.8	77.7	74.6	76.5	74.2
% femmine	19.9	21.0	25.7	22.4	22.5	22.2	22.3	25.4	23.5	25.8
% nativi	70.3	72.6	70.6	72.8	76.9	78.5	80.7	81.1	73.8	81.7
% non nativi	28.9	27.0	28.8	27.0	22.3	21.2	19.3	18.9	26.2	18.3
% residenti area metropolitana	68.9	67.8	69.2	70.9	71.3	71.7	67.4	73.4	67.6	72.4
% residenti fuori area metropolitana	30.1	29.7	26.9	28.6	27.5	26.4	32.4	26.4	29.9	26.7
% senza fissa dimora (SFD)	4.0	4.8	2.9	3.0	4.8	5.1	3.8	3.6	6.9	4.9
% decesso overdose	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.2	0.2

<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
% oppioidi	34.1	29.3	28.2	36.1	55.8	41.0	50.8	52.5	45.3	49.4
% di cui eroina	28.3	23.4	20.8	29.1	44.6	34.2	45.7	39.2	35.3	34.1
% cocaina	39.0	39.2	30.8	36.4	31.7	25.4	23.3	21.6	21.8	20.0
% di cui solo cocaina**	24.3	25.9	20.4	23.2	15.4	15.3	12.8	11.3	9.8	6.0
% cannabinoidi	28.1	26.1	18.2	18.3	21.5	20.3	14.2	11.1	10.3	7.3
% di cui solo cannabinoidi***	20.5	17.8	10.4	14.3	14.6	12.7	10.6	6.7	6.4	4.5
% altre sostanze illegali	39.6	40.5	57.1	38.3	46.9	37.5	37.0	32.5	30.6	56.8
% abuso concomitante di psicofarmaci****	13.3	14.5	14.7	15.1	12.7	10.1	12.5	20.0	14.5	22.3
% di cui benzodiazepine	6.2	8.3	5.9	4.0	4.2	3.9	6.2	7.5	6.9	8.2
% anche alcol	35.1	39.8	37.6	36.7	35.6	30.5	35.4	38.2	33.1	34.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	13.1	12.2	10.4	17.0	26.3	20.3	25.2	23.1	22.3	20.7

% anche ricovero in Ospedale	13.9	14.9	9.0	10.5	11.3	9.6	10.8	9.3	13.7	14.0
% anche presa in carico al SERD	29.9	27.4	23.7	31.0	42.3	35.3	38.8	37.9	35.0	31.2
% di cui anche Carcere	2.2	4.4	4.3	3.8	5.8	3.6	4.4	4.4	6.9	2.2
% di cui anche Unità Mobile Metadone	3.4	3.9	2.0	2.4	4.4	3.5	3.5	3.1	3.7	3.6

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 16 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	247	248	254	176	232	348	307	271	195	261
età media	31.5	33.7	35.1	32.5	33.2	31.7	33.5	36.1	33.0	38.6
maschi	191	193	185	138	177	267	242	196	141	190
femmine	56	55	69	38	55	81	65	75	54	71
nativi	150	168	164	114	158	246	222	191	128	200
non nativi	93	80	87	61	72	102	85	80	67	61
residenti area metropolitana	135	141	137	98	126	216	160	168	113	164
residenti fuori area metropolitana	108	100	104	77	104	126	146	103	77	93
senza fissa dimora (SFD)	3	5	2	2	6	3	4	4	4	5
decesso overdose	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	35	33	39	31	74	48	76	82	45	80
di cui eroina	23	19	16	21	45	24	47	16	39	30
cocaina	79	86	60	47	65	66	57	49	30	27
di cui solo cocaina**	62	72	48	39	48	61	49	37	24	17
cannabinoidi	97	90	51	42	65	90	62	42	27	18
di cui solo cannabinoidi***	85	68	39	38	55	74	55	35	22	15
altre sostanze illegali	87	86	134	74	106	152	140	105	105	170
abuso concomitante di psicofarmaci****	26	29	25	22	24	22	23	44	27	40
di cui benzodiazepine	13	20	8	6	5	6	10	0	10	11
anche alcol	71	76	72	51	73	82	100	98	37	45
uso di una qualsiasi sostanza via vena	2	5	2	4	11	3	10	9	6	7

anche ricovero in Ospedale	21	22	7	8	14	19	18	14	24	20
anche presa in carico al SERD	19	19	8	16	22	18	21	18	17	16
di cui anche Carcere	1	5	5	3	3	6	5	1	4	3
di cui anche Unità Mobile Metadone	3	7	2	2	6	2	5	5	3	4

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci



**Tab. 16 bis – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	247	248	254	176	232	348	307	271	195	261
età media	31.5	33.7	35.1	32.5	33.2	31.7	33.5	36.1	33.0	38.6
% maschi	77.3	77.8	72.8	78.4	76.3	76.7	78.8	72.3	72.3	72.8
% femmine	22.7	22.2	27.2	21.6	23.7	23.3	21.2	27.7	27.7	27.2
% nativi	60.7	67.7	64.6	64.8	68.1	70.7	72.3	70.5	65.6	76.6
% non nativi	37.7	32.3	34.3	34.7	31.0	29.3	27.7	29.5	34.4	23.4
% residenti area metropolitana	54.7	56.9	53.9	55.7	54.3	62.1	52.1	62.0	57.9	62.8
% residenti fuori area metropolitana	43.7	40.3	40.9	43.8	44.8	36.2	47.6	38.0	39.5	35.6
% senza fissa dimora (SFD)	1.2	2.0	0.8	1.1	2.6	0.9	1.3	1.5	2.1	1.9
% decesso overdose	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	14.2	13.3	15.4	17.6	31.9	13.8	24.8	30.3	23.1	30.7
% di cui eroina	9.3	7.7	6.3	11.9	19.4	6.9	15.3	5.9	20.0	11.5
% cocaina	32.0	34.7	23.6	26.7	28.0	19.0	18.6	18.1	15.4	10.3
% di cui solo cocaina**	25.1	29.0	18.9	22.2	20.7	17.5	16.0	13.7	12.3	6.5
% cannabinoidi	39.3	36.3	20.1	23.9	28.0	25.9	20.2	15.5	13.8	6.9
% di cui solo cannabinoidi***	34.4	27.4	15.4	21.6	23.7	21.3	17.9	12.9	11.3	5.7
% altre sostanze illegali	35.2	34.7	52.8	42.0	45.7	43.7	45.6	38.7	53.8	65.1
% abuso concomitante di psicofarmaci****	10.5	11.7	9.8	12.5	10.3	6.3	7.5	16.2	13.8	15.3
% di cui benzodiazepine	5.3	8.1	3.1	3.4	2.2	1.7	3.3	0.0	5.1	4.2
% anche alcol	28.7	30.6	28.3	29.0	31.5	23.6	32.6	36.2	19.0	17.2
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.8	2.0	0.8	2.3	4.7	0.9	3.3	3.3	3.1	2.7

% anche ricovero in Ospedale	8.5	8.9	2.8	4.5	6.0	5.5	5.9	5.2	12.3	7.7
% anche presa in carico al SERD	7.7	7.7	3.1	9.1	9.5	5.2	6.8	6.6	8.7	6.1
% di cui anche Carcere	0.4	2.0	2.0	1.7	1.3	1.7	1.6	0.4	2.1	1.1
% di cui anche Unità Mobile Metadone	1.2	2.8	0.8	1.1	2.6	0.6	1.6	1.8	1.5	1.5

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 17 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	291	277	254	250	283	187	215	265	326	214
nuovi contatti	122	123	106	99	171	73	82	133	188	101
età media	41.2	42.5	42.3	43.1	43.4	37.8	42.0	44.6	47.3	42.0
maschi	199	184	181	172	205	149	142	147	170	119
femmine	92	93	73	78	78	38	73	118	156	95
nativi	229	233	218	204	239	152	181	226	283	188
non nativi	61	42	36	46	43	35	34	39	43	26
residenti area metropolitana	249	240	217	214	254	158	182	218	272	178
residenti fuori area metropolitana	42	34	36	35	28	27	33	47	54	35
senza fissa dimora (SFD)	9	13	3	8	8	6	10	3	7	8
decesso overdose	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	121	113	110	96	152	105	122	109	99	100
di cui eroina	84	75	67	46	63	69	99	80	72	69
cocaina	111	124	86	70	63	58	45	51	46	45
di cui solo cocaina**	62	71	51	43	33	26	18	24	22	17
cannabinoidi	83	60	62	55	51	57	35	27	27	26
di cui solo cannabinoidi***	45	33	29	33	37	35	22	15	15	17
altre sostanze illegali	145	134	135	135	121	66	101	144	190	129
abuso concomitante di psicofarmaci****	36	39	41	37	59	27	46	67	165	61
di cui benzodiazepine	15	12	14	9	11	12	18	16	50	17
anche alcol	83	92	64	72	75	52	70	66	60	57
uso di una qualsiasi sostanza via vena	49	49	53	30	42	48	50	54	50	47

anche accesso al Pronto soccorso	69	72	44	39	54	66	68	57	56	63
anche presa in carico al SERD	124	107	93	68	74	78	101	85	83	82
di cui anche Carcere	8	10	10	4	7	2	12	8	16	1
di cui anche Unità Mobile Metadone	6	8	3	4	4	3	10	5	2	2

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 17 bis – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	291	277	254	250	283	187	215	265	326	214
% nuovi contatti	41.9	44.4	41.7	39.6	60.4	39.0	38.1	50.2	57.7	47.2
età media	41.2	42.5	42.3	43.1	43.4	37.8	42.0	44.6	47.3	42.0
% maschi	68.4	66.4	71.3	68.8	72.4	79.7	66.0	55.5	52.1	55.6
% femmine	31.6	33.6	28.7	31.2	27.6	20.3	34.0	44.5	47.9	44.4
% nativi	78.7	84.1	85.8	81.6	84.5	81.3	84.2	85.3	86.8	87.9
% non nativi	21.0	15.2	14.2	18.4	15.2	18.7	15.8	14.7	13.2	12.1
% residenti area metropolitana	85.6	86.6	85.4	85.6	89.8	84.5	84.7	82.3	83.4	83.2
% residenti fuori area metropolitana	14.4	12.3	14.2	14.0	9.9	14.4	15.3	17.7	16.6	16.4
% senza fissa dimora (SFD)	3.1	4.7	1.2	3.2	2.8	3.2	4.7	1.1	2.1	3.7
% decesso overdose	0.7	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	41.6	40.8	43.3	38.4	53.7	56.1	56.7	41.1	30.4	46.7
% di cui eroina	28.9	27.1	26.4	18.4	22.3	36.9	46.0	30.2	22.1	32.2
% cocaina	38.1	44.8	33.9	28.0	22.3	31.0	20.9	19.2	14.1	21.0
% di cui solo cocaina**	21.3	25.6	20.1	17.2	11.7	13.9	8.4	9.1	6.7	7.9
% cannabinoidi	28.5	21.7	24.4	22.0	18.0	30.5	16.3	10.2	8.3	12.1
% di cui solo cannabinoidi***	15.5	11.9	11.4	13.2	13.1	18.7	10.2	5.7	4.6	7.9
% altre sostanze illegali	49.8	48.4	53.1	54.0	42.8	35.3	47.0	54.3	58.3	60.3
% abuso concomitante di psicofarmaci****	12.4	14.1	16.1	14.8	20.8	14.4	21.4	25.3	50.6	28.5
% di cui benzodiazepine	5.2	4.3	5.5	3.6	3.9	6.4	8.4	6.0	15.3	7.9
% anche alcol	28.5	33.2	25.2	28.8	26.5	27.8	32.6	24.9	18.4	26.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	16.8	17.7	20.9	12.0	14.8	25.7	23.3	20.4	15.3	22.0

% anche accesso al Pronto soccorso	23.7	26.0	17.3	15.6	19.1	35.3	31.6	21.5	17.2	29.4
% anche presa in carico al SERD	42.6	38.6	36.6	27.2	26.1	41.7	47.0	32.1	25.5	38.3
% di cui anche Carcere	2.7	3.6	3.9	1.6	2.5	1.1	5.6	3.0	4.9	0.5
% di cui anche Unità Mobile Metadone	2.1	2.9	1.2	1.6	1.4	1.6	4.7	1.9	0.6	0.9

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 18 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	122	123	106	99	171	73	82	133	188	101
età media	40.6	43.0	43.9	45.0	43.8	34.6	44.0	46.2	51.5	44.0
maschi	82	74	72	59	119	59	47	66	77	51
femmine	40	49	34	40	52	14	35	67	111	50
nativi	91	100	89	76	141	58	65	105	163	86
non nativi	30	21	17	23	29	15	17	28	25	15
residenti area metropolitana	94	96	76	77	146	56	67	99	150	74
residenti fuori area metropolitana	28	25	29	21	24	16	15	34	38	27
senza fissa dimora (SFD)	2	1	0	3	1	0	1	0	0	0
decesso overdose	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
oppioidi	31	28	32	20	82	31	19	30	21	24
di cui eroina	8	6	0	6	46	5	3	6	3	8
cocaina	28	40	21	17	25	12	8	19	10	12
di cui solo cocaina**	24	32	18	14	15	7	7	14	9	9
cannabinoidi	36	27	20	23	33	27	16	13	9	14
di cui solo cannabinoidi***	26	22	15	17	26	22	14	11	4	12
altre sostanze illegali	55	59	54	56	61	18	47	82	154	64
abuso concomitante di psicofarmaci****	11	17	11	13	38	7	17	22	120	18
di cui benzodiazepine	3	5	2	1	2	2	8	0	35	5
anche alcol	16	24	13	15	23	7	19	12	11	19
uso di una qualsiasi sostanza via vena	2	3	0	3	1	1	0	4	1	3

anche accesso al Pronto soccorso	21	22	7	8	14	19	18	14	24	20
anche presa in carico al SERD	15	15	5	10	4	5	3	7	4	8
di cui anche Carcere	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0
di cui anche Unità Mobile Metadone	1	3	0	1	1	0	0	2	0	0

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 18 bis – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" soggetti dimessi dagli Ospedali.  
Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	122	123	106	99	171	73	82	133	188	101
età media	40.6	43.0	43.9	45.0	43.8	34.6	44.0	46.2	51.5	44.0
% maschi	67.2	60.2	67.9	59.6	69.6	80.8	57.3	49.6	41.0	50.5
% femmine	32.8	39.8	32.1	40.4	30.4	19.2	42.7	50.4	59.0	49.5
% nativi	74.6	81.3	84.0	76.8	82.5	79.5	79.3	78.9	86.7	85.1
% non nativi	24.6	17.1	16.0	23.2	17.0	20.5	20.7	21.1	13.3	14.9
% residenti area metropolitana	77.0	78.0	71.7	77.8	85.4	76.7	81.7	74.4	79.8	73.3
% residenti fuori area metropolitana	23.0	20.3	27.4	21.2	14.0	21.9	18.3	25.6	20.2	26.7
% senza fissa dimora (SFD)	1.6	0.8	0.0	3.0	0.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	25.4	22.8	30.2	20.2	48.0	42.5	23.2	22.6	11.2	23.8
% di cui eroina	6.6	4.9	0.0	6.1	26.9	6.8	3.7	4.5	1.6	7.9
% cocaina	23.0	32.5	19.8	17.2	14.6	16.4	9.8	14.3	5.3	11.9
% di cui solo cocaina**	19.7	26.0	17.0	14.1	8.8	9.6	8.5	10.5	4.8	8.9
% cannabinoidi	29.5	22.0	18.9	23.2	19.3	37.0	19.5	9.8	4.8	13.9
% di cui solo cannabinoidi***	21.3	17.9	14.2	17.2	15.2	30.1	17.1	8.3	2.1	11.9
% altre sostanze illegali	45.1	48.0	50.9	56.6	35.7	24.7	57.3	61.7	81.9	63.4
% abuso concomitante di psicofarmaci****	9.0	13.8	10.4	13.1	22.2	9.6	20.7	16.5	63.8	17.8
% di cui benzodiazepine	2.5	4.1	1.9	1.0	1.2	2.7	9.8	0.0	18.6	5.0
% anche alcol	13.1	19.5	12.3	15.2	13.5	9.6	23.2	9.0	5.9	18.8
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	1.6	2.4	0.0	3.0	0.6	1.4	0.0	3.0	0.5	3.0

% anche accesso al Pronto soccorso	17.2	17.9	6.6	8.1	8.2	26.0	22.0	10.5	12.8	19.8
% anche presa in carico al SERD	12.3	12.2	4.7	10.1	2.3	6.8	3.7	5.3	2.1	7.9
% di cui anche Carcere	0.0	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.8	2.4	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

\*\*\* cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

\*\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 19 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	2682	2609	2579	2639	3158	2823	2784	2633	2906	2857
nuovi contatti	1084	1043	1013	1059	1680	1288	1284	1214	933	1058
età media	49.6	49.1	49.0	48.8	47.9	47.1	47.9	47.6	46.7	46.0
maschi	1979	1930	1885	1975	2322	2114	2081	1997	2181	2160
femmine	702	679	694	664	836	709	703	636	725	697
nativi	1986	1915	1945	2009	2349	2113	2085	2030	2304	2295
non nativi	678	669	617	630	809	710	699	603	602	562
residenti area metropolitana	2205	2141	2121	2203	2505	2261	2243	2138	2389	2289
residenti fuori area metropolitana	457	411	399	410	628	493	533	495	478	532
senza fissa dimora (SFD)	67	67	57	58	76	72	47	45	124	111
decesso overdose	3	0	0	1	1	2	3	1	0	2
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
abuso concomitante di sostanze illegali	506	510	505	465	476	460	444	484	787	824
di cui oppioidi	188	174	187	203	229	199	217	230	222	296
di cui cocaina	208	199	188	177	162	136	108	109	156	216
di cui cannabinoidi	95	83	90	70	81	74	70	47	45	61
di cui altre sostanze illegali	117	112	145	77	114	113	118	99	60	131
abuso concomitante di psicofarmaci**	125	123	51	178	156	106	139	87	90	161
Ricovero in Ospedale	577	600	611	608	736	637	654	644	676	614
Accesso al Pronto soccorso	1355	1220	1196	1162	1678	1490	1520	1259	796	858
Preso in carico al SERD	1215	1184	1167	1249	1216	1204	1114	1135	1246	1216
di cui anche Carcere	68	82	82	104	73	58	43	61	39	14
di cui anche Unità Mobile Metadone	31	22	16	19	24	25	21	21	11	33

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 19 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	2682	2609	2579	2639	3158	2823	2784	2633	2906	2857
% nuovi contatti	40.4	40.0	39.3	40.1	53.2	45.6	46.1	46.1	32.1	37.0
età media	49.6	49.1	49.0	48.8	47.9	47.1	47.9	47.6	46.7	46.0
% maschi	73.8	74.0	73.1	74.8	73.5	74.9	74.7	75.8	75.1	75.6
% femmine	26.2	26.0	26.9	25.2	26.5	25.1	25.3	24.2	24.9	24.4
% nativi	74.0	73.4	75.4	76.1	74.4	74.8	74.9	77.1	79.3	80.3
% non nativi	25.3	25.6	23.9	23.9	25.6	25.2	25.1	22.9	20.7	19.7
% residenti area metropolitana	82.2	82.1	82.2	83.5	79.3	80.1	80.6	81.2	82.2	80.1
% residenti fuori area metropolitana	17.0	15.8	15.5	15.5	19.9	17.5	19.1	18.8	16.4	18.6
% senza fissa dimora (SFD)	2.5	2.6	2.2	2.2	2.4	2.6	1.7	1.7	4.3	3.9
% decesso overdose	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	18.9	19.5	19.6	17.6	15.1	16.3	15.9	18.4	27.1	28.8
% di cui oppioidi	7.0	6.7	7.3	7.7	7.3	7.0	7.8	8.7	7.6	10.4
% di cui cocaina	7.8	7.6	7.3	6.7	5.1	4.8	3.9	4.1	5.4	7.6
% di cui cannabinoidi	3.5	3.2	3.5	2.7	2.6	2.6	2.5	1.8	1.5	2.1
% di cui altre sostanze illegali	4.4	4.3	5.6	2.9	3.6	4.0	4.2	3.8	2.1	4.6

% abuso concomitante di psicofarmaci**	4.7	4.7	2.0	6.7	4.9	3.8	5.0	3.3	3.1	5.6
% Ricovero in Ospedale	21.5	23.0	23.7	23.0	23.3	22.6	23.5	24.5	23.3	21.5
% Accesso al Pronto soccorso	50.5	46.8	46.4	44.0	53.1	52.8	54.6	47.8	27.4	30.0
% Presa in carico al SERD	45.3	45.4	45.3	47.3	38.5	42.6	40.0	43.1	42.9	42.6
% di cui anche Carcere	2.5	3.1	3.2	3.9	2.3	2.1	1.5	2.3	1.3	0.5
% di cui anche Unità Mobile Metadone	1.2	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.4	1.2

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 20 - Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti \*. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	1084	1043	1013	1059	1680	1288	1284	1214	933	1058
età media	46.2	45.9	45.5	46.0	45.9	43.6	45.0	44.3	44.6	44.4
maschi	793	749	715	787	1218	947	942	908	687	812
femmine	290	294	298	272	462	341	342	306	246	246
nativi	707	708	675	753	1158	858	851	831	620	743
non nativi	362	333	325	306	522	430	433	383	313	315
residenti area metropolitana	758	744	708	791	1189	903	908	869	666	729
residenti fuori area metropolitana	316	287	272	258	481	332	375	343	249	311
senza fissa dimora (SFD)	7	9	9	12	12	14	8	2	25	18
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
abuso concomitante di sostanze illegali	117	123	112	104	130	121	138	129	44	93
di cui oppioidi	11	14	14	17	32	10	24	26	16	52
di cui cocaina	58	46	37	41	43	37	24	21	25	53
di cui cannabinoidi	38	36	26	28	32	34	38	22	11	14
di cui altre sostanze illegali	30	31	50	25	47	47	62	43	31	70
abuso concomitante di psicofarmaci**	42	57	9	68	70	29	53	33	31	64
Ricovero in Ospedale	228	283	250	264	431	266	277	324	311	341
Accesso al Pronto soccorso	752	670	670	680	1162	924	949	825	522	611
Preso in carico al SERD	193	159	164	199	208	201	178	174	155	177
di cui anche Carcere	14	22	28	24	15	16	9	13	8	26
di cui anche Unità Mobile Metadone	5	6	3	4	5	3	4	5	1	7.0

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci



Tab. 20 bis - Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti\*. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	1084	1043	1013	1059	1680	1288	1284	1214	933	1058
età media	46.2	45.9	45.5	46.0	45.9	43.6	45.0	44.3	44.6	44.4
% maschi	73.2	71.8	70.6	74.3	72.5	73.5	73.4	74.8	73.6	76.7
% femmine	26.8	28.2	29.4	25.7	27.5	26.5	26.6	25.2	26.4	23.3
% nativi	65.2	67.9	66.6	71.1	68.9	66.6	66.3	68.5	66.5	70.2
% non nativi	33.4	31.9	32.1	28.9	31.1	33.4	33.7	31.5	33.5	29.8
% residenti area metropolitana	69.9	71.3	69.9	74.7	70.8	70.1	70.7	71.6	71.4	68.9
% residenti fuori area metropolitana	29.2	27.5	26.9	24.4	28.6	25.8	29.2	28.3	26.7	29.4
% senza fissa dimora (SFD)	0.6	0.9	0.9	1.1	0.7	1.1	0.6	0.2	2.7	1.7
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
% abuso concomitante di sostanze illegali	10.8	11.8	11.1	9.8	7.7	9.4	10.7	10.6	4.7	8.8
% di cui oppioidi	1.0	1.3	1.4	1.6	1.9	0.8	1.9	2.1	1.7	4.9
% di cui cocaina	5.4	4.4	3.7	3.9	2.6	2.9	1.9	1.7	2.7	5.0
% di cui cannabinoidi	3.5	3.5	2.6	2.6	1.9	2.6	3.0	1.8	1.2	1.3
% di cui altre sostanze illegali	2.8	3.0	4.9	2.4	2.8	3.6	4.8	3.5	3.3	6.6
% abuso concomitante di psicofarmaci**	3.9	5.5	0.9	6.4	4.2	2.3	4.1	2.7	3.3	6.0
% Ricovero in Ospedale	21.0	27.1	24.7	24.9	25.7	20.7	21.6	26.7	33.3	32.2
% Accesso al Pronto soccorso	69.4	64.2	66.1	64.2	69.2	71.7	73.9	68.0	55.9	57.8
% Presa in carico al SERD	17.8	15.2	16.2	18.8	12.4	15.6	13.9	14.3	16.6	16.7
% di cui anche Carcere	1.3	2.1	2.8	2.3	0.9	1.2	0.7	1.1	0.9	2.5
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.5	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.7

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 21 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	678	669	617	630	809	710	699	603	602	562
nuovi contatti	362	333	325	306	522	430	433	383	313	315
età media	41.4	40.6	39.8	40.5	39.6	39.4	39.3	39.2	38.2	38.5
maschi	503	489	449	454	595	520	511	448	459	422
femmine	175	180	168	176	214	190	188	155	143	140
residenti area metropolitana	416	410	374	390	484	413	432	367	369	328
residenti fuori area metropolitana	248	232	207	223	308	240	262	236	213	219
senza fissa dimora (SFD)	26	23	26	21	28	32	22	23	39	27
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
abuso concomitante di sostanze illegali	115	114	109	99	92	87	95	83	96	116
di cui oppioidi	28	29	27	31	31	26	32	33	71	83
di cui cocaina	50	48	43	42	34	22	21	15	32	57
di cui cannabinoidi	29	24	23	19	25	26	25	10	6	15
di cui altre sostanze illegali	31	33	35	16	26	26	31	24	25	38

abuso concomitante di psicofarmaci**	21	31	28	35	34	25	29	15	14	41
--------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ricovero in Ospedale	119	120	115	109	136	98	106	99	96	80
Accesso al Pronto soccorso	424	407	379	353	549	491	501	391	314	271
Presenza in carico al SERD	258	244	212	242	230	224	188	181	246	229
di cui anche Carcere	40	47	50	56	40	32	20	24	50	46
di cui anche Unità Mobile Metadone	20	14	12	14	15	15	12	13	19	24

Area provenienza	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Europa Est	298	306	280	272	367	288	276	233	210	190
Altri paesi europei	58	53	38	51	57	58	63	50	72	69
Africa Mediterranea	148	149	167	161	210	183	172	153	183	154
Altra Africa	55	43	38	44	47	42	47	53	43	47
Asia	63	60	51	68	79	59	77	57	52	54
America Latina	49	51	35	29	40	34	46	35	36	35
USA e Canada	6	7	6	5	8	7	3	4	5	11
Altro	1	0	2	0	1	39	15	18	1	2

Nazione	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Marocco	118	100	120	116	153	135	130	113	125	100
Romania	97	114	110	104	168	118	116	81	74	67
Polonia	50	39	37	45	52	42	53	45	41	42
Ucraina	40	39	34	29	31	31	25	25	31	18
Moldavia	34	33	30	28	37	22	26	16	13	11

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 21 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	678	669	617	630	809	710	699	603	602	562
% nuovi contatti	53.4	49.8	52.7	48.6	53.2	45.6	46.1	46.1	32.1	37.0
età media	41.4	40.6	39.8	40.5	39.6	39.4	39.3	39.2	38.2	38.5
% maschi	74.2	73.1	72.8	72.1	73.5	73.2	73.1	74.3	76.2	75.1
% femmine	25.8	26.9	27.2	27.9	26.5	26.8	26.9	25.7	23.8	24.9
% residenti area metropolitana	61.4	61.3	60.6	61.9	59.8	58.2	61.8	60.9	61.3	58.4
% residenti fuori area metropolitana	36.6	34.7	33.5	35.4	38.1	33.8	37.5	39.1	35.4	39.0
% senza fissa dimora (SFD)	3.8	3.4	4.2	3.3	3.5	4.5	3.1	3.8	6.5	4.8
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	17.0	17.0	17.7	15.7	11.4	12.3	13.6	13.8	15.9	20.6
% di cui oppioidi	4.1	4.3	4.4	4.9	3.8	3.7	4.6	5.5	11.8	14.8
% di cui cocaina	7.4	7.2	7.0	6.7	4.2	3.1	3.0	2.5	5.3	10.1
% di cui cannabinoidi	4.3	3.6	3.7	3.0	3.1	3.7	3.6	1.7	1.0	2.7
% di cui altre sostanze illegali	4.6	4.9	5.7	2.5	3.2	3.7	4.4	4.0	4.2	6.8

% abuso concomitante di psicofarmaci**	3.1	4.6	4.5	5.6	4.2	3.5	4.1	2.5	2.3	7.3
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

% Ricovero in Ospedale	17.6	17.9	18.6	17.3	16.8	13.8	15.2	16.4	15.9	14.2
% Accesso al Pronto soccorso	62.5	60.8	61.4	56.0	67.9	69.2	71.7	64.8	52.2	48.2
% Presa in carico al SERD	38.1	36.5	34.4	38.4	28.4	31.5	26.9	30.0	40.9	40.7
% di cui anche Carcere	5.9	7.0	8.1	8.9	4.9	4.5	2.9	4.0	8.3	8.2
% di cui anche Unità Mobile Metadone	2.9	2.1	1.9	2.2	1.9	2.1	1.7	2.2	3.2	4.3

Area provenienza	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
% Europa Est	44.0	45.7	45.4	43.2	45.4	40.6	39.5	38.6	34.9	33.8
% Altri paesi europei	8.6	7.9	6.2	8.1	7.0	8.2	9.0	8.3	12.0	12.3
% Africa Mediterranea	21.8	22.3	27.1	25.6	26.0	25.8	24.6	25.4	30.4	27.4
% Altra Africa	8.1	6.4	6.2	7.0	5.8	5.9	6.7	8.8	7.1	8.4
% Asia	9.3	9.0	8.3	10.8	9.8	8.3	11.0	9.5	8.6	9.6
% America Latina	7.2	7.6	5.7	4.6	4.9	4.8	6.6	5.8	6.0	6.2
% USA e Canada	0.9	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.4	0.7	0.8	2.0
% Altro	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	5.5	2.1	3.0	0.2	0.4

Nazione	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
% Marocco	17.4	14.9	19.4	18.4	18.9	19.0	18.6	18.7	20.8	17.8
% Romaniaa	14.3	17.0	17.8	16.5	20.8	16.6	16.6	13.4	12.3	11.9
% Polonia	7.4	5.8	6.0	7.1	6.4	5.9	7.6	7.5	6.8	7.5
% Ucraina	5.9	5.8	5.5	4.6	3.8	4.4	3.6	4.1	5.1	3.2
% Moldavia	5.0	4.9	4.9	4.4	4.6	3.1	3.7	2.7	2.2	2.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 22 - Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti\* di soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	362	333	325	306	522	430	433	383	313	315
età media	39.3	38.2	37.4	37.3	38.2	37.4	37.1	37.1	35.5	36.8
maschi	272	243	244	229	396	320	319	288	238	238
femmine	90	90	81	77	126	110	114	95	75	77
residenti area metropolitana	189	173	173	163	283	222	247	213	174	160
residenti fuori area metropolitana	166	151	137	139	233	162	186	170	128	144
senza fissa dimora (SFD)	4	3	6	3	3	5	4	5	15	8
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
abuso concomitante di sostanze illegali	47	39	42	31	34	37	51	40	7	20
di cui oppioidi	5	4	5	7	6	5	8	11	5	14
di cui cocaina	24	14	19	8	13	9	5	6	4	10
di cui cannabinoidi	16	12	10	9	10	12	16	4	0	2
di cui altre sostanze illegali	13	10	16	8	15	12	24	15	17	18

abuso concomitante di psicofarmaci**	9	16	10	14	14	9	15	11	6	21
--------------------------------------	---	----	----	----	----	---	----	----	---	----

Ricovero in Ospedale	59	56	53	45	90	45	59	65	50	58
Accesso al Pronto soccorso	275	244	244	224	401	351	358	305	239	227
Presa in carico al SERD	63	50	50	50	61	59	43	46	39	37
di cui anche Carcere	11	12	23	17	11	11	5	6	12	10
di cui anche Unità Mobile Metadone	4	2	2	3	1	2	2	4	0	3

Area provenienza	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Europa Est	157	143	142	136	242	182	183	155	120	115
Altri paesi europei	26	25	13	21	32	29	37	30	24	27
Africa Mediterranea	77	61	90	69	130	102	91	86	98	81
Altra Africa	28	29	20	19	30	21	30	36	20	31
Asia	39	40	34	43	58	36	53	37	32	36
America Latina	29	31	19	15	23	17	27	21	17	18
USA e Canada	5	4	5	3	6	6	2	2	1	7
Altro	1	0	2	0	1	37	9	16	1	0

Nazione	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Marocco	66	41	66	53	95	75	68	68	79	63
Romania	51	59	57	54	123	77	86	57	49	46
Polonia	25	18	12	17	28	21	29	25	20	28
Ucraina	23	17	15	17	18	19	13	15	18	11
Moldavia	17	12	21	16	21	19	20	11	5	7

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 22 bis - Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti\* di soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	362	333	325	306	522	430	433	383	313	315
età media	39.3	38.2	37.4	37.3	38.2	37.4	37.4	37.1	35.5	36.8
% maschi	75.1	73.0	75.1	74.8	75.9	74.4	73.7	75.2	76.0	75.6
% femmine	24.9	27.0	24.9	25.2	24.1	25.6	26.3	24.8	24.0	24.4
% residenti area metropolitana	52.2	52.0	53.2	53.3	54.2	51.6	57.0	55.6	55.6	50.8
% residenti fuori area metropolitana	45.9	45.3	42.2	45.4	44.6	37.7	43.0	44.4	40.9	45.7
% senza fissa dimora (SFD)	1.1	0.9	1.8	1.0	0.6	1.2	0.9	1.3	4.8	2.5
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
% abuso concomitante di sostanze illegali	13.0	11.7	12.9	10.1	6.5	8.6	11.8	10.4	2.2	6.3
% di cui oppioidi	1.4	1.2	1.5	2.3	1.1	1.2	1.8	2.9	1.6	4.4
% di cui cocaina	6.6	4.2	5.8	2.6	2.5	2.1	1.2	1.6	1.3	3.2
% di cui cannabinoidi	4.4	3.6	3.1	2.9	1.9	2.8	3.7	1.0	0.0	0.6
% di cui altre sostanze illegali	3.6	3.0	4.9	2.6	2.9	2.8	5.5	3.9	5.4	5.7
% abuso concomitante di psicofarmaci**	2.5	4.8	3.1	4.6	2.7	2.1	3.5	2.9	1.9	6.7
% Ricovero in Ospedale	16.3	16.8	16.3	14.7	17.2	10.5	13.6	17.0	16.0	18.4
% Accesso al Pronto soccorso	76.0	73.3	75.1	73.2	76.8	81.6	82.7	79.6	76.4	72.1
% Presa in carico al SERD	17.4	15.0	15.4	16.3	11.7	13.7	9.9	12.0	12.5	11.7
% di cui anche Carcere	3.0	3.6	7.1	5.6	2.1	2.6	1.2	1.6	3.8	3.2
% di cui anche Unità Mobile Metadone	1.1	0.6	0.6	1.0	0.2	0.5	0.5	1.0	0.0	1.0
<b>Area provenienza</b>										
% Europa Est	43.4	42.9	43.7	44.4	46.4	42.3	42.3	40.5	38.3	36.5
% Altri paesi europei	7.2	7.5	4.0	6.9	6.1	6.7	8.5	7.8	7.7	8.6
% Africa Mediterranea	21.3	18.3	27.7	22.5	24.9	23.7	21.0	22.5	31.3	25.7
% Altra Africa	7.7	8.7	6.2	6.2	5.7	4.9	6.9	9.4	6.4	9.8
% Asia	10.8	12.0	10.5	14.1	11.1	8.4	12.2	9.7	10.2	11.4
% America Latina	8.0	9.3	5.8	4.9	4.4	4.0	6.2	5.5	5.4	5.7
% USA e Canada	1.4	1.2	1.5	1.0	1.1	1.4	0.5	0.5	0.3	2.2
% Altro	0.3	0.0	0.6	0.0	0.2	8.6	2.1	4.2	0.3	0.0
<b>Nazione</b>										
% Marocco	18.2	12.3	20.3	17.3	18.2	17.4	15.7	17.8	25.2	20.0
% Romaniaa	14.1	17.7	17.5	17.6	23.6	17.9	19.9	14.9	15.7	14.6
% Polonia	6.9	5.4	3.7	5.6	5.4	4.9	6.7	6.5	6.4	8.9
% Ucraina	6.4	5.1	4.6	5.6	3.4	4.4	3.0	3.9	5.8	3.5
% Moldavia	4.7	3.6	6.5	5.2	4.0	4.4	4.6	2.9	1.6	2.2

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 23 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	29	33	24	51	44	40	26	37	34	19
nuovi contatti	28	33	22	49	44	39	26	37	33	19
età media	16.0	15.7	16.0	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
maschi	16	18	14	33	27	26	15	26	22	15
femmine	13	15	10	18	17	14	11	11	12	4
nativi	25	26	21	38	40	32	21	31	24	15
non nativi	4	7	3	13	4	8	5	6	10	4
residenti area metropolitana	29	27	22	45	39	35	25	32	31	14
residenti fuori area metropolitana	0	5	2	6	5	5	1	5	3	5
senza fissa dimora (SFD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
abuso concomitante di sostanze illegali	6	6	5	6	5	4	5	6	1	1
di cui oppioidi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
di cui cocaina	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
di cui cannabinoidi	4	6	2	2	3	2	2	5	0	1
di cui altre sostanze illegali	2	0	3	4	4	2	3	1	1	0

abuso concomitante di psicofarmaci**	3	1	0	2	5	0	1	1	2	0
Ricovero in Ospedale	1	3	3	3	2	4	3	2	6	3
Accesso al Pronto soccorso	28	30	22	48	43	38	24	34	28	16
Presa in carico al SERD	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0
di cui anche Carcere Minorile	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
di cui anche Carcere	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 23 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	29	33	24	51	44	40	26	37	34	19
% nuovi contatti	96.6	100.0	91.7	96.1	100.0	97.5	100.0	100.0	97.1	100.0
età media	16.0	15.7	16.0	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
% maschi	55.2	54.5	58.3	64.7	61.4	65.0	57.7	70.3	64.7	78.9
% femmine	44.8	45.5	41.7	35.3	38.6	35.0	42.3	29.7	35.3	21.1
% nativi	86.2	78.8	87.5	74.5	90.9	80.0	80.8	83.8	70.6	78.9
% non nativi	13.8	21.2	12.5	25.5	9.1	20.0	19.2	16.2	29.4	21.1
% residenti area metropolitana	100.0	81.8	91.7	88.2	88.6	87.5	96.2	86.5	91.2	73.7
% residenti fuori area metropolitana	0.0	15.2	8.3	11.8	11.4	12.5	3.8	13.5	8.8	26.3
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	20.7	18.2	20.8	11.8	11.4	10.0	19.2	16.2	2.9	5.3
% di cui oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0
% di cui cocaina	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui cannabinoidi	13.8	18.2	8.3	3.9	6.8	5.0	7.7	13.5	0.0	5.3
% di cui altre sostanze illegali	6.9	0.0	12.5	7.8	9.1	5.0	11.5	2.7	2.9	0.0

% abuso concomitante di psicofarmaci**	10.3	3.0	0.0	3.9	11.4	0.0	3.8	2.7	5.9	0.0
--	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

% Ricovero in Ospedale	3.4	9.1	12.5	5.9	4.5	10.0	11.5	5.4	17.6	15.8
% Accesso al Pronto soccorso	96.6	90.9	91.7	94.1	97.7	95.0	92.3	91.9	82.4	84.2
% Presa in carico al SERD	0.0	0.0	8.3	2.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	0.0
% di cui anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
% di cui anche Carcere	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 24 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\* di soggetti minorenni. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	28	33	22	49	44	39	26	37	33	19
età media	15.9	15.7	15.9	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
maschi	15	18	12	31	27	25	15	26	21	15
femmine	13	15	10	18	17	14	11	11	12	4
nativi	25	26	20	36	40	31	21	31	23	15
non nativi	3	7	2	13	4	8	5	6	10	4
residenti area metropolitana	28	27	20	43	39	34	25	32	30	14
residenti fuori area metropolitana	0	5	2	6	5	5	1	5	3	5
senza fissa dimora (SFD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
abuso concomitante di sostanze illegali	5	6	4	5	5	4	5	6	1	1
di cui oppioidi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
di cui cocaina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui cannabinoidi	3	6	1	1	3	2	2	5	0	1
di cui altre sostanze illegali	2	0	3	4	4	2	3	1	1	0

abuso concomitante di psicofarmaci**	3	1	0	2	5	0	1	1	2	0
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ricovero in Ospedale	1	3	2	3	2	4	3	2	6	3
Accesso al Pronto soccorso	27	30	22	46	43	37	24	34	27	16
Presa in carico al SERD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
di cui anche Carcere Minorile	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
di cui anche Carcere	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci



Tab. 24 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\* di soggetti minorenni. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	28	33	22	49	44	39	26	37	33	19
età media	15.9	15.7	15.9	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
% maschi	53.6	54.5	54.5	63.3	61.4	64.1	57.7	70.3	63.6	78.9
% femmine	46.4	45.5	45.5	36.7	38.6	35.9	42.3	29.7	36.4	21.1
% nativi	89.3	78.8	90.9	73.5	90.9	79.5	80.8	83.8	69.7	78.9
% non nativi	10.7	21.2	9.1	26.5	9.1	20.5	19.2	16.2	30.3	21.1
% residenti area metropolitana	100.0	81.8	90.9	87.8	88.6	87.2	96.2	86.5	90.9	73.7
% residenti fuori area metropolitana	0.0	15.2	9.1	12.2	11.4	12.8	3.8	13.5	9.1	26.3
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
% abuso concomitante di sostanze illegali	17.9	18.2	18.2	10.2	11.4	10.3	19.2	16.2	3.0	5.3
% di cui oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
% di cui cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui cannabinoidi	10.7	18.2	4.5	2.0	6.8	5.1	7.7	13.5	0.0	5.3
% di cui altre sostanze illegali	7.1	0.0	13.6	8.2	9.1	5.1	11.5	2.7	3.0	0.0
% abuso concomitante di psicofarmaci**	10.7	3.0	0.0	4.1	11.4	0.0	3.8	2.7	6.1	0.0
% Ricovero in Ospedale	3.6	9.1	9.1	6.1	4.5	10.3	11.5	5.4	18.2	15.8
% Accesso al Pronto soccorso	96.4	90.9	100.0	93.9	97.7	94.9	92.3	91.9	81.8	84.2
% Presa in carico al SERD	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.0	0.0
% di cui anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
% di cui anche Carcere	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 25 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1215	1184	1167	1249	1216	1204	1114	1135	1246	1216
mai stato in precedenza al SERD	357	224	209	264	255	267	226	209	211	223
età media	49.1	48.8	48.8	48.3	48.2	47.8	48.2	47.9	48.0	47.7
maschi	883	860	830	928	886	884	830	849	920	889
femmine	332	324	337	321	330	320	284	286	326	327
nativi	956	939	953	1007	982	979	926	954	1060	1047
non nativi	258	244	212	242	230	224	188	181	186	169
residenti area metropolitana	1112	1081	1052	1132	1114	1085	1002	1025	1134	1102
residenti fuori area metropolitana	95	89	106	105	94	110	108	110	111	103
senza fissa dimora (SFD)	59	63	53	56	66	63	44	39	40	32
decesso overdose	3	0	0	0	1	2	1	1	0	0
alcol primaria	1034	975	968	1047	1033	1018	941	940	1066	991
alcol secondaria	179	190	168	199	182	184	172	186	174	122
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
abuso concomitante di sostanze illegali	332	323	310	318	298	298	255	296	259	273
di cui eroina	116	106	110	136	131	140	139	148	136	145
di cui cocaina	129	118	125	118	101	88	64	68	85	86
di cui cannabinoidi	37	34	38	39	32	36	28	22	26	29
di cui GHB	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0
di cui crack	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui amfetamine	1	2	0	1	1	1	1	1	1	0
di cui ketamina	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
di cui ecstasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
benzodiazepine	15	10	12	15	13	15	12	15	15	11
tramadolo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
codeina	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0
ossicodone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anche gioco	11	13	8	8	8	7	8	0	6	6
Ricovero in Ospedale	121	120	115	128	136	140	126	112	119	132
Accesso al Pronto Soccorso	207	156	159	155	183	187	175	153	90	102
anche Carcere	67	78	73	98	62	48	37	51	52	27
anche Unità Mobile Metadone	26	17	12	15	18	20	19	18	3	9

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

Tab. 25 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1215	1184	1167	1249	1216	1204	1114	1135	1246	1216
% mai stato in precedenza al SERD	29.4	18.9	17.9	21.1	21.0	22.2	20.3	18.4	16.9	18.3
età media	49.1	48.8	48.8	48.3	48.2	47.8	48.2	47.9	48.0	47.7
% maschi	72.7	72.6	71.1	74.3	72.9	73.4	74.5	74.8	73.8	73.1
% femmine	27.3	27.4	28.9	25.7	27.1	26.6	25.5	25.2	26.2	26.9
% nativi	78.7	79.3	81.7	80.6	80.8	81.3	83.1	84.1	85.1	86.1
% non nativi	21.2	20.6	18.2	19.4	18.9	18.6	16.9	15.9	14.9	13.9
% residenti area metropolitana	91.5	91.3	90.1	90.6	91.6	90.1	89.9	90.3	91.0	90.6
% residenti fuori area metropolitana	7.8	7.5	9.1	8.4	7.7	9.1	9.7	9.7	8.9	8.5
% senza fissa dimora (SFD)	4.9	5.3	4.5	4.5	5.4	5.2	3.9	3.4	3.2	2.6
% decesso overdose	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0

% alcol primaria	85.1	82.3	82.9	83.8	85.0	84.6	84.5	82.8	85.6	81.5
% alcol secondaria	14.7	16.0	14.4	15.9	15.0	15.3	15.4	16.4	14.0	10.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	27.3	27.3	26.6	25.5	24.5	24.8	22.9	26.1	20.8	22.5
% di cui eroina	9.5	9.0	9.4	10.9	10.8	11.6	12.5	13.0	10.9	11.9
% di cui cocaina	10.6	10.0	10.7	9.4	8.3	7.3	5.7	6.0	6.8	7.1
% di cui cannabinoidi	3.0	2.9	3.3	3.1	2.6	3.0	2.5	1.9	2.1	2.4
% di cui GHB	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
% di cui crack	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui amfetamine	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
% di cui ketamina	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
% di cui ecstasy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% benzodiazepine	1.2	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	0.9
% tramadolo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
% codeina	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
% ossicodone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% anche gioco	0.9	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.0	0.5	0.5
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

% Ricovero in Ospedale	10.0	10.1	9.9	10.2	11.2	11.6	11.3	9.9	9.6	10.9
% Accesso al Pronto Soccorso	17.0	13.2	13.6	12.4	15.0	15.5	15.7	13.5	7.2	8.4
% anche Carcere	5.5	6.6	6.3	7.8	5.1	4.0	3.3	4.5	4.2	2.2
% anche Unità Mobile Metadone	2.1	1.4	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	1.6	0.2	0.7

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

Tab. 26 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	357	224	209	264	255	267	226	209	211	223
età media	47.0	44.8	44.8	44.2	44.6	43.8	45.4	44.6	43.9	44.6
maschi	255	165	141	193	181	183	167	148	166	173
femmine	102	59	68	71	74	84	59	61	45	50
nativi	260	151	149	200	184	187	173	158	157	182
non nativi	97	73	60	64	70	80	53	51	54	41
residenti area metropolitana	321	187	175	223	231	228	193	183	171	194
residenti fuori area metropolitana	34	34	31	38	23	34	32	26	40	25
senza fissa dimora (SFD)	10	13	12	11	12	23	12	8	9	3
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alcol primaria	331	192	180	233	224	235	203	185	193	197
alcol secondaria	25	22	28	29	30	31	23	24	18	15
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
abuso concomitante di sostanze illegali	84	42	49	46	40	62	47	43	33	41
di cui eroina	8	3	3	6	11	9	14	11	6	16
di cui cocaina	42	24	27	31	24	25	17	16	17	20
di cui cannabinoidi	19	7	6	14	8	18	11	7	7	7
di cui GHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui crack	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui amfetamine	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui ketamina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui ecstasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
benzodiazepine	6	0	1	2	3	3	2	1	2	2
tramadolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
codeina	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ossicodone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anche gioco	2	4	1	3	3	2	1	0	0	4
Ricovero in Ospedale	49	27	26	31	32	40	37	32	24	41
Accesso al Pronto Soccorso	79	30	38	36	45	52	47	37	20	30
anche Carcere	19	25	25	35	17	17	8	9	21	10
anche Unità Mobile Metadone	7	8	3	3	4	4	4	5	0	1

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti al SERD in precedenza

Tab. 26 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	357	224	209	264	255	267	226	209	211	223
età media	47.0	44.8	44.8	44.2	44.6	43.8	45.4	44.6	43.9	44.6
% maschi	71.4	73.7	67.5	73.1	71.0	68.5	73.9	70.8	78.7	77.6
% femmine	28.6	26.3	32.5	26.9	29.0	31.5	26.1	29.2	21.3	22.4
% nativi	72.8	67.4	71.3	75.8	72.2	70.0	76.5	75.6	74.4	81.6
% non nativi	27.2	32.6	28.7	24.2	27.5	30.0	23.5	24.4	25.6	18.4
% residenti area metropolitana	89.9	83.5	83.7	84.5	90.6	85.4	85.4	87.6	81.0	87.0
% residenti fuori area metropolitana	9.5	15.2	14.8	14.4	9.0	12.7	14.2	12.4	19.0	11.2
% senza fissa dimora (SFD)	2.8	5.8	5.7	4.2	4.7	8.6	5.3	3.8	4.3	1.3
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% alcol primaria	92.7	85.7	86.1	88.3	87.8	88.0	89.8	88.5	91.5	88.3
% alcol secondaria	7.0	9.8	13.4	11.0	11.8	11.6	10.2	11.5	8.5	6.7
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
% abuso concomitante di sostanze illegali	23.5	18.8	23.4	17.4	15.7	23.2	20.8	20.6	15.6	18.4
% di cui eroina	2.2	1.3	1.4	2.3	4.3	3.4	6.2	5.3	2.8	7.2
% di cui cocaina	11.8	10.7	12.9	11.7	9.4	9.4	7.5	7.7	8.1	9.0
% di cui cannabinoidi	5.3	3.1	2.9	5.3	3.1	6.7	4.9	3.3	3.3	3.1
% di cui GHB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui crack	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui amfetamine	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui ecstasy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% benzodiazepine	1.7	0.0	0.5	0.8	1.2	1.1	0.9	0.5	0.9	0.9
% tramadolo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% codeina	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% ossicodone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% anche gioco	0.6	1.8	0.5	1.1	1.2	0.7	0.4	0.0	0.0	1.8
% Ricovero in Ospedale	13.7	12.1	12.4	11.7	12.5	15.0	16.4	15.3	11.4	18.4
% Accesso al Pronto Soccorso	22.1	13.4	18.2	13.6	17.6	19.5	20.8	17.7	9.5	13.5
% anche Carcere	5.3	11.2	12.0	13.3	6.7	6.4	3.5	4.3	10.0	4.5
% anche Unità Mobile Metadone	2.0	3.6	1.4	1.1	1.6	1.5	1.8	2.4	0.0	0.4

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti al SERD in precedenza

Tab. 27 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1355	1220	1196	1162	1678	1490	1520	1259	796	858
nuovi contatti	752	670	670	680	1162	924	996	825	522	611
età media	47.7	46.5	46.2	46.1	45.1	43.9	45.3	43.7	42.4	42.3
maschi	1017	913	873	859	1223	1096	1142	948	574	650
femmine	337	307	323	303	455	394	378	311	222	208
nativi	914	792	803	808	1052	997	971	868	482	587
non nativi	424	407	379	353	549	491	549	391	314	271
residenti area metropolitana	992	882	881	867	1158	1053	1060	896	548	587
residenti fuori area metropolitana	352	295	263	281	503	374	456	363	223	262
senza fissa dimora (SFD)	21	15	10	12	24	31	18	13	28	10
decesso overdose	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
abuso concomitante di sostanze illegali	196	200	214	144	190	209	199	233	51	80
di cui oppioidi	63	49	62	52	75	71	73	95	33	50
di cui cocaina	71	62	59	59	59	52	45	40	22	33
di cui cannabinoidi	49	41	45	26	45	34	37	24	9	11
di cui altre sostanze illegali	83	78	118	47	97	99	98	83	35	98
abuso concomitante di psicofarmaci**	103	96	97	144	124	82	96	70	36	99
Ricovero in Ospedale	213	179	176	159	220	219	223	193	127	165
Preso in carico al SERD	207	156	159	155	183	222	175	132	90	102
di cui anche Carcere	7	7	12	16	20	12	7	12	4	3
di cui anche Unità Mobile Metadone	10	10	5	4	7	11	4	7	1	3

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 27 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1355	1220	1196	1162	1678	1490	1520	1259	796	858
% nuovi contatti	55.5	54.9	56.0	58.5	69.2	62.0	65.5	65.5	65.6	71.2
età media	47.7	46.5	46.2	46.1	45.1	43.9	45.3	43.7	42.4	42.3
% maschi	75.1	74.8	73.0	73.9	72.9	73.6	75.1	75.3	72.1	75.8
% femmine	24.9	25.2	27.0	26.1	27.1	26.4	24.9	24.7	27.9	24.2
% nativi	67.5	64.9	67.1	69.5	62.7	66.9	63.9	68.9	60.6	68.4
% non nativi	31.3	33.4	31.7	30.4	32.7	33.0	36.1	31.1	39.4	31.6
% residenti area metropolitana	73.2	72.3	73.7	74.6	69.0	70.7	69.7	71.2	68.8	68.4
% residenti fuori area metropolitana	26.0	24.2	22.0	24.2	30.0	25.1	30.0	28.8	28.0	30.5
% senza fissa dimora (SFD)	1.5	1.2	0.8	1.0	1.4	2.1	1.2	1.0	3.5	1.2
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	14.5	16.4	17.9	12.4	11.3	14.0	13.1	18.5	6.4	9.3
% di cui oppioidi	4.6	4.0	5.2	4.5	4.5	4.8	4.8	7.5	4.1	5.8
% di cui cocaina	5.2	5.1	4.9	5.1	3.5	3.5	3.0	3.2	2.8	3.8
% di cui cannabinoidi	3.6	3.4	3.8	2.2	2.7	2.3	2.4	1.9	1.1	1.3
% di cui altre sostanze illegali	6.1	6.4	9.9	4.0	5.8	6.6	6.4	6.6	4.4	11.4
% abuso concomitante di psicofarmaci**	7.6	7.9	8.1	12.4	7.4	5.5	6.3	5.6	4.5	11.5
% Ricovero in Ospedale	15.7	14.7	14.7	13.7	13.1	14.7	14.7	15.3	16.0	19.2
% Presa in carico al SERD	15.3	12.8	13.3	13.3	10.9	14.9	11.5	10.5	11.3	11.9
% di cui anche Carcere	0.5	0.6	1.0	1.4	1.2	0.8	0.5	1.0	0.5	0.3
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.6	0.1	0.3

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 28 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti (1) di soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	752	670	670	680	1162	924	996	825	522	611
età media	43.1	42.2	42.0	42.3	42.9	40.2	42.4	40.6	39.0	40.3
maschi	559	484	473	500	839	679	737	615	367	466
femmine	192	186	197	180	323	245	259	210	155	145
nativi	462	426	414	455	687	570	587	520	283	384
non nativi	275	244	244	224	401	353	409	305	239	227
residenti area metropolitana	464	431	429	459	731	584	619	532	326	383
residenti fuori area metropolitana	280	230	209	216	422	290	376	293	180	221
senza fissa dimora (SFD)	3	1	2	0	2	4	2	2	15	1
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Sostanze d'abuso ( <i>consumi multipli</i> ):										
abuso concomitante di sostanze illegali	65	74	75	48	75	82	97	98	10	22
di cui oppioidi	7	6	8	9	10	4	15	17	5	10
di cui cocaina	24	19	19	12	18	19	10	7	3	10
di cui cannabinoidi	24	24	17	13	21	20	26	15	4	4
di cui altre sostanze illegali	24	26	43	19	43	46	56	41	24	62
abuso concomitante di psicofarmaci**	37	45	37	62	58	27	44	33	15	43
Ricovero in Ospedale	52	47	44	52	84	64	66	77	41	73
Preso in carico al SERD	26	14	18	19	28	31	34	21	8	21
di cui anche Carcere	1	1	3	2	0	3	1	1	0	0
di cui anche Unità Mobile Metadone	2	2	2	1	1	0	1	2	0	0

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci



**Tab. 28 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	752	670	670	680	1162	924	996	825	522	611
età media	43.1	42.2	42.0	42.3	42.9	40.2	42.4	40.6	39.0	40.3
% maschi	74.3	72.2	70.6	73.5	72.2	73.5	74.0	74.5	70.3	76.3
% femmine	25.5	27.8	29.4	26.5	27.8	26.5	26.0	25.5	29.7	23.7
% nativi	61.4	63.6	61.8	66.9	59.1	61.7	58.9	63.0	54.2	62.8
% non nativi	36.6	36.4	36.4	32.9	34.5	38.2	41.1	37.0	45.8	37.2
% residenti area metropolitana	61.7	64.3	64.0	67.5	62.9	63.2	62.1	64.5	62.5	62.7
% residenti fuori area metropolitana	37.2	34.3	31.2	31.8	36.3	31.4	37.8	35.5	34.5	36.2
% senza fissa dimora (SFD)	0.4	0.1	0.3	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2	2.9	0.2
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso ( <i>consumi multipli</i> ):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	8.6	11.0	11.2	7.1	6.5	8.9	9.7	11.9	1.9	3.6
% di cui oppioidi	0.9	0.9	1.2	1.3	0.9	0.4	1.5	2.1	1.0	1.6
% di cui cocaina	3.2	2.8	2.8	1.8	1.5	2.1	1.0	0.8	0.6	1.6
% di cui cannabinoidi	3.2	3.6	2.5	1.9	1.8	2.2	2.6	1.8	0.8	0.7
% di cui altre sostanze illegali	3.2	3.9	6.4	2.8	3.7	5.0	5.6	5.0	4.6	10.1

% abuso concomitante di psicofarmaci**	4.9	6.7	5.5	9.1	5.0	2.9	4.4	4.0	2.9	7.0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

% Ricovero in Ospedale	6.9	7.0	6.6	7.6	7.2	6.9	6.6	9.3	7.9	11.9
% Presa in carico al SERD	3.5	2.1	2.7	2.8	2.4	3.4	3.4	2.5	1.5	3.4
% di cui anche Carcere	0.1	0.1	0.4	0.3	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0

\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 29 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	577	600	611	608	736	637	654	644	676	614
nuovi contatti	228	283	250	264	431	266	277	324	311	341
età media	56.3	56.4	56.7	57.0	55.6	55.6	55.7	56.7	56.1	55.5
maschi	412	436	455	474	558	490	496	497	521	465
femmine	165	164	156	134	178	147	158	147	155	149
nativi	458	477	493	498	598	535	548	545	580	534
non nativi	119	120	115	109	136	98	106	99	96	80
residenti area metropolitana	529	545	551	556	668	569	575	578	613	540
residenti fuori area metropolitana	47	52	54	51	66	67	79	66	58	72
senza fissa dimora (SFD)	16	7	8	13	16	13	11	7	15	10
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
abuso concomitante di sostanze illegali	94	105	88	81	88	67	70	76	42	60
di cui oppioidi	36	40	31	34	59	24	35	34	30	44
di cui cocaina	31	35	29	23	27	20	19	16	16	25
di cui cannabinoidi	23	23	21	13	14	13	12	4	8	9
di cui altre sostanze illegali	41	39	36	35	34	29	26	27	20	43

abuso concomitante di psicofarmaci**	42	43	42	37	46	38	47	22	34	46
--------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Accesso al Pronto soccorso	213	179	176	159	220	219	223	193	127	165
Presi in carico al SERD	121	120	115	128	136	140	126	112	119	132
di cui anche Carcere	2	4	1	1	4	2	2	5	3	2
di cui anche Unità Mobile Metadone	7	3	1	2	1	2	1	1	0	3

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 29 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	577	600	611	608	736	637	654	644	676	614
% nuovi contatti	39.5	47.2	40.9	43.4	58.6	41.8	42.4	50.3	46.0	55.5
età media	56.3	56.4	56.7	57.0	55.6	55.6	55.7	56.7	56.1	55.5
% maschi	71.4	72.7	74.5	78.0	75.8	76.9	75.8	77.2	77.1	75.7
% femmine	28.6	27.3	25.5	22.0	24.2	23.1	24.2	22.8	22.9	24.3
% nativi	79.4	79.5	80.7	81.9	81.3	84.0	83.8	84.6	85.8	87.0
% non nativi	20.6	20.0	18.8	17.9	18.5	15.4	16.2	15.4	14.2	13.0
% residenti area metropolitana	91.7	90.8	90.2	91.4	90.8	89.3	87.9	89.8	90.7	87.9
% residenti fuori area metropolitana	8.1	8.7	8.8	8.4	9.0	10.5	12.1	10.2	8.6	11.7
% senza fissa dimora (SFD)	2.8	1.2	1.3	2.1	2.2	2.0	1.7	1.1	2.2	1.6
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	16.3	17.5	14.4	13.3	12.0	10.5	10.7	11.8	6.2	9.8
% di cui oppioidi	6.2	6.7	5.1	5.6	8.0	3.8	5.4	5.3	4.4	7.2
% di cui cocaina	5.4	5.8	4.7	3.8	3.7	3.1	2.9	2.5	2.4	4.1
% di cui cannabinoidi	4.0	3.8	3.4	2.1	1.9	2.0	1.8	0.6	1.2	1.5
% di cui altre sostanze illegali	7.1	6.5	5.9	5.8	4.6	4.6	4.0	4.2	3.0	7.0
% abuso concomitante di psicofarmaci**	7.3	7.2	6.9	6.1	6.3	6.0	7.2	3.4	5.0	7.5

% Accesso al Pronto soccorso	36.9	29.8	28.8	26.2	29.9	34.4	34.1	30.0	18.8	26.9
% Presa in carico al SERD	21.0	20.0	18.8	21.1	18.5	22.0	19.3	17.4	17.6	21.5
% di cui anche Carcere	0.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3
% di cui anche Unità Mobile Metadone	1.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.5

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 30 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	228	283	250	264	431	266	277	324	311	341
età media	58.5	57.1	56.7	60.0	56.4	57.1	55.9	56.5	56.8	55.3
maschi	163	196	173	207	322	198	205	246	240	259
femmine	65	87	77	57	109	68	72	78	71	82
nativi	169	225	196	218	341	218	218	259	261	283
non nativi	59	56	53	45	90	45	59	65	50	58
residenti area metropolitana	196	246	209	239	378	233	231	280	270	280
residenti fuori area metropolitana	31	36	38	24	52	33	46	44	39	59
senza fissa dimora (SFD)	1	0	1	1	1	1	1	0	3	2
decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
abuso concomitante di sostanze illegali	13	26	18	15	20	12	18	17	3	14
di cui oppioidi	1	5	3	2	13	1	2	3	0	9
di cui cocaina	6	9	3	4	6	1	3	3	2	6
di cui cannabinoidi	6	7	6	4	4	1	6	3	2	3
di cui altre sostanze illegali	5	8	9	7	3	9	9	8	9	12
abuso concomitante di psicofarmaci**	8	18	8	6	18	7	13	4	10	14
Accesso al Pronto soccorso	52	47	44	52	84	64	66	77	41	73
Presenza in carico al SERD	17	12	13	22	18	17	29	20	15	30
di cui anche Carcere	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
di cui anche Unità Mobile Metadone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 30 bis - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti (1) di soggetti dimessi dagli Ospedali.  
Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	228	283	250	264	431	266	277	324	311	341
età media	58.5	57.1	56.7	60.0	56.4	57.1	55.9	56.5	56.8	55.3
% maschi	71.5	69.3	69.2	78.4	74.7	74.4	74.0	75.9	77.2	76.0
% femmine	28.5	30.7	30.8	21.6	25.3	25.6	26.0	24.1	22.8	24.0
% nativi	74.1	79.5	78.4	82.6	79.1	82.0	78.7	79.9	83.9	83.0
% non nativi	25.9	19.8	21.2	17.0	20.9	16.9	21.3	20.1	16.1	17.0
% residenti area metropolitana	86.0	86.9	83.6	90.5	87.7	87.6	83.4	86.4	86.8	82.1
% residenti fuori area metropolitana	13.6	12.7	15.2	9.1	12.1	12.4	16.6	13.6	12.5	17.3
% senza fissa dimora (SFD)	0.4	0.0	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.0	1.0	0.6
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Sostanze d'abuso (consumi multipli):</b>										
% abuso concomitante di sostanze illegali	5.7	9.2	7.2	5.7	4.6	4.5	6.5	5.2	1.0	4.1
% di cui oppioidi	0.4	1.8	1.2	0.8	3.0	0.4	0.7	0.9	0.0	2.6
% di cui cocaina	2.6	3.2	1.2	1.5	1.4	0.4	1.1	0.9	0.6	1.8
% di cui cannabinoidi	2.6	2.5	2.4	1.5	0.9	0.4	2.2	0.9	0.6	0.9
% di cui altre sostanze illegali	2.2	2.8	3.6	2.7	0.7	3.4	3.2	2.5	2.9	3.5
% abuso concomitante di psicofarmaci**	3.5	6.4	3.2	2.3	4.2	2.6	4.7	1.2	3.2	4.1
% Accesso al Pronto soccorso	22.8	16.6	17.6	19.7	19.5	24.1	23.8	23.8	13.2	21.4
% Presa in carico al SERD	7.5	4.2	5.2	8.3	4.2	6.4	10.5	6.2	4.8	8.8
% di cui anche Carcere	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(1) soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

**Tab. 31 - Gioco problematico\*. Caratteristiche casi incidenti inclusi nella coorte GAP. Periodo 2009-2018 – Valori assoluti**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	89	92	103	128	123	97	52	25	20	22
età media	49.6	46.4	47.3	46.6	46.1	48.5	51.1	53.6	47.8	46.3
maschi	70	76	84	110	98	74	38	14	18	19
femmine	19	16	19	18	25	23	14	11	2	3
nativi	81	79	89	106	103	84	46	21	18	20
non nativi	8	13	14	22	20	13	6	4	2	2
residenti area metropolitana	85	85	98	119	119	89	50	25	19	21
residenti fuori area metropolitana	4	5	5	8	4	7	2	0	1	1
primo contatto SERD	85	91	93	99	88	72	31	13	13	14
primo contatto Ospedale	2	1	0	3	6	2	7	1	1	0
primo contatto Psichiatria	2	0	10	26	29	23	14	11	6	8
anche alcol	4	6	2	7	13	13	3	2	3	4
anche sostanze illegali	6	5	7	11	9	12	4	3	4	3

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico

**Tab. 31 bis - Gioco problematico\*. Caratteristiche casi incidenti inclusi nella coorte GAP. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	89	92	103	128	123	97	52	25	20	22
età media	49.6	46.4	47.3	46.6	46.1	48.5	51.1	53.6	47.8	46.3
% maschi	78.7	82.6	81.6	85.9	79.7	76.3	73.1	56.0	90.0	86.4
% femmine	21.3	17.4	18.4	14.1	20.3	23.7	26.9	44.0	10.0	13.6
% nativi	91.0	85.9	86.4	82.8	83.7	86.6	88.5	84.0	90.0	90.9
% non nativi	9.0	14.1	13.6	17.2	16.3	13.4	11.5	16.0	10.0	9.1
% residenti area metropolitana	95.5	92.4	95.1	93.0	96.7	91.8	96.2	100.0	95.0	95.5
% residenti fuori area metropolitana	4.5	5.4	4.9	6.3	3.3	7.2	3.8	0.0	5.0	4.5
% primo contatto SERD	95.5	98.9	90.3	77.3	71.5	74.2	59.6	52.0	65.0	63.6
% primo contatto Ospedale	2.2	1.1	0.0	2.3	4.9	2.1	13.5	4.0	5.0	0.0
% primo contatto Psichiatria	2.2	0.0	9.7	20.3	23.6	23.7	26.9	44.0	30.0	36.4
% anche alcol	4.5	6.5	1.9	5.5	10.6	13.4	5.8	8.0	15.0	18.2
% anche sostanze illegali	6.7	5.4	6.8	8.6	7.3	12.4	7.7	12.0	20.0	13.6

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico

Tab. 32 - Gioco problematico\*. Caratteristiche soggetti in carico al SERD. Periodo 2009-2018

		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Numero totale*</b>		186	200	183	171	145	84	55	36	38	32
<b>seesso</b>	% femmine	19.4	18.5	19.7	18.7	59.0	26.2	20.0	19.4	10.5	18.8
<b>nuovo/già in carico</b>	% nuovi	49.5	45.0	40.4	50.3	55.9	66.7	54.5	41.7	21.1	46.9
<b>età media</b>	all'ingresso	49.9	46.3	49.5	45.1	48.5	49.2	45.7	46.1	46.9	47.5
<b>nazionalità</b>	% non nativi	8.6	10.0	8.7	11.1	11.7	11.9	7.3	8.3	7.9	6.3
<b>residenza</b>	% fuori area metropolitana	5.4	5.0	6.0	5.8	9.0	8.3	5.5	5.6	5.3	3.1
<b>stato civile</b>	% celibe/nubile	42.5	39.5	45.9	42.7	35.9	40.5	50.9	30.6	23.7	28.1
	% coniugato	30.6	33.5	33.9	32.7	35.2	38.1	34.5	55.6	60.5	53.1
	% separato/divorziato/vedovo	25.8	25.5	19.1	12.3	12.4	21.4	12.7	13.9	15.8	18.8
<b>titolo di studio</b>	% elementari	8.6	5.5	5.5	8.8	13.1	16.7	7.3	11.1	15.8	12.5
	% media inferiore	37.1	37.5	38.8	42.7	40.0	32.1	29.1	27.8	36.8	31.3
	% qualifica professionale	10.8	11.0	14.2	10.5	8.3	9.5	14.5	5.6	7.9	9.4
	% media superiore	30.6	32.5	27.9	28.7	28.3	34.5	29.1	36.1	31.6	34.4
	% livello universitario	7.0	8.0	5.0	5.3	6.2	6.0	3.6	11.1	7.9	6.3
	% sconosciuto	5.4	5.5	6.6	4.0	4.1	1.2	16.4	8.3	0.0	6.3
<b>condizione lavorativa</b>	% disoccupato/in cerca di occupazione	21.1	16.0	16.4	16.4	11.7	13.1	12.0	11.1	13.2	12.5
	% lavori precari/occupato regolarmente	60.2	63.0	59.0	56.7	55.9	60.7	54.5	66.7	63.2	56.3
	% pensione	21.5	15.0	18.8	12.3	24.1	22.6	20.0	13.9	23.7	25.0
	% studente	1.6	2.0	1.6	1.8	0.7	1.2	3.6	2.8	0.0	0.0
<b>presa in carico</b>	durata media in mesi	16.1	24.0	14.5	13.2	9.5	9.4	21.0	20.0	35.0	39.4
<b>esito programma</b>	% completato	2.7	9.0	5.5	3.5	3.4	0.0	1.8	19.4	28.9	28.1
	% dimissione concordata	3.2	4.5	7.1	4.7	6.9	3.6	3.6	5.6	7.9	12.5
	% passaggio altra struttura	0.5	0.0	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	8.3	7.9	3.1
	% abbandono	4.8	8.5	7.7	5.8	5.5	1.2	3.6	8.3	7.9	6.3
	% chiusura d'ufficio	18.8	12.0	18.6	22.8	20.7	31.0	9.1	19.4	26.3	25.0
	% decesso	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
	% in corso	69.4	65.5	61.2	62.0	62.1	64.3	80.0	36.1	18.4	21.9
<b>altre dipendenze</b>	% altre dipendenze	3.3	5.0	6.6	3.0	7.0	10.7	25.5	30.6	26.3	25.0
	Di cui % alcol	2.2	3.5	3.8	1.8	2.8	4.8	14.5	25.0	18.4	18.8
	Di cui % cocaina	1.1	1.0	1.1	0.6	1.4	1.2	7.3	5.6	2.6	0.0
	Di cui % eroina	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.6	3.1

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico





Tab. 34 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2018

		Totale									
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		1.02	1.00	0.95	1.08	1.61	1.28	1.24	1.20	0.92	1.04
illegali		0.65	0.66	0.63	0.60	0.72	0.73	0.58	0.73	0.39	0.48
oppioidi		0.13	0.17	0.18	0.17	0.28	0.15	0.19	0.25	0.19	0.30
cocaina		0.30	0.28	0.20	0.22	0.21	0.20	0.15	0.18	0.15	0.17
gioco		0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.06	0.03	0.02	0.02
		Maschi									
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		1.49	1.40	1.28	1.57	2.29	1.83	1.80	1.81	1.35	1.57
illegali		1.05	1.03	0.96	0.97	1.12	1.15	0.88	1.07	0.66	0.76
oppioidi		0.19	0.24	0.25	0.25	0.38	0.23	0.25	0.37	0.31	0.45
cocaina		0.51	0.46	0.34	0.36	0.36	0.36	0.25	0.30	0.26	0.28
gioco		0.16	0.19	0.21	0.25	0.24	0.17	0.10	0.04	0.04	0.04
		Femmine									
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		0.56	0.61	0.63	0.59	0.94	0.75	0.69	0.59	0.50	0.52
illegali		0.27	0.29	0.31	0.24	0.33	0.32	0.29	0.39	0.12	0.20
oppioidi		0.07	0.10	0.12	0.08	0.17	0.08	0.13	0.14	0.08	0.15
cocaina		0.10	0.11	0.06	0.08	0.07	0.04	0.05	0.06	0.03	0.06
gioco		0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00
		Nativi									
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		0.83	0.83	0.77	0.93	1.30	1.05	0.95	0.95	0.71	0.86
illegali		0.58	0.62	0.58	0.56	0.65	0.69	0.53	0.68	0.36	0.47
oppioidi		0.11	0.15	0.17	0.16	0.25	0.15	0.19	0.24	0.18	0.29
cocaina		0.28	0.28	0.18	0.21	0.21	0.19	0.13	0.17	0.14	0.17
gioco		0.11	0.11	0.13	0.14	0.13	0.10	0.07	0.03	0.03	0.02
		Non Nativi									
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		2.07	1.96	2.00	1.91	3.40	2.61	3.03	2.80	2.47	2.49
illegali		1.04	0.87	0.95	0.84	1.10	0.99	0.91	1.04	0.57	0.55
oppioidi		0.22	0.27	0.26	0.23	0.38	0.20	0.20	0.36	0.32	0.33
cocaina		0.43	0.32	0.31	0.26	0.20	0.26	0.26	0.21	0.20	0.17
gioco		0.08	0.12	0.11	0.18	0.23	0.13	0.01	0.05	0.01	0.02

Tab. 35 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2018.

	Alcol			Illegali			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto di Casalecchio</b>	<b>5.53</b>	<b>1.57</b>	<b>3.53</b>	<b>5.77</b>	<b>1.60</b>	<b>3.67</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
CASALECCHIO DI RENO	4.23	1.72	2.94	5.48	1.54	3.45	0.48	0.00	0.23
MONTE SAN PIETRO	2.99	1.16	2.07	2.40	1.45	1.92	0.00	0.00	0.00
SASSO MARCONI	5.12	1.87	3.50	7.92	0.93	4.43	0.00	0.00	0.00
VALSAMOGGIA	7.29	1.30	4.33	5.92	2.16	4.06	0.42	0.00	0.21
ZOLA PREDOSA	6.81	1.75	4.25	6.45	1.40	3.90	0.36	0.00	0.18
<b>Distretto Pianura Ovest</b>	<b>5.54</b>	<b>1.72</b>	<b>3.63</b>	<b>6.70</b>	<b>1.44</b>	<b>4.07</b>	<b>0.28</b>	<b>0.04</b>	<b>0.16</b>
ANZOLA DELL'EMILIA	4.65	2.49	3.58	8.21	1.11	4.68	0.00	0.00	0.00
CALDERARA DI RENO	7.23	1.47	4.32	7.73	1.22	4.45	0.00	0.00	0.00
CREVALCORE	4.90	1.23	3.07	6.86	0.25	3.56	0.98	0.00	0.49
SALA BOLOGNESE	7.06	0.77	3.89	4.71	0.39	2.53	0.78	0.39	0.58
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	4.74	2.01	3.37	5.69	2.25	3.96	0.00	0.00	0.00
SANT'AGATA BOLOGNESE	6.39	1.83	4.19	8.09	2.75	5.52	0.43	0.00	0.22
<b>Distretto Pianura Est</b>	<b>5.02</b>	<b>2.15</b>	<b>3.57</b>	<b>6.95</b>	<b>1.51</b>	<b>4.21</b>	<b>0.19</b>	<b>0.04</b>	<b>0.11</b>
ARGELATO	5.39	1.01	3.20	8.08	1.34	4.71	0.34	0.00	0.17
BARICELLA	3.22	4.63	3.92	8.28	1.39	4.85	0.00	0.00	0.00
BENTIVOGLIO	4.20	2.37	3.28	5.40	0.59	2.98	0.00	0.00	0.00
BUDRIO	4.91	2.15	3.52	6.54	1.26	3.88	0.18	0.00	0.09
CASTELLO D'ARGILE	5.70	1.00	3.40	6.18	1.00	3.65	0.00	0.00	0.00
CASTEL MAGGIORE	4.64	2.63	3.60	3.34	2.10	2.70	0.37	0.00	0.18
CASTENASO	3.88	1.51	2.66	7.54	0.65	4.00	0.23	0.00	0.11
GALLIERA	5.30	1.20	3.26	10.01	0.60	5.34	0.00	0.00	0.00
GRANAROLO EMILIA	5.12	2.11	3.60	8.08	1.32	4.66	0.00	0.26	0.13
MALALBERGO	4.34	1.81	3.08	5.43	1.81	3.62	0.00	0.00	0.00
MINERBIO	6.66	2.22	4.44	7.77	2.95	5.36	0.74	0.00	0.37
MOLINELLA	5.15	2.34	3.74	8.79	2.13	5.45	0.21	0.21	0.21
PIEVE DI CENTO	5.88	1.94	3.90	6.37	1.94	4.14	0.00	0.00	0.00
SAN GIORGIO DI PIANO	5.37	2.61	3.97	6.13	1.86	3.97	0.38	0.00	0.19
SAN PIETRO IN CASALE	5.96	2.37	4.18	8.03	1.05	4.57	0.00	0.00	0.00
<b>Distretto di S. Lazzaro</b>	<b>3.70</b>	<b>1.37</b>	<b>2.52</b>	<b>7.04</b>	<b>1.63</b>	<b>4.30</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>
LOIANO	7.43	0.00	3.84	9.67	3.18	6.54	0.00	0.00	0.00
MONGHIDORO	7.03	1.89	4.56	10.54	1.89	6.38	0.00	0.00	0.00
MONTERENZIO	2.58	2.59	2.59	7.75	2.59	5.18	0.52	0.00	0.26
OZZANO DELL'EMILIA	4.11	0.95	2.51	7.74	0.71	4.18	0.24	0.00	0.12
PIANORO	3.18	2.13	2.65	7.75	2.13	4.90	0.20	0.00	0.10
SAN LAZZARO DI SAVENA	3.06	1.03	2.02	5.36	1.34	3.29	0.22	0.00	0.11
<b>Distretto di Porretta</b>	<b>5.87</b>	<b>1.73</b>	<b>3.84</b>	<b>5.34</b>	<b>1.17</b>	<b>3.30</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>
ALTO RENO TERME	6.98	0.49	3.72	2.49	0.98	1.73	0.00	0.00	0.00
CAMUGNANO	1.86	3.88	2.85	1.86	1.94	1.90	0.00	0.00	0.00
CASTEL D'AIANO	8.98	0.00	4.64	3.59	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
CASTEL DI CASIO	5.80	0.00	2.97	1.93	1.02	1.49	0.97	0.00	0.50
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	5.99	1.27	3.70	4.19	1.27	2.78	0.00	0.00	0.00
GAGGIO MONTANO	8.96	2.09	5.54	4.82	0.70	2.77	0.00	0.00	0.00
GRIZZANA MORANDI	5.67	0.90	3.41	8.91	0.90	5.11	0.00	0.00	0.00
LIZZANO IN BELVEDERE	3.08	0.00	1.56	1.54	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
MARZABOTTO	7.52	3.41	5.50	10.33	2.92	6.70	0.47	0.00	0.24
MONZUNO	2.97	2.65	2.81	4.45	0.53	2.56	0.49	0.00	0.26
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	3.75	0.84	2.38	3.75	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
VERGATO	6.26	2.66	4.45	8.04	1.78	4.90	0.45	0.00	0.22
<b>Distretto Bologna città</b>	<b>4.78</b>	<b>1.77</b>	<b>3.24</b>	<b>8.68</b>	<b>2.32</b>	<b>5.43</b>	<b>0.14</b>	<b>0.04</b>	<b>0.09</b>
BOLOGNA	4.78	1.77	3.24	8.68	2.32	5.43	0.14	0.04	0.09
<b>Area metropolitana</b>	<b>4.56</b>	<b>1.64</b>	<b>3.09</b>	<b>6.84</b>	<b>1.73</b>	<b>4.26</b>	<b>0.18</b>	<b>0.03</b>	<b>0.10</b>

Tab. 36 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2018.

	Alcol			Illegal i			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto di Casalecchio</b>	<b>2.09</b>	<b>0.59</b>	<b>1.33</b>	<b>1.24</b>	<b>0.42</b>	<b>0.82</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>
CASALECCHIO DI RENO	0.96	0.72	0.84	1.06	0.09	0.56	0.29	0.00	0.14
MONTE SAN PIETRO	0.60	0.00	0.30	0.60	0.58	0.59	0.00	0.00	0.00
SASSO MARCONI	3.03	0.70	1.87	2.33	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
VALSAMOGGIA	3.49	0.76	2.14	1.48	0.97	1.23	0.42	0.00	0.21
ZOLA PREDOSA	1.97	0.35	1.15	0.72	0.35	0.53	0.18	0.00	0.09
<b>Distretto Pianura Ovest</b>	<b>1.40</b>	<b>0.68</b>	<b>1.04</b>	<b>1.08</b>	<b>0.24</b>	<b>0.66</b>	<b>0.12</b>	<b>0.04</b>	<b>0.08</b>
ANZOLA DELL'EMILIA	1.09	1.11	1.10	1.09	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
CALDERARA DI RENO	1.50	0.24	0.86	2.24	0.24	1.24	0.00	0.00	0.00
CREVALCORE	1.47	0.25	0.86	0.24	0.00	0.12	0.24	0.00	0.12
SALA BOLOGNESE	2.35	0.00	1.17	1.18	0.00	0.58	0.39	0.39	0.39
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	0.71	1.06	0.89	0.71	0.47	0.59	0.00	0.00	0.00
SANT'AGATA BOLOGNESE	2.98	0.92	1.99	1.70	0.46	1.10	0.43	0.00	0.22
<b>Distretto Pianura Est</b>	<b>1.89</b>	<b>0.78</b>	<b>1.33</b>	<b>1.31</b>	<b>0.27</b>	<b>0.78</b>	<b>0.12</b>	<b>0.02</b>	<b>0.07</b>
ARGELATO	2.02	0.34	1.18	2.02	0.00	1.01	0.34	0.00	0.17
BARICELLA	0.92	1.85	1.39	0.00	0.46	0.23	0.00	0.00	0.00
BENTIVOGLIO	1.20	1.18	1.19	1.20	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
BUDRIO	2.54	0.72	1.62	1.82	0.36	1.08	0.18	0.00	0.09
CASTELLO D'ARGILE	3.33	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASTEL MAGGIORE	1.86	1.05	1.44	0.19	0.53	0.36	0.19	0.00	0.09
CASTENASO	1.83	0.43	1.11	0.91	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
GALLIERA	1.18	0.60	0.89	1.18	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
GRANAROLO EMILIA	2.69	0.79	1.73	2.42	0.26	1.33	0.00	0.00	0.00
MALALBERGO	1.81	1.09	1.45	2.17	0.72	1.45	0.00	0.00	0.00
MINERBIO	2.22	0.74	1.48	1.85	0.37	1.11	0.74	0.00	0.37
MOLINELLA	1.29	0.85	1.07	1.72	0.21	0.96	0.21	0.21	0.21
PIEVE DI CENTO	0.98	0.00	0.49	0.98	0.49	0.73	0.00	0.00	0.00
SAN GIORGIO DI PIANO	2.30	0.37	1.32	2.30	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
SAN PIETRO IN CASALE	1.30	1.32	1.31	0.52	0.26	0.39	0.00	0.00	0.00
<b>Distretto di S. Lazzaro</b>	<b>1.06</b>	<b>0.56</b>	<b>0.80</b>	<b>0.92</b>	<b>0.26</b>	<b>0.59</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
LOIANO	3.72	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONGHIDORO	0.88	1.89	1.37	0.88	0.95	0.91	0.00	0.00	0.00
MONTERENZIO	1.03	1.56	1.29	1.03	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
OZZANO DELL'EMILIA	1.45	0.24	0.84	1.21	0.24	0.72	0.24	0.00	0.12
PIANORO	0.99	0.39	0.69	0.60	0.19	0.39	0.20	0.00	0.10
SAN LAZZARO DI SAVENA	0.55	0.52	0.53	1.09	0.31	0.69	0.11	0.00	0.05
<b>Distretto di Porretta</b>	<b>1.84</b>	<b>0.93</b>	<b>1.39</b>	<b>0.89</b>	<b>0.06</b>	<b>0.48</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
ALTO RENO TERME	2.49	0.00	1.24	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
CAMUGNANO	0.00	1.94	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASTEL D'AIANO	3.59	0.00	1.86	1.80	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
CASTEL DI CASIO	2.90	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.50
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	1.80	0.64	1.23	0.00	0.64	0.31	0.00	0.00	0.00
GAGGIO MONTANO	3.45	1.39	2.42	0.69	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
GRIZZANA MORANDI	0.81	0.00	0.43	2.43	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
LIZZANO IN BELVEDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZABOTTO	2.35	2.44	2.39	1.88	0.00	0.96	0.47	0.00	0.24
MONZUNO	1.48	0.53	1.02	0.49	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	0.75	0.84	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VERGATO	1.34	1.78	1.56	1.34	0.00	0.67	0.45	0.00	0.22
<b>Distretto Bologna città</b>	<b>1.50</b>	<b>0.48</b>	<b>0.98</b>	<b>1.14</b>	<b>0.31</b>	<b>0.71</b>	<b>0.09</b>	<b>0.02</b>	<b>0.05</b>
BOLOGNA	1.50	0.48	0.98	1.14	0.31	0.71	0.09	0.02	0.05
<b>Area metropolitana</b>	<b>1.49</b>	<b>0.56</b>	<b>1.02</b>	<b>1.05</b>	<b>0.27</b>	<b>0.65</b>	<b>0.12</b>	<b>0.02</b>	<b>0.07</b>
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
	1.49	0.56	1.02	1.05	0.27	0.65	0.12	0.02	0.07

Tab.37 - Consumo problematico sostanze psicoattive. Stima del sommerso. Periodo 2009-2018

	2018		2017		2016		2015		2014	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
alcol	3883	3313-4454	3495	2932-4058	3743	3117-4368	3345	2847-3842	3986	3387-4585
illegali	4963	4341-5585	5370	4630-6110	5994	5064-6923	7723	6220-9227	8083	6570-9597
di cui oppioidi	2326	2100-2553	2370	2143-2597	2987	2578-3397	3480	2844-4115	4364	3593-5135
di cui cocaina	1325	1157-1493	1509	1283-1734	1255	1028-1483	1288	1016-1559	1341	1005-1677
Sconosciuti/ Conosciuti	2018		2017		2016		2015		2014	
alcol	3.60		4.05		4.53		3.80		4.43	
illegali	2.15		2.30		2.53		3.22		3.41	
di cui oppioidi	1.29		1.27		1.55		1.75		2.16	
di cui cocaina	1.51		1.80		1.79		1.87		2.14	
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
alcol	3553	3033-4072	3445	2916-3974	3747	3116-4377	4139	3482-4797	3362	2866-3859
illegali	5583	4669-6497	4733	4089-5377	6879	5731-8027	8376	6872-9880	6115	5130-7101
di cui oppioidi	3206	2746-3667	2986	2652-3319	2878	2567-3188	2864	2542-3185	3076	2705-3447
di cui cocaina	902	732-1071	767	621-913	858	664-1051	967	755-1178	919	772-1066
Sconosciuti/ Conosciuti	2013		2012		2011		2010		2009	
alcol	3.94		4.19		4.56		4.48		3.74	
illegali	2.37		1.99		2.76		3.25		2.38	
di cui oppioidi	1.59		1.43		1.32		1.30		1.38	
di cui cocaina	1.60		1.50		1.73		1.61		1.32	

**Tab.38 - Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2009-2018**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KG HEROINA	22.5	52.7	25.3	9.2	30.6	2.4	11.9	3.9	31.5	3.5
KG COCAINA	39.9	38.4	33.5	28.4	35.0	22.0	10.7	54.4	46.3	12.8
KG HASCISH	506.8	66.7	140.7	157.7	38.2	41.8	63.1	69.5	546.3	94.2
KG MARIJUANA	41.0	4.44	89.7	170.7	68.0	75.2	69.2	46.8	641.2	163.4
operazioni	544	483	616	574	652	489	328	448	411	273.95
denunce	825	696	888	709	616	606	398	572	574	477
arresti	708	573	790	621	542	493	308	471	488	384
minori denunciati	23	14	17	11	12	9	15	16	13	15
non nativi denunciati	451	385	569	461	410	375	286	466	447	329

Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza

Tab.39 - Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose\*: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2018

	decessi per overdose nel territorio dell'area metropolitana di Bologna						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Numero totale	16	23	13	17	17	11	20
Età media	36.9	40.0	39.0	40.6	40.7	42.4	45.3

2012	accessi al Pronto Soccorso per overdose					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
113	112	98	86	85	69	50
36.3	37.9	38	38.2	37.9	36.4	40.2

% Femmine	6.3	8.7	7.7	0.0	17.6	36.4	30.0
% Non nativi	31.3	21.7	7.7	17.6	5.9	9.1	5.0
% Non residenti	31.3	43.5	38.5	35.3	29.4	27.3	35.0
% sconosciuti al SERD	43.8	21.7	30.8	29.4	47.1	45.5	45.0

24.8	10.7	11.2	11.6	23.5	21.7	18.0
12.4	24.1	19.4	22.4	31.8	21.7	28.0
47.8	55.4	45.9	51.8	47.1	44.9	36.0
87.6	73.2	46.9	52.9	49.4	50.7	36.0

\* Keywords: "abuso" & "alcol"; "abuso" & "alcol"; "abuso" & "etil"; "abuso" & "etanolic"; "intossicazione" & "alcol"; "intossicazione" & "alcol"; "intossicazione" & "etil"; "esotossicosi etili"; "esotossicosi alc". Per la metodologia utilizzata cfr. Pavarin RM et al., Cocaine-related medical and related problems: a consecutive series of 743 patients from a multicentre study in Italy, in *European Journal of Emergency Medicine*, 2011 Aug;18(4):208-14

**Tab. 40 - Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta\*: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2018.**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1971	1729	1919	1602	2538	2000	1983	2000	1432	1468
% <18 anni	3.5	4.4	2.7	4.0	2.8	2.7	2.5	3.0	2.8	2.3
% 18-29 anni	23.5	23.5	22.3	24.8	20.9	27.5	23.2	23.4	31.7	28.5
% 30-39 anni	15.9	19.2	17.1	16.7	23.1	21.2	23.1	20.6	21.9	21.7
% 40-49 anni	22.7	22.2	22.7	22.2	22.4	22.4	22.5	23.9	24.0	21.2
% 50-59 anni	16.8	17.4	17.1	15.7	13.6	12.6	12.8	15.4	10.9	14.8
% =>60 anni	15.8	11.2	16.9	14.8	13.5	10.1	11.6	10.0	7.4	8.6
% Non noto	1.9	2.2	1.3	1.7	3.7	3.7	4.2	3.8	1.4	2.9
Età media	41.7	41.0	43.3	41.8	41.8	39.4	40.8	40.7	37.4	39.1
% Femmine	27.9	28.7	29.7	28.3	28.1	26.1	25.0	23.2	27.2	26.4
% Non nativi	41.1	44.9	37.9	35.8	42.5	39.6	40.4	34.7	43.4	35.4
% Non residenti in area metropolitana	35.9	42.7	32.9	32.2	37.8	39.1	38.3	42.0	43.0	38.6
% Arrivo al ps di notte (dalle 20 alle 8)	59.8	66.8	62.7	67.0	37.4	63.3	38.7	59.9	29.0	67.2
% Arrivo nel week end	45.7	48.8	50.2	50.9	29.1	47.4	30.4	47.1	23.0	50.5
% Forze dell'ordine	0.8	0.8	0.3	0.9	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	1.0
% Codice triage rosso	4.4	3.1	3.4	3.0	2.6	2.1	1.8	1.2	2.4	2.2
% Almeno un'altra sostanze psicoattiva illegale	10.1	10.0	12.4	7.2	6.8	10.5	9.6	6.5	7.2	5.6

\* Keywords: "abuso" & "alcol"; "abuso" & "alcohol"; "abuso" & "etil"; "abuso" & "etanolic"; "intossicazione" & "alcol"; "intossicazione" & "alcohol"; "intossicazione" & "etil"; "esotossicosi etil"; "esotossicosi alc". Per la metodologia utilizzata cfr. Pavarin RM et al., Cocaine-related medical and related problems: a consecutive series of 743 patients from a multicentre study in Italy, in *European Journal of Emergency Medicine*, 2011 Aug;18(4):208-14