

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Rapporto 2019 sulle dipendenze in area metropolitana

*quadro epidemiologico
caratteristiche tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d'azzardo problematici,
attività dei servizi*

A cura di Raimondo Maria Pavarin
Con la collaborazione di Silvia Marani ed Elsa Turino

Azienda USL di Bologna
DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Via S. Isaia, 94/A
Tel. 051/6584313

<http://www.ausl.bologna.it/oem>

Si ringraziano

*Luana Capitani – AUSL di Bologna – U.O.S.D Ser. T Bologna Ovest
Simonetta Cioni – AUSL Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Orietta Venturi – AUSL di Bologna – Equipe carcere U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Stefania Bongiovanni e Daniele Campedelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Pianura Ovest
Catia Leoni – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Sert Bologna Est
Elisabetta Bacchini – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert Budrio
Giorgia Paoletti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T San Lazzaro di Savena
Leonardo Piscitelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Vergato
Cristina Nasonte – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert San Giorgio di Piano
Simona Sarti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Zola*

*Moreno Astorri – Opera Padre Marella, Comunità “La Sorgente”
Marco Sirotti – Cooperativa Sociale “Il Pettiroso”
Manuela Civettini– Opegroup Dipendenze
Domenico Catelli– Cooperativa Sociale “ASAT”*

*Vincenza Perlangeli – Ausl Bologna – U.O.C. Epidemiologia, promozione della salute e comunicazione del rischio
Antonietta Moschetti – Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi – Tecnologie e Sistemi Informatici*

Sono inoltre disponibili on line sul sito dell'Osservatorio.
<http://www.ausl.bologna.it/oem> :

- 1 – [Allegato 1: tabelle dati – approfondimenti](http://www.ausl.bologna.it/oem/i-rapporti-sulle-diepdenze-in-area-metropolitana/rapporto-2018-sulle-dipendenze-in-area)
- 2 – [Dati statistici](http://www.ausl.bologna.it/oem/dati-statistici-1)
- 3 – [Mappa dei servizi pubblici e privati per le dipendenze in area metropolitana](http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa-servizi)

Il consumo problematico di sostanze illegali

Rispetto agli anni precedenti si arresta la diminuzione del numero di consumatori problematici (CP) di stupefacenti, che rimane stabile. Calano gli utenti SERD (Carcere compreso) ed aumentano gli accessi al Pronto Soccorso (PS) ed i ricoveri ospedalieri. Mediamente nei PS vi sono 9.3 accessi per alcol e 3.4 per sostanze illegali al giorno.

Cambiano le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche: rispetto all'anno precedente è in aumento l'età media, il numero di non residenti e di non nativi. Si segnala la diminuzione dell'uso di sostanze per via iniettiva e l'aumento del numero di decessi per overdose (20 nel 2018 rispetto agli 11 nel 2017).

Per quanto riguarda le sostanze, diminuiscono i CP di eroina ed aumentano i CP di cocaina e cannabis.

Tra gli utenti SERD diminuisce la quota di positivi all'HIV ed all'Epatite C ed aumenta il numero dei soggetti testati. Tra i nuovi utenti SERD sono in aumento i soggetti con occupazione stabile e dimora regolare.

Il consumo problematico di alcol

Aumenta il numero complessivo e quello di nuovi accessi di persone con consumo problematico di alcol. In aumento il numero di accessi ai SERD ed al Pronto Soccorso. Tra i nuovi utenti SERD, in aumento la quota di soggetti con abitazione stabile ed occupati.

I non nativi

Il numero di non nativi con consumo problematico di alcol e di sostanze illegali è in costante aumento nel tempo. Tali CP non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea. Tra i non nativi residenti, si segnala l'aumento dell'incidenza sia per l'alcol che per le sostanze illegali, più elevata tra i soggetti con età compresa tra 18 e 19 anni.

I residenti

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti di sesso maschile, è in aumento l'incidenza di consumo problematico di alcol e di sostanze illegali. In particolare, aumenta per la cocaina (0.28 per mille residenti nel 2017, 0.30 nel 2018) e diminuisce per l'eroina (0.17 per mille residenti nel 2017, 0.13 nel 2018).

Da rilevare che l'incidenza è più elevata tra non nativi rispetto ai nativi. Tra le persone con CP di sostanze illegali si segnalano i CP con età inferiore a 30 anni. Tra i soggetti con CP di alcol l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 18 e 29 anni.

I minori

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 17 anni è in aumento l'incidenza del CP di alcol tra i maschi e tra i non nativi. Per quanto riguarda il CP di sostanze illegali, si registra un aumento per maschi, femmine, nativi e non nativi. Si segna inoltre l'aumento dell'incidenza del CP di eroina e la diminuzione del CP di cocaina.

Il gioco d'azzardo problematico

Diminuisce il numero complessivo di persone prese in carico (200 nel 2017, 186 nel 2018) ed il numero di soggetti che si presentano ai SERD per la prima volta per problemi dovuti al gioco. In aumento l'età media (49.9 anni) e la percentuale di femmine (19%).

Cosa emerge dagli studi dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze

- Nell'area metropolitana di Bologna sono in aumento gli accessi ai PS per intossicazione alcolica acuta tra gli adolescenti, in particolare nella popolazione non nativa. In molti casi in associazione con l'uso di sostanze illegali.
- Le caratteristiche degli utenti SERD alcolisti sono cambiate nel tempo e, unitamente ad una crescente presenza di donne e non nativi, si osserva una diminuzione del numero di soggetti marginali e l'aumento del numero di persone socialmente integrate. Il rischio di mortalità è più elevato rispetto a quello della popolazione generale, ma è in diminuzione.
- Tra gli eroinomani utenti SERD sono in aumento i non nativi, che si distinguono per la modalità d'uso non iniettiva e per un tasso di mortalità più basso. Si osservano differenze tra le varie zone di origine riguardanti gli stili di consumo e il rischio di morte. Indipendentemente dalla nazionalità, il rischio di morte è in calo a partire dal 2001.
- Si osserva un cambiamento nelle caratteristiche dei pazienti SERD trattati per uso primario di cocaina, che si riflettono sia sul rischio di mortalità che sulle cause di morte. Infatti, il rischio di decesso è più elevato per chi usa anche eroina (categoria questa in diminuzione). Tra i soggetti con il solo uso di cocaina le principali cause di morte riguardano tumori e traumatismi; tra chi usa anche eroina overdose e malattie cardiovascolari.

1 - Il consumo problematico di sostanze illegali

Rispetto agli anni precedenti, rimane stabile il numero di contatti, ma cala per gli oppioidi (in particolare per l'eroina) ed aumenta per la cocaina e per la cannabis. Per quanto riguarda le caratteristiche, si segnala il calo del numero di femmine e l'aumento dell'età media, del numero di nuovi contatti, di non residenti e di non nativi. Raddoppia il numero di decessi per overdose. Calano gli utenti dei SERD (in particolare il Carcere) ed aumentano i ricoveri ospedalieri e gli accessi al pronto soccorso. Tra i residenti si segnala il calo di incidenza e prevalenza rispetto al 2017, ma nel periodo il trend è in aumento.

Tra i nuovi contatti si segnala la diminuzione dell'età media e l'aumento del numero di consumatori problematici di cocaina, di non nativi, di non residenti e, pur su numeri bassi, di persone senza fissa dimora.

I consumatori problematici di sostanze illegali

		2018	2017	2016
Sostanze	Numero	3258	3255	3368
	Oppioidi	2085	2126	2273
	Cocaina	1345	1269	1100
	Cannabis	578	550	563
Caratteristiche	% nuovi contatti	21.4	20.8	21.6
	Età media	40.8	40.6	40.0
	% femmine	19.0	19.5	19.8
	% non residenti	21.4	18.9	24.9
	% non nativi	22.4	21.8	22.4
Servizi	SERD	2648	2671	2742
	Pronto Soccorso	498	482	490
	Ospedale	291	277	254
Dati epidemiologici	Incidenza x 1000 residenti	0.65	0.66	0.63
	Prevalenza x 1000 residenti	4.26	4.35	4.25

Per quanto riguarda i servizi, l'accesso è più frequente al SERD, soprattutto per soggetti con problemi dovuti all'eroina. L'ospedale si caratterizza per una fascia di utenza con età mediamente più elevata e per la maggiore presenza di femmine; il Pronto Soccorso per la maggiore presenza di non residenti e di non nativi. I servizi sanitari di emergenza (PS) ed il Carcere, con la loro elevata quota di nuovi contatti, si confermano tra i principali punti di primo accesso per il consumo problematico di sostanze illegali.

L'accesso ai servizi

		SERD	PS	Ospedale
Sostanze	Numero	2648	498	291
	% Oppioidi	73.1	34.1	41.6
	% Cocaina	41.5	39.0	38.1
	% Cannabis	14.2	28.1	28.5
Caratteristiche	% nuovi	20.6	49.6	41.9
	Età media	41.2	37.1	41.2
	% femmine	18.2	19.9	31.6
	% non residenti	19.6	30.1	14.4
	% non nativi	21.2	28.9	21.0

Per quanto riguarda gli utenti SERD, si segnala la diminuzione della quota di positivi all'HIV ed all'epatite C e l'aumento del numero di soggetti testati.

Lo stato di salute degli utenti SERD

% positivi	HIV	Epatite C	% con almeno un test	HIV	Epatite C
	2018	6.2		34.9	2018
2017	8.8	46.9	2017	74.7	72.1
2016	9.1	42.2	2016	72.2	72.9

2 - Il consumo problematico di alcol

Consumo problematico di alcol: dati epidemiologici

		2018	2017	2016
	Numero soggetti	2682	2609	2579
Caratteristiche	% nuovi contatti	40.4	40.0	39.3
	Età media	49.6	49.1	49.0
	% femmine	26.2	26.0	26.9
	% non residenti	17.	15.8	15.5
	% non nativi	25.3	25.6	23.9
Servizi	SERD	1215	1184	1167
	Pronto Soccorso	1355	1220	1196
	Ospedale	577	600	611
Dati epidemiologici	Incidenza x 1000 residenti	1.0	1.0	0.95
	Prevalenza x 1000 residenti	3.09	2.99	3.0

Rispetto agli anni precedenti, aumentano l'età media ed il numero complessivo di persone con CP di alcol. L'aumento coinvolge diverse tipologie di soggetti (maschi, femmine, nativi, non nativi, residenti e non residenti). Aumentano in modo particolare gli alcolisti seguiti dal SERD e gli accessi al Pronto Soccorso. L'incremento del numero di soggetti con problemi alcol correlati si conferma anche utilizzando i dati relativi ai residenti, aumentano infatti sia l'incidenza che la prevalenza. Da segnalare la quota, altalenante nel tempo, di soggetti con abuso concomitante di sostanze illegali (19%) e di psicofarmaci (4.7%).

3 – I non nativi

I non nativi con consumo problematico di alcol e di sostanze illegali non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea. Per l'alcol si evidenziano nell'ordine i nativi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea, per le sostanze illegali la graduatoria si inverte, con i soggetti nativi di paesi dell'Africa mediterranea seguiti da quelli di paesi dell'Europa dell'Est. Di rilievo, anche se su una base eterogenea, l'aumento della quota di soggetti provenienti da paesi asiatici, sia per l'alcol che per le sostanze illegali.

Per quanto riguarda le sostanze illegali, il 54% ha un consumo problematico dovuto ad uso oppioidi (in diminuzione), il 52% dovuto ad uso di cocaina (in aumento).

Zona di provenienza	Sostanze illegali		Alcol	
	2018	2017	2018	2017
Totale	730	709	678	669
% Europa Est	26.0	23.1	44.0	45.7
% Altri paesi europei	8.8	9.3	8.6	7.9
% Asia	8.4	8.7	9.3	9.0
% Africa Mediterranea	44.9	49.2	21.8	22.3
% Altra Africa	5.2	4.2	8.1	6.4
% America Latina	6.3	5.4	7.2	7.6

Per quanto riguarda i settori di contatto, la maggior parte dei soggetti con abuso di sostanze illegali si rivolge al SERD (in diminuzione), in molti casi in seguito ad una carcerazione, mentre invece chi ha problemi con l'alcol accede di preferenza al Pronto Soccorso.

Servizi a cui si rivolgono	Sostanze illegali		Alcol	
	2018	2017	2018	2017
% Ospedale	8.4	5.9	17.6	17.9
% Pronto soccorso	19.7	18.3	62.5	60.8
% SERD	76.8	80.3	38.1	30.9
% di cui anche Carcere	36.2	39.5	5.9	7.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	13.4	13.1	2.9	2.1

4 – I residenti

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti di sesso maschile e tra i residenti non nativi, è in aumento l'incidenza di consumo problematico sia di alcol che di sostanze illegali.

Consumo problematico di sostanze illegali e di alcol – incidenza per mille residenti

	Alcol		Illegali		Alcol		Illegali	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Nativi	Non nativi	Nativi	Non nativi
2018	1.49	0.56	1.05	0.27	0.83	2.07	0.58	1.04
2017	1.40	0.61	1.03	0.29	0.83	1.96	0.62	0.87
2016	1.28	0.63	0.96	0.31	0.77	2.00	0.58	0.95
2015	1.57	0.59	0.97	0.24	0.93	1.91	0.56	0.84
2014	2.29	0.94	1.12	0.33	1.30	3.40	0.65	1.10
2013	1.83	0.75	1.15	0.32	1.05	2.61	0.69	0.99
2012	1.80	0.69	0.88	0.29	0.95	3.03	0.53	0.91
2011	1.81	0.59	1.07	0.39	0.95	2.80	0.68	1.04
2010	1.35	0.50	0.66	0.12	0.71	2.47	0.36	0.57
2009	1.57	0.52	0.76	0.20	0.86	2.49	0.47	0.55

Tra le persone con consumo problematico di sostanze illegali, l'incidenza su mille residenti è più elevata tra i non nativi, in particolare tra i soggetti nella fascia di età compresa tra 18 e 24 anni. Sia tra i nativi che tra i non nativi si segnalano i CP con età inferiore a 30 anni. Da rilevare che l'incidenza è sempre più elevata tra i maschi rispetto alle femmine in tutte le classi di età; risulta invece più elevata per i nativi per età inferiori a 40 anni e per i non nativi per età superiori.

Sostanze illegali: incidenza per mille residenti per età	Maschi		Femmine		Nativi		Non nativi	
12-17	0.81	0.73	0.66	1.58				
18-19	2.84	0.43	1.44	3.25				
20-24	2.80	0.57	1.46	3.03				
25-29	1.83	0.62	1.08	1.75				
30-34	1.58	0.36	0.94	1.03				
35-39	1.08	0.24	0.61	0.84				
40-44	1.00	0.12	0.55	0.45				
45-49	0.77	0.21	0.49	0.45				
50-54	0.60	0.11	0.36	0.29				
55-59	0.30	0.09	0.18	0.36				
60-64	0.16	0.00	0.08	0.00				

Tra i soggetti con abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi in tutte le classi di età, escluso tra i minori, dove prevalgono i nativi; sia tra i nativi che tra i non nativi l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 18 e 19 anni. Tra i nativi si segnalano i soggetti con età compresa tra 18 e 24 anni; tra i non nativi le fasce di età 18-29 anni e 45-59 anni.

Alcol: incidenza per mille residenti per età	Maschi		Femmine		Nativi		Non nativi	
12-17	0.64	0.59	0.63	0.53				
18-19	2.84	1.73	2.08	3.72				
20-24	1.64	0.97	1.06	2.55				
25-29	1.74	0.53	0.68	2.68				
30-34	1.30	0.28	0.67	1.11				
35-39	1.57	0.31	0.72	1.67				
40-44	1.35	0.38	0.69	1.73				
45-49	1.67	0.72	0.91	3.23				
50-54	1.32	0.47	0.68	2.77				
55-59	1.76	0.50	0.94	2.69				
60-64	1.46	0.67	0.99	1.80				

5 – Gli accessi al pronto soccorso

Sostanze illegali			Alcol		
	2018	2009		2018	2009
Numero accessi	1257	653	Numero accessi	3393	2542
Età media	36.9	36.4	Età media	45.2	41.7
% Femmine	14.8	8.7	% Femmine	18.1	17.9
% Non nativi	20.5	7.8	% Non nativi	20.3	20.5
% Non residenti	24.7	13.2	% Non residenti	19.9	22.7
% Anche alcol	26.8	16.1	% anche sostanze illegali	13.5	11.0
% Oppioidi	21.3	50.1			
% Cocaina	33.1	17.2			
% Cannabis	20.3	12.3			

Il numero di soggetti che accedono ai PS per consumo problematico di sostanze illegali è in costante aumento rispetto al 2009. Aumentano l'età media, la percentuale di femmine, di non residenti e di non nativi. Diminuisce la quota di accessi per CP di oppioidi, aumenta per uso di cannabis e cocaina e per abuso concomitante di alcol.

Aumenta anche il numero di CP di alcol. Oltre all'età media, aumentano anche la percentuale di femmine e di soggetti con abuso concomitante di sostanze illegali.

6 – I ricoveri ospedalieri

Sostanze illegali			Alcol		
	2018	2009		2018	2009
Numero ricoveri	490	467	Numero ricoveri	821	1043
% Dipendenza droghe	21.0	21.2	% Danni epatici	13.4	7.5
% Abuso droghe senza dipendenza	57.6	32.7			
Età media	43.2	47.2	Età media	55.9	55.9
% Femmine	35.1	53.5	% Femmine	26.9	24.0
% Non nativi	21.0	10.9	% Non nativi	18.9	11.4
% Non residenti	9.2	8.6	% Non residenti	6.6	8.4
% Oppioidi	21.6	20.0			
% Cocaina	23.2	6.3			
% Cannabis	17.6	5.3			

Rispetto al 2009, è in aumento sia il numero di ricoveri che il numero di ricoverati per abuso/dipendenza da sostanze illegali. Si segnala la diminuzione dell'età media, della quota di femmine, di non residenti e di non nativi. Per quanto riguarda le sostanze, in aumento la percentuale di soggetti con abuso/dipendenza da oppioidi, da cannabis e da cocaina.

Il numero di ricoveri per problemi alcol correlati è diminuzione. Mentre l'età media al ricovero è stabile, aumenta nel tempo la percentuale di femmine, non nativi e residenti. Si segnala l'aumento del numero di ricoveri per danni epatici.

7 – I nuovi utenti dei SERD

Il numero di nuovi accessi ai SERD per CP di sostanze illegali è in aumento rispetto allo scorso anno ed è il più elevato a partire da 2009. Aumentano l'età media, non nativi, residenti e soggetti senza fissa dimora.

Per quanto riguarda le sostanze di abuso, aumenta in modo marcato il numero di soggetti con uso di eroina e di cocaina. Questi ultimi aumentano di 100 unità rispetto al 2017.

Per quanto riguarda la fonte del primo contatto, si segnalano il carcere e l'Unità Mobile. Aumenta il numero di soggetti con dimora stabile ed occupati e diminuisce la quota di studenti. Si segnalano 8 casi di soggetti positivi all'HIV (e 47 casi di positivi all'epatite C).

	Sostanze illegali		Alcol	
	2018	2017	2018	2017
Numero soggetti	545	408	357	224
Età media	34.8	33.9	47.0	44.8
% Femmine	11.7	14.2	28.6	26.3
% Non nativi	36.7	36.5	27.2	32.6
% Non residenti	35.2	37.0	9.5	15.2
% Dimora stabile	58.0	57.4	87.3	81.2
% Occupati	36.1	35.7	48.4	47.0
% Oppioidi	47.3	42.6		
% Cocaina	61.5	56.9		

Il numero di nuovi utenti SERT con dipendenza da alcol è in aumento rispetto al 2017, ed è il più elevato a partire dal 2009. Aumentano l'età media e la percentuale di femmine, diminuiscono le percentuali di non nativi, non residenti, e soggetti senza fissa dimora. Si segnala l'aumento della quota di positivi all'epatite C (4.7%, 16 casi) e della percentuale di persone che hanno avuto anche ricoveri ospedalieri ed accessi al pronto soccorso. In aumento la quota di soggetti con abitazione stabile ed occupati.

8 – I minori

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 17 anni è in aumento l'incidenza (nuovi casi su 1000 residenti) del consumo problematico di alcol sul totale, tra i maschi e tra i nativi. Rimane invece costante tra le femmine e diminuisce tra i non nativi.

Alcol: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-17 anni

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale	0.83	0.93	1.00	0.46	0.61	0.62
Maschi	1.00	1.11	1.17	0.45	0.61	0.64
Femmine	0.66	0.74	0.82	0.47	0.60	0.59
Nativi	0.82	0.97	0.84	0.48	0.54	0.63
Non nativi	0.88	0.68	2.07	0.35	1.07	0.53

Per quanto riguarda le sostanze illegali, aumenta l'incidenza di consumo problematico in entrambi i sessi e indipendentemente dalla provenienza geografica. Si segnala che il dato 2018 per i non nativi triplica rispetto all'anno precedente.

Relativamente alle singole sostanze, su numeri molto bassi, si osserva l'aumento dell'incidenza del consumo problematico di eroina e di cocaina.

Sostanze illegali: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-17 anni

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale	0.42	0.45	0.40	0.64	0.52	0.77
Maschi	0.57	0.74	0.59	0.85	0.70	0.81
Femmine	0.25	0.15	0.19	0.43	0.32	0.73
Nativi	0.40	0.36	0.35	0.53	0.51	0.66
Non nativi	0.53	1.03	0.69	1.41	0.53	1.58
Eraina	0.07	0.05	0.07	0.11	0.02	0.07
Cocaina	0.00	0.02	0.02	0.07	0.00	0.13

9 – Il sistema di allerta rapida su droghe/alcol

Nell'area metropolitana di Bologna nel 2018, rispetto all'anno precedente, aumenta il numero di decessi per overdose, che raddoppia. Continua invece il trend in diminuzione del numero di accessi ai PS per overdosenon letali. In aumento l'età media sia per i decessi (45.3 anni) che per gli accessi ai PS (40.2 anni). Tra i decessi, un terzo dei casi riguarda persone non residenti e poco meno della metà persone non conosciute al SERT.

Il sistema di allerta rapida*

	Decessi per overdose		Accessi ai PS per overdose	
	Numero	Età media	Numero	Età media
2012	16	36.9	113	36.3
2013	23	40.0	112	37.9
2014	13	39.0	98	38.0
2015	17	40.6	86	38.2
2016	17	40.7	85	37.9
2017	11	42.4	69	36.4
2018	20	45.3	50	40.2

* <https://allertarapidadroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

Pur con andamento altalenante, vi sono circa 2000 accessi ai PS dell'Area Metropolitana di Bologna per intossicazioni alcoliche acute ogni anno. L'età media è tra 41/42 anni, la classe di età compresa tra 40 e 49 anni è la più rappresentata. Femmine, non nativi e non residenti sono in calo. Il 60% degli accessi avviene di notte, la metà nel fine settimana. In un caso su 10 si osserva abuso concomitante di sostanze illegali.


Accessi al PS per intossicazione alcolica acuta*

	Numero	Età media	% Femmine	% Non nativi	% Non residenti
2012	1983	40.8	25.0	40.4	38.3
2013	2000	39.4	26.1	39.6	39.1
2014	2538	41.8	28.1	42.5	37.8
2015	1602	41.8	28.3	35.8	32.2
2016	1919	43.3	29.7	37.9	32.9
2017	1729	41.0	28.7	44.9	42.7
2018	1971	41.7	27.9	41.1	35.9

* <https://allertarapidadroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

10 – Il gioco d'azzardo problematico

Considerando i soggetti che si sono rivolti ai SERD, agli ospedali ed ai servizi della psichiatria, il numero dei nuovi casi di gioco problematico risulta in diminuzione a partire dal 2016.



Il numero di soggetti che si presentano ai SERD per la prima volta per problemi dovuti al gioco, in aumento costante dal 2009, è in diminuzione a partire dal 2016 (89 utenti nel 2018, 92 nel 2017, 103 nel 2016). Diminuisce anche il numero di persone prese in carico (200 utenti nel 2017, 186 nel 2018). In aumento l'età media (49.9 anni) e la percentuale di femmine (19%). In calo la quota di non nativi e quella di soggetti con scolarità medio alta.

Anno 2018 e precedenti: tabelle dei dati

- Tab. 1 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018
- Tab. 2 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018
- Tab. 3 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018
- Tab. 4 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018
- Tab. 5 Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018
- Tab. 6 Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018
- Tab. 7 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018
- Tab. 8 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018
- Tab. 9 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018
- Tab. 10 Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018
- Tab. 11 Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018
- Tab. 12 Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018
- Tab. 13 Consumo problematico di alcol. Caratteristiche utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018
- Tab. 14 Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018
- Tab. 15 Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018
- Tab. 16 Gioco problematico. Caratteristiche soggetti in carico al SERD. Periodo 2009-2018
- Tab. 17 Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2018.
- Tab. 18 Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2018.
- Tab. 19 Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2018
- Tab. 20 Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2018.

Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	3258	3255	3368	3348	3405	3461	3440	3636	3862	3771
% nuovi contatti	21.4	20.8	21.6	19.0	22.1	21.3	21.5	22.8	21.7	23.8
età media	40.8	40.6	40.0	39.6	39.3	38.1	37.9	38.1	37.7	37.0
% femmine	19.0	19.5	19.8	18.7	18.5	18.0	19.3	20.8	21.0	20.5
% non nativi	22.4	21.8	22.4	23.1	22.9	21.9	21.5	20.5	19.7	18.2
% residenti fuori area metropolitana	21.4	18.9	24.9	24.2	24.7	26.9	29.4	29.2	28.0	29.0
% senza fissa dimora (SFD)	5.7	5.7	5.3	5.2	5.7	4.9	3.8	3.4	5.8	5.5
% decesso overdose	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	0.2

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	64.0	65.3	67.5	71.7	74.4	71.5	75.5	74.3	72.9	75.3
% di cui eroina	61.0	62.0	63.9	68.6	69.0	68.3	72.2	71.8	70.7	71.7
% cocaina	41.3	39.0	32.7	31.6	29.4	26.6	23.9	21.7	23.8	30.3
% di cui solo cocaina**	22.3	21.0	18.1	16.4	15.0	14.7	12.6	11.7	11.8	11.6
% cannabinoidi	17.7	16.9	16.7	14.5	15.0	15.1	12.1	10.3	9.8	12.2
% di cui solo cannabinoidi***	7.8	6.9	6.1	6.1	6.4	6.9	5.6	4.6	3.7	3.5
% altre sostanze illegali	10.6	10.0	12.5	8.7	10.0	9.1	9.5	9.8	9.3	11.1
% di cui allucinogeni	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.2	0.5	0.6	0.2	0.5
% di cui amfetamine	0.8	0.7	0.9	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
% di cui crack	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.8	0.3	0.6
% di cui ecstasy	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
% di cui GHB	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui ketamina	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0
% di cui altra non indicata	9.3	8.8	11.3	7.5	9.1	8.1	10.5	9.5	8.2	9.0

% abuso concomitante di psicofarmaci****	3.2	4.3	5.0	3.4	4.1	3.0	4.0	5.9	6.7	6.3
% di cui benzodiazepine	1.7	2.8	2.3	1.6	1.6	1.6	2.2	2.8	2.6	2.5
% di cui antidepressivi	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.4	0.8	0.9	1.8	0.8
% di cui barbiturici	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3
% di cui psicofarmaci	1.4	1.9	2.5	1.5	2.1	1.1	2.5	3.5	3.5	2.7
% anche alcol	15.5	15.7	15.0	13.9	14.0	13.3	12.9	13.3	13.6	16.5
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	29.1	30.1	31.4	33.3	33.7	34.1	36.5	37.5	38.1	36.4

% Ricovero in Ospedale	8.9	8.5	7.5	7.5	8.3	5.4	6.3	7.3	8.4	5.7
% Accesso al Pronto soccorso	15.3	14.8	14.5	11.1	14.1	19.8	18.4	16.8	10.6	11.9
% Presa in carico al SERD	81.3	82.1	81.4	84.7	83.8	82.6	84.5	83.3	82.6	80.3
% di cui anche Carcere	13.9	14.9	15.6	18.2	18.7	18.0	20.1	19.0	16.9	13.8
% di cui anche Unità Mobile Metadone	4.7	4.5	4.4	5.1	5.3	3.8	4.1	4.0	5.1	4.6

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

** cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

*** cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

**** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 2 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	698	678	729	636	751	737	738	828	837	898
età media	34.4	35.3	34.8	34.8	35.3	32.2	33.9	35.5	35.7	35.0
% femmine	18.8	19.9	20.7	19.3	20.6	17.4	19.2	23.8	25.4	21.6
% non nativi	35.2	33.5	38.1	32.9	32.8	32.4	35.4	32.0	32.4	26.6
% residenti fuori area metropolitana	39.8	37.8	43.1	40.1	38.9	40.6	50.9	45.8	46.2	47.1
% senza fissa dimora (SFD)	4.7	3.2	4.9	5.0	6.1	3.3	3.4	2.1	6.5	4.9
% decesso overdose	1.3	0.7	0.7	1.3	1.2	0.7	0.9	0.4	0.2	0.3

Sostanze d'abuso (consumi multipli):

% oppioidi	27.7	28.3	35.3	38.2	47.0	33.6	44.0	45.8	46.0	54.3
% di cui eroina	22.1	22.9	26.6	33.6	31.8	26.2	36.4	34.8	41.1	46.9
% cocaina	46.8	45.3	37.3	37.9	31.7	28.2	24.7	21.4	19.0	29.8
% di cui solo cocaina**	35.4	34.1	27.4	27.0	22.1	21.6	18.8	17.0	14.3	14.7
% cannabinoidi	31.9	33.5	27.0	25.3	27.3	31.9	21.8	15.2	11.5	15.3
% di cui solo cannabinoidi***	20.6	19.8	13.7	15.6	16.6	20.5	15.0	11.5	8.0	5.7
% altre sostanze illegali	20.6	20.5	26.7	21.5	22.5	22.9	24.4	24.9	32.3	28.8
% di cui allucinogeni	0.6	0.4	0.1	0.8	0.4	0.7	0.5	0.8	0.0	0.4
% di cui amfetamine	1.1	1.2	1.2	1.6	1.2	1.1	0.5	0.8	0.7	0.9
% di cui crack	1.0	0.9	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
% di cui ecstasy	0.6	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
% di cui GHB	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui ketamina	0.4	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1	0.5	0.7
% di cui altra non indicata	18.5	18.4	24.8	18.7	20.6	20.5	22.8	22.9	30.9	26.4

% abuso concomitante di psicofarmaci**	5.2	6.6	5.8	5.8	7.7	3.9	4.9	7.5	16.8	8.8
% di cui benzodiazepine	2.6	3.8	1.6	1.9	0.8	1.4	2.0	0.0	4.5	1.9
% di cui antidepressivi	0.3	0.3	0.7	0.3	1.2	0.8	0.4	1.4	6.8	0.1
% di cui barbiturici	0.7	0.9	0.3	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
% di cui psicofarmaci	2.6	3.7	3.4	3.1	5.5	1.8	2.4	6.0	5.6	6.7

% anche alcol	16.8	18.1	15.4	16.4	17.3	16.4	18.7	15.6	9.0	17.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	6.7	6.9	5.6	8.8	10.0	6.4	13.3	11.8	12.5	11.5

% Ricovero in Ospedale	17.5	18.1	14.5	15.6	22.8	9.9	11.1	16.1	22.5	11.2
% Accesso al Pronto soccorso	35.4	36.6	34.8	27.7	30.9	47.2	41.6	32.7	23.3	29.1
% Presa in carico al SERD	49.1	50.4	51.2	58.2	49.1	45.2	50.1	54.3	55.7	51.1
% di cui anche Carcere	16.0	18.6	22.6	18.4	15.8	16.7	26.6	23.3	21.1	21.9
% di cui anche Unità Mobile Metadone	4.7	4.1	4.4	6.8	7.7	3.7	0.0	3.6	7.3	3.7

* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

** cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

*** cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

**** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 3 - Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	730	709	753	772	780	758	741	746	761	688
% nuovi contatti	33.7	32.0	36.9	27.1	31.5	31.5	35.2	35.5	35.6	34.7
età media	34.5	34.8	34.7	34.6	33.7	33.6	32.8	32.9	32.7	32.2
% femmine	12.2	12.3	13.0	9.7	8.2	8.2	7.8	11.5	11.6	10.6
% residenti fuori area metropolitana	49.9	47.7	55.1	58.2	59.0	60.4	65.3	66.5	60.1	62.1
% senza fissa dimora (SFD)	12.9	13.1	13.1	9.3	12.6	9.5	6.2	7.2	9.2	8.9
% decesso overdose	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.7	0.1	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	53.6	54.9	59.8	64.9	67.7	65.2	67.5	70.5	70.6	72.8
% di cui eroina	49.7	51.5	55.4	61.8	62.9	61.3	65.3	66.2	68.2	69.3
% cocaina	52.3	50.1	42.4	40.4	37.8	32.8	30.0	24.4	26.7	42.9
% di cui solo cocaina**	29.7	28.5	23.9	20.7	19.6	18.3	17.7	14.3	13.9	15.1
% cannabinoidi	25.9	23.3	22.3	18.4	22.2	20.7	15.9	10.7	9.7	16.0
% di cui solo cannabinoidi***	10.5	8.9	6.6	7.0	7.6	7.9	8.0	5.9	3.4	3.2
% altre sostanze illegali	11.5	12.0	12.4	9.2	9.9	9.8	9.3	9.0	9.9	11.9
% abuso concomitante di psicofarmaci****	2.6	3.8	3.6	3.5	4.0	2.6	3.1	5.1	4.5	5.8
% di cui benzodiazepine	1.0	2.3	1.6	1.8	2.2	1.3	1.9	2.0	1.4	2.3
% anche alcol	15.8	16.1	14.5	12.8	11.8	11.5	12.8	11.1	11.4	15.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	12.7	12.7	13.3	14.9	15.0	15.2	15.8	16.9	17.3	14.5

% Ricovero in Ospedale	8.4	5.9	4.8	6.0	5.5	4.6	4.6	5.2	5.7	3.8
% Accesso al Pronto soccorso	19.7	18.3	18.7	13.0	13.7	19.1	16.5	15.4	14.1	11.9
% Presa in carico al SERD	76.8	80.3	78.9	82.1	84.2	81.3	83.7	82.8	81.9	78.3
% di cui anche Carcere	36.2	39.5	41.6	47.7	51.9	50.1	57.1	52.5	48.5	50.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	13.4	13.1	13.4	14.4	15.4	10.6	10.4	11.4	13.8	11.8

Area provenienza	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
% Europa Est	26.0	23.1	21.9	20.9	18.6	17.2	17.5	18.4	19.2	18.9
% Altri paesi europei	8.8	9.3	8.9	9.5	9.9	12.0	10.5	12.1	13.4	13.8
% Africa Mediterranea	44.9	49.2	52.7	54.0	56.2	55.4	57.2	55.2	54.3	53.5
% Altra Africa	5.2	4.2	3.1	3.9	2.9	3.6	3.0	3.6	3.2	3.3
% Asia	8.4	8.7	7.7	6.1	6.0	6.1	6.7	5.4	5.1	5.5
% America Latina	6.3	5.4	5.3	4.3	4.7	3.7	3.5	4.0	3.8	4.1
% USA e Canada	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7
% Altro	0.0	0.0	0.1	1.4	1.4	1.6	1.1	0.8	0.7	0.1

Nazione	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
% Tunisia	18.4	21.3	26.0	26.9	29.5	27.2	27.1	24.3	22.1	20.3
% Marocco	21.6	22.6	21.8	20.6	20.1	20.8	22.4	21.6	22.1	21.1
% Romaniaa	5.5	4.5	5.0	4.7	4.7	3.7	4.5	4.2	3.7	2.8
% Algeria	4.7	4.8	4.4	6.3	6.4	7.3	7.7	9.1	10.0	12.1
% Albania	5.6	3.5	3.7	3.5	4.1	4.1	3.4	2.5	4.1	3.9

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

** cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

*** cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

**** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 4 - Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018– Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	43	42	47	25	26	21	20	21	15	18
% nuovi contatti	90.7	69.0	78.7	80.0	84.6	95.2	100.0	95.2	100.0	94.4
età media	16.3	16.3	15.2	16.1	16.3	16.0	15.8	16.4	16.1	16.2
% femmine	44.2	31.0	27.7	16.0	11.5	28.6	15.0	14.3	40.0	55.6
% non nativi	32.6	23.8	25.5	24.0	30.8	19.0	55.0	28.6	20.0	11.1
% residenti fuori area metropolitana	7.0	16.7	12.8	16.0	11.5	14.3	15.0	19.0	26.7	11.1
% senza fissa dimora (SFD)	2.3	2.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	16.3	16.7	17.0	16.0	11.5	14.3	5.0	9.5	20.0	22.2
% di cui eroina	11.6	14.3	17.0	16.0	7.7	4.8	5.0	9.5	13.3	22.2
% cocaina	20.9	9.5	21.3	12.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
% di cui solo cocaina**	18.6	7.1	21.3	8.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
% cannabinoidi	74.4	66.7	55.3	72.0	69.2	57.1	60.0	66.7	46.7	50.0
% di cui solo cannabinoidi***	53.5	61.9	38.3	60.0	57.7	52.4	60.0	66.7	40.0	38.9
% altre sostanze illegali	14.0	23.8	27.7	20.0	42.3	28.6	40.0	19.0	40.0	44.4
% abuso concomitante di psicofarmaci**	4.7	2.4	0.0	8.0	3.8	4.8	0.0	4.8	20.0	0.0
% di cui benzodiazepine	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0
% anche alcol	14.0	14.3	10.6	24.0	19.2	19.0	25.0	28.6	13.3	5.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	2.4	0.0	0.0	3.8	0.0	5.0	4.8	6.7	0.0

% Ricovero in Ospedale	18.6	11.9	8.5	8.0	19.2	23.8	0.0	4.8	13.3	16.7
% Accesso al Pronto soccorso	58.1	54.8	34.0	44.0	46.2	42.9	75.0	52.4	46.7	66.7
% Presa in carico al SERD	34.9	42.9	61.7	60.0	38.5	28.6	25.0	47.6	46.7	27.8
% di cui anche Carcere Minorile	7.0	7.1	10.6	-	-	-	-	-	-	-
% di cui anche Carcere	0.0	0.0	2.1	4.0	3.8	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

** cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

*** cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

**** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 5 - Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	193	192	257	243	353	248	325	379	385	488
età media	37.3	36.2	34.2	36.6	37.8	32.5	34.3	34.9	31.9	32.4
% femmine	19.7	26.6	20.6	20.2	23.5	16.5	20.6	21.6	16.6	19.5
% non nativi	39.4	36.5	45.5	38.3	34.0	40.7	38.8	37.2	41.0	29.9
% residenti fuori area metropolitana	51.3	40.6	52.1	51.0	46.2	57.3	65.2	58.8	63.1	57.6
% senza fissa dimora (SFD)	13.0	8.3	10.5	11.5	11.9	8.1	7.4	4.5	13.5	8.4
% decesso overdose	0.5	2.1	1.9	3.3	2.5	2.0	1.2	0.8	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% di cui solo oppioidi	58.5	55.2	72.0	71.6	72.2	80.2	86.8	90.5	89.9	72.1
% di cui eroina	79.8	80.7	75.5	88.1	67.7	77.8	83.4	76.0	89.4	85.7
% cocaina	41.5	39.6	28.0	28.4	20.4	19.8	13.2	9.5	10.1	27.9
% cannabinoidi	9.3	12.0	10.9	6.2	9.9	17.7	6.8	4.5	5.7	11.3
% altre sostanze illegali	5.7	2.6	1.6	2.5	7.9	2.0	2.5	3.2	0.5	5.1
% abuso concomitante di psicofarmaci****	4.7	6.3	7.0	7.8	10.2	4.4	4.9	2.9	4.7	9.2
% di cui benzodiazepine	1.6	2.1	3.1	2.9	0.0	2.8	1.5	0.0	0.3	1.8
% anche alcol	5.7	6.3	5.4	7.0	9.1	4.0	7.4	6.9	4.2	7.2
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	21.8	22.9	14.0	21.8	20.7	19.0	30.2	25.6	26.8	20.5

% Ricovero in Ospedale	16.1	14.6	12.5	8.2	23.2	12.5	5.8	7.9	5.5	4.9
% Accesso al Pronto soccorso	18.1	17.2	15.2	12.8	21.0	19.0	21.8	21.6	11.7	16.0
% Presa in carico al SERD	73.6	77.1	73.2	80.7	60.6	73.4	76.9	77.0	83.9	68.9
% di cui anche Carcere	25.4	24.5	33.1	23.0	19.0	27.8	40.3	31.1	31.9	27.9
% di cui anche Unità Mobile Metadone	14.5	12.5	11.3	17.3	16.4	10.9	9.2	7.9	15.6	6.8

*soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

** cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

*** cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

**** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 6 - Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti (1). Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*	327	307	272	241	238	208	182	177	159	268
età media	34.0	33.9	33.8	34.3	33.5	34.4	33.1	34.3	34.7	32.2
% femmine	11.9	14.0	13.6	12.0	13.0	7.2	9.3	12.4	11.9	11.9
% non nativi	39.8	39.1	47.8	35.7	36.1	34.6	37.9	31.6	29.6	32.8
% residenti fuori area metropolitana	43.4	43.6	52.6	46.1	45.4	42.3	53.3	42.4	45.9	61.6
% senza fissa dimora (SFD)	6.7	4.2	6.3	4.6	9.7	5.3	4.4	2.3	4.4	8.2
% decesso overdose	0.0	0.7	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% di cui solo cocaina**	75.5	75.2	73.5	71.4	69.7	76.4	76.4	79.7	75.5	49.3
% oppioidi	24.5	24.8	26.5	28.6	30.3	23.6	23.6	20.3	24.5	50.7
% cannabinoidi	19.3	23.8	26.5	20.3	20.2	20.2	15.4	8.5	4.4	13.4
% altre sostanze illegali	4.3	8.1	3.7	4.1	12.6	3.4	2.2	2.8	0.0	2.6
% abuso concomitante di psicofarmaci****	3.4	3.3	2.2	4.1	3.4	3.4	2.2	1.1	5.7	8.2
% di cui benzodiazepine	2.4	2.0	0.7	1.2	1.3	1.0	1.6	0.0	0.6	0.7
% anche alcol	17.7	15.0	13.6	17.0	18.1	17.8	13.2	11.3	15.7	15.7
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	8.9	8.5	7.7	10.0	11.3	10.1	11.5	7.3	9.4	10.1

% Ricovero in Ospedale	8.6	13.0	7.7	7.1	10.5	5.8	4.4	10.7	6.3	4.5
% Accesso al Pronto soccorso	24.2	28.0	22.1	19.5	27.3	31.3	30.8	27.7	18.9	9.7
% Presa in carico al SERD	69.4	67.8	72.4	78.8	69.7	63.9	65.4	66.1	69.2	70.9
% di cui anche Carcere	28.1	31.9	40.4	35.3	25.6	30.8	40.7	33.3	30.8	40.7
% di cui anche Unità Mobile Metadone	7.0	4.9	5.1	6.2	10.5	5.3	4.4	4.0	2.5	4.5

* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e che non si sono mai rivolti ai servizi sanitari in precedenza

** cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

*** cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

**** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 8 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	498	482	490	371	480	685	632	610	408	449
% nuovi contatti	49.6	51.5	51.8	47.4	48.3	50.8	48.6	44.4	47.8	58.1
età media	37.1	37.7	37.9	36.6	37.0	36.1	37.0	38.9	36.5	38.8
% femmine	19.9	21.0	25.7	22.4	22.5	22.2	22.3	25.4	23.5	25.8
% non nativi	28.9	27.0	28.8	27.0	22.3	21.2	19.3	18.9	26.2	18.3
% residenti fuori area metropolitana	30.1	29.7	26.9	28.6	27.5	26.4	32.4	26.4	29.9	26.7
% senza fissa dimora (SFD)	4.0	4.8	2.9	3.0	4.8	5.1	3.8	3.6	6.9	4.9
% decesso overdose	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.2	0.2

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	34.1	29.3	28.2	36.1	55.8	41.0	50.8	52.5	45.3	49.4
% di cui eroina	28.3	23.4	20.8	29.1	44.6	34.2	45.7	39.2	35.3	34.1
% cocaina	39.0	39.2	30.8	36.4	31.7	25.4	23.3	21.6	21.8	20.0
% di cui solo cocaina**	24.3	25.9	20.4	23.2	15.4	15.3	12.8	11.3	9.8	6.0
% cannabinoidi	28.1	26.1	18.2	18.3	21.5	20.3	14.2	11.1	10.3	7.3
% di cui solo cannabinoidi***	20.5	17.8	10.4	14.3	14.6	12.7	10.6	6.7	6.4	4.5
% altre sostanze illegali	39.6	40.5	57.1	38.3	46.9	37.5	37.0	32.5	30.6	56.8
% abuso concomitante di psicofarmaci****	13.3	14.5	14.7	15.1	12.7	10.1	12.5	20.0	14.5	22.3
% di cui benzodiazepine	6.2	8.3	5.9	4.0	4.2	3.9	6.2	7.5	6.9	8.2
% anche alcol	35.1	39.8	37.6	36.7	35.6	30.5	35.4	38.2	33.1	34.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	13.1	12.2	10.4	17.0	26.3	20.3	25.2	23.1	22.3	20.7

% anche ricovero in Ospedale	13.9	14.9	9.0	10.5	11.3	9.6	10.8	9.3	13.7	14.0
% anche presa in carico al SERD	29.9	27.4	23.7	31.0	42.3	35.3	38.8	37.9	35.0	31.2
% di cui anche Carcere	2.2	4.4	4.3	3.8	5.8	3.6	4.4	4.4	6.9	2.2
% di cui anche Unità Mobile Metadone	3.4	3.9	2.0	2.4	4.4	3.5	3.5	3.1	3.7	3.6

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

** cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

*** cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

**** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 9 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	291	277	254	250	283	187	215	265	326	214
% nuovi contatti	41.9	44.4	41.7	39.6	60.4	39.0	38.1	50.2	57.7	47.2
età media	41.2	42.5	42.3	43.1	43.4	37.8	42.0	44.6	47.3	42.0
% femmine	31.6	33.6	28.7	31.2	27.6	20.3	34.0	44.5	47.9	44.4
% non nativi	21.0	15.2	14.2	18.4	15.2	18.7	15.8	14.7	13.2	12.1
% residenti fuori area metropolitana	14.4	12.3	14.2	14.0	9.9	14.4	15.3	17.7	16.6	16.4
% senza fissa dimora (SFD)	3.1	4.7	1.2	3.2	2.8	3.2	4.7	1.1	2.1	3.7
% decesso overdose	0.7	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% oppioidi	41.6	40.8	43.3	38.4	53.7	56.1	56.7	41.1	30.4	46.7
% di cui eroina	28.9	27.1	26.4	18.4	22.3	36.9	46.0	30.2	22.1	32.2
% cocaina	38.1	44.8	33.9	28.0	22.3	31.0	20.9	19.2	14.1	21.0
% di cui solo cocaina**	21.3	25.6	20.1	17.2	11.7	13.9	8.4	9.1	6.7	7.9
% cannabinoidi	28.5	21.7	24.4	22.0	18.0	30.5	16.3	10.2	8.3	12.1
% di cui solo cannabinoidi***	15.5	11.9	11.4	13.2	13.1	18.7	10.2	5.7	4.6	7.9
% altre sostanze illegali	49.8	48.4	53.1	54.0	42.8	35.3	47.0	54.3	58.3	60.3
% abuso concomitante di psicofarmaci****	12.4	14.1	16.1	14.8	20.8	14.4	21.4	25.3	50.6	28.5
% di cui benzodiazepine	5.2	4.3	5.5	3.6	3.9	6.4	8.4	6.0	15.3	7.9
% anche alcol	28.5	33.2	25.2	28.8	26.5	27.8	32.6	24.9	18.4	26.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	16.8	17.7	20.9	12.0	14.8	25.7	23.3	20.4	15.3	22.0

% anche accesso al Pronto soccorso	23.7	26.0	17.3	15.6	19.1	35.3	31.6	21.5	17.2	29.4
% anche presa in carico al SERD	42.6	38.6	36.6	27.2	26.1	41.7	47.0	32.1	25.5	38.3
% di cui anche Carcere	2.7	3.6	3.9	1.6	2.5	1.1	5.6	3.0	4.9	0.5
% di cui anche Unità Mobile Metadone	2.1	2.9	1.2	1.6	1.4	1.6	4.7	1.9	0.6	0.9

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

** cocaina ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi

*** cannabinoidi ed eventualmente altre sostanze, escluso oppioidi ed escluso cocaina

**** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 10 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	2682	2609	2579	2639	3158	2823	2784	2633	2906	2857
% nuovi contatti	40.4	40.0	39.3	40.1	53.2	45.6	46.1	46.1	32.1	37.0
età media	49.6	49.1	49.0	48.8	47.9	47.1	47.9	47.6	46.7	46.0
% femmine	26.2	26.0	26.9	25.2	26.5	25.1	25.3	24.2	24.9	24.4
% non nativi	25.3	25.6	23.9	23.9	25.6	25.2	25.1	22.9	20.7	19.7
% residenti fuori area metropolitana	17.0	15.8	15.5	15.5	19.9	17.5	19.1	18.8	16.4	18.6
% senza fissa dimora (SFD)	2.5	2.6	2.2	2.2	2.4	2.6	1.7	1.7	4.3	3.9
% decesso overdose	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	18.9	19.5	19.6	17.6	15.1	16.3	15.9	18.4	27.1	28.8
% di cui oppioidi	7.0	6.7	7.3	7.7	7.3	7.0	7.8	8.7	7.6	10.4
% di cui cocaina	7.8	7.6	7.3	6.7	5.1	4.8	3.9	4.1	5.4	7.6
% di cui cannabinoidi	3.5	3.2	3.5	2.7	2.6	2.6	2.5	1.8	1.5	2.1
% di cui altre sostanze illegali	4.4	4.3	5.6	2.9	3.6	4.0	4.2	3.8	2.1	4.6

% abuso concomitante di psicofarmaci**	4.7	4.7	2.0	6.7	4.9	3.8	5.0	3.3	3.1	5.6
% Ricovero in Ospedale	21.5	23.0	23.7	23.0	23.3	22.6	23.5	24.5	23.3	21.5
% Accesso al Pronto soccorso	50.5	46.8	46.4	44.0	53.1	52.8	54.6	47.8	27.4	30.0
% Presa in carico al SERD	45.3	45.4	45.3	47.3	38.5	42.6	40.0	43.1	42.9	42.6
% di cui anche Carcere	2.5	3.1	3.2	3.9	2.3	2.1	1.5	2.3	1.3	0.5
% di cui anche Unità Mobile Metadone	1.2	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.4	1.2

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 11 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	678	669	617	630	809	710	699	603	602	562
% nuovi contatti	53.4	49.8	52.7	48.6	53.2	45.6	46.1	46.1	32.1	37.0
età media	41.4	40.6	39.8	40.5	39.6	39.4	39.3	39.2	38.2	38.5
% femmine	25.8	26.9	27.2	27.9	26.5	26.8	26.9	25.7	23.8	24.9
% residenti fuori area metropolitana	36.6	34.7	33.5	35.4	38.1	33.8	37.5	39.1	35.4	39.0
% senza fissa dimora (SFD)	3.8	3.4	4.2	3.3	3.5	4.5	3.1	3.8	6.5	4.8
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	17.0	17.0	17.7	15.7	11.4	12.3	13.6	13.8	15.9	20.6
% di cui oppioidi	4.1	4.3	4.4	4.9	3.8	3.7	4.6	5.5	11.8	14.8
% di cui cocaina	7.4	7.2	7.0	6.7	4.2	3.1	3.0	2.5	5.3	10.1
% di cui cannabinoidi	4.3	3.6	3.7	3.0	3.1	3.7	3.6	1.7	1.0	2.7
% di cui altre sostanze illegali	4.6	4.9	5.7	2.5	3.2	3.7	4.4	4.0	4.2	6.8
% abuso concomitante di psicofarmaci**	3.1	4.6	4.5	5.6	4.2	3.5	4.1	2.5	2.3	7.3
% Ricovero in Ospedale	17.6	17.9	18.6	17.3	16.8	13.8	15.2	16.4	15.9	14.2
% Accesso al Pronto soccorso	62.5	60.8	61.4	56.0	67.9	69.2	71.7	64.8	52.2	48.2
% Presa in carico al SERD	38.1	36.5	34.4	38.4	28.4	31.5	26.9	30.0	40.9	40.7
% di cui anche Carcere	5.9	7.0	8.1	8.9	4.9	4.5	2.9	4.0	8.3	8.2
% di cui anche Unità Mobile Metadone	2.9	2.1	1.9	2.2	1.9	2.1	1.7	2.2	3.2	4.3
Area provenienza										
% Europa Est	44.0	45.7	45.4	43.2	45.4	40.6	39.5	38.6	34.9	33.8
% Altri paesi europei	8.6	7.9	6.2	8.1	7.0	8.2	9.0	8.3	12.0	12.3
% Africa Mediterranea	21.8	22.3	27.1	25.6	26.0	25.8	24.6	25.4	30.4	27.4
% Altra Africa	8.1	6.4	6.2	7.0	5.8	5.9	6.7	8.8	7.1	8.4
% Asia	9.3	9.0	8.3	10.8	9.8	8.3	11.0	9.5	8.6	9.6
% America Latina	7.2	7.6	5.7	4.6	4.9	4.8	6.6	5.8	6.0	6.2
% USA e Canada	0.9	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.4	0.7	0.8	2.0
% Altro	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	5.5	2.1	3.0	0.2	0.4
Nazione										
% Marocco	17.4	14.9	19.4	18.4	18.9	19.0	18.6	18.7	20.8	17.8
% Romaniaa	14.3	17.0	17.8	16.5	20.8	16.6	16.6	13.4	12.3	11.9
% Polonia	7.4	5.8	6.0	7.1	6.4	5.9	7.6	7.5	6.8	7.5
% Ucraina	5.9	5.8	5.5	4.6	3.8	4.4	3.6	4.1	5.1	3.2
% Moldavia	5.0	4.9	4.9	4.4	4.6	3.1	3.7	2.7	2.2	2.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.
** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 12 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	29	33	24	51	44	40	26	37	34	19
% nuovi contatti	96.6	100.0	91.7	96.1	100.0	97.5	100.0	100.0	97.1	100.0
età media	16.0	15.7	16.0	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
% femmine	44.8	45.5	41.7	35.3	38.6	35.0	42.3	29.7	35.3	21.1
% non nativi	13.8	21.2	12.5	25.5	9.1	20.0	19.2	16.2	29.4	21.1
% residenti fuori area metropolitana	0.0	15.2	8.3	11.8	11.4	12.5	3.8	13.5	8.8	26.3
Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	20.7	18.2	20.8	11.8	11.4	10.0	19.2	16.2	2.9	5.3
% di cui oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0
% di cui cocaina	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui cannabinoidi	13.8	18.2	8.3	3.9	6.8	5.0	7.7	13.5	0.0	5.3
% di cui altre sostanze illegali	6.9	0.0	12.5	7.8	9.1	5.0	11.5	2.7	2.9	0.0
% abuso concomitante di psicofarmaci**	10.3	3.0	0.0	3.9	11.4	0.0	3.8	2.7	5.9	0.0
% Ricovero in Ospedale	3.4	9.1	12.5	5.9	4.5	10.0	11.5	5.4	17.6	15.8
% Accesso al Pronto soccorso	96.6	90.9	91.7	94.1	97.7	95.0	92.3	91.9	82.4	84.2
% Presa in carico al SERD	0.0	0.0	8.3	2.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	0.0
% di cui anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
% di cui anche Carcere	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.
** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 13 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche utenti in carico al SERD. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1215	1184	1167	1249	1216	1204	1114	1135	1246	1216
% mai stato in precedenza al SERD	29.4	18.9	17.9	21.1	21.0	22.2	20.3	18.4	16.9	18.3
età media	49.1	48.8	48.8	48.3	48.2	47.8	48.2	47.9	48.0	47.7
% femmine	27.3	27.4	28.9	25.7	27.1	26.6	25.5	25.2	26.2	26.9
% non nativi	21.2	20.6	18.2	19.4	18.9	18.6	16.9	15.9	14.9	13.9
% residenti fuori area metropolitana	7.8	7.5	9.1	8.4	7.7	9.1	9.7	9.7	8.9	8.5
% senza fissa dimora (SFD)	4.9	5.3	4.5	4.5	5.4	5.2	3.9	3.4	3.2	2.6
% decesso overdose	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
% alcol sostanza abuso secondaria	14.7	16.0	14.4	15.9	15.0	15.3	15.4	16.4	14.0	10.0
Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	27.3	27.3	26.6	25.5	24.5	24.8	22.9	26.1	20.8	22.5
% di cui eroina	9.5	9.0	9.4	10.9	10.8	11.6	12.5	13.0	10.9	11.9
% di cui cocaina	10.6	10.0	10.7	9.4	8.3	7.3	5.7	6.0	6.8	7.1
% di cui cannabinoidi	3.0	2.9	3.3	3.1	2.6	3.0	2.5	1.9	2.1	2.4
% di cui GHB	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
% di cui crack	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% di cui amfetamine	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
% di cui ketamina	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
% benzodiazepine	1.2	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	0.9
% codeina	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
% Ricovero in Ospedale	10.0	10.1	9.9	10.2	11.2	11.6	11.3	9.9	9.6	10.9
% Accesso al Pronto Soccorso	17.0	13.2	13.6	12.4	15.0	15.5	15.7	13.5	7.2	8.4
% anche Carcere	5.5	6.6	6.3	7.8	5.1	4.0	3.3	4.5	4.2	2.2
% anche Unità Mobile Metadone	2.1	1.4	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	1.6	0.2	0.7

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.
 ** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 14 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1355	1220	1196	1162	1678	1490	1520	1259	796	858
% nuovi contatti	55.5	54.9	56.0	58.5	69.2	62.0	65.5	65.5	65.6	71.2
età media	47.7	46.5	46.2	46.1	45.1	43.9	45.3	43.7	42.4	42.3
% femmine	24.9	25.2	27.0	26.1	27.1	26.4	24.9	24.7	27.9	24.2
% non nativi	31.3	33.4	31.7	30.4	32.7	33.0	36.1	31.1	39.4	31.6
% residenti fuori area metropolitana	26.0	24.2	22.0	24.2	30.0	25.1	30.0	28.8	28.0	30.5
% senza fissa dimora (SFD)	1.5	1.2	0.8	1.0	1.4	2.1	1.2	1.0	3.5	1.2
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	14.5	16.4	17.9	12.4	11.3	14.0	13.1	18.5	6.4	9.3
% di cui oppioidi	4.6	4.0	5.2	4.5	4.5	4.8	4.8	7.5	4.1	5.8
% di cui cocaina	5.2	5.1	4.9	5.1	3.5	3.5	3.0	3.2	2.8	3.8
% di cui cannabinoidi	3.6	3.4	3.8	2.2	2.7	2.3	2.4	1.9	1.1	1.3
% di cui altre sostanze illegali	6.1	6.4	9.9	4.0	5.8	6.6	6.4	6.6	4.4	11.4
% abuso concomitante di psicofarmaci**	7.6	7.9	8.1	12.4	7.4	5.5	6.3	5.6	4.5	11.5
% Ricovero in Ospedale	15.7	14.7	14.7	13.7	13.1	14.7	14.7	15.3	16.0	19.2
% Presa in carico al SERD	15.3	12.8	13.3	13.3	10.9	14.9	11.5	10.5	11.3	11.9
% di cui anche Carcere	0.5	0.6	1.0	1.4	1.2	0.8	0.5	1.0	0.5	0.3
% di cui anche Unità Mobile Metadone	0.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.6	0.1	0.3

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.
 ** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 15 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2018 – Valori percentuali

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	577	600	611	608	736	637	654	644	676	614
% nuovi contatti	39.5	47.2	40.9	43.4	58.6	41.8	42.4	50.3	46.0	55.5
età media	56.3	56.4	56.7	57.0	55.6	55.6	55.7	56.7	56.1	55.5
% femmine	28.6	27.3	25.5	22.0	24.2	23.1	24.2	22.8	22.9	24.3
% non nativi	20.6	20.0	18.8	17.9	18.5	15.4	16.2	15.4	14.2	13.0
% residenti fuori area metropolitana	8.1	8.7	8.8	8.4	9.0	10.5	12.1	10.2	8.6	11.7
% senza fissa dimora (SFD)	2.8	1.2	1.3	2.1	2.2	2.0	1.7	1.1	2.2	1.6
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2

Sostanze d'abuso (consumi multipli):										
% abuso concomitante di sostanze illegali	16.3	17.5	14.4	13.3	12.0	10.5	10.7	11.8	6.2	9.8
% di cui oppioidi	6.2	6.7	5.1	5.6	8.0	3.8	5.4	5.3	4.4	7.2
% di cui cocaina	5.4	5.8	4.7	3.8	3.7	3.1	2.9	2.5	2.4	4.1
% di cui cannabinoidi	4.0	3.8	3.4	2.1	1.9	2.0	1.8	0.6	1.2	1.5
% di cui altre sostanze illegali	7.1	6.5	5.9	5.8	4.6	4.6	4.0	4.2	3.0	7.0
% abuso concomitante di psicofarmaci**	7.3	7.2	6.9	6.1	6.3	6.0	7.2	3.4	5.0	7.5
% Accesso al Pronto soccorso	36.9	29.8	28.8	26.2	29.9	34.4	34.1	30.0	18.8	26.9
% Presa in carico al SERD	21.0	20.0	18.8	21.1	18.5	22.0	19.3	17.4	17.6	21.5
% di cui anche Carcere	0.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3
% di cui anche Unità Mobile Metadone	1.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.5

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e psicofarmaci

Tab. 16 - Gioco problematico*. Caratteristiche soggetti in carico al SERD. Periodo 2009-2018

		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale*		186	200	183	171	145	84	55	36	38	32
sesto	% femmine	19.4	18.5	19.7	18.7	59.0	26.2	20.0	19.4	10.5	18.8
nuovo/già in carico	% nuovi accessi	49.5	45.0	40.4	50.3	55.9	66.7	54.5	41.7	21.1	46.9
età media	all'ingresso	49.9	46.3	49.5	45.1	48.5	49.2	45.7	46.1	46.9	47.5
nazionalità	% non nativi	8.6	10.0	8.7	11.1	11.7	11.9	7.3	8.3	7.9	6.3
residenza	% fuori area metropolitana	5.4	5.0	6.0	5.8	9.0	8.3	5.5	5.6	5.3	3.1
stato civile	% celibe/nubile	42.5	39.5	45.9	42.7	35.9	40.5	50.9	30.6	23.7	28.1
	% coniugato	30.6	33.5	33.9	32.7	35.2	38.1	34.5	55.6	60.5	53.1
	% separato/divorziato/vedovo	25.8	25.5	19.1	12.3	12.4	21.4	12.7	13.9	15.8	18.8
titolo di studio	% elementari	8.6	5.5	5.5	8.8	13.1	16.7	7.3	11.1	15.8	12.5
	% media inferiore	37.1	37.5	38.8	42.7	40.0	32.1	29.1	27.8	36.8	31.3
	% qualifica professionale	10.8	11.0	14.2	10.5	8.3	9.5	14.5	5.6	7.9	9.4
	% media superiore	30.6	32.5	27.9	28.7	28.3	34.5	29.1	36.1	31.6	34.4
	% livello universitario	7.0	8.0	5.0	5.3	6.2	6.0	3.6	11.1	7.9	6.3
	% sconosciuto	5.4	5.5	6.6	4.0	4.1	1.2	16.4	8.3	0.0	6.3
condizione lavorativa	% disoccupato/in cerca di occupazione	21.1	16.0	16.4	16.4	11.7	13.1	12.0	11.1	13.2	12.5
	% lavori precari/occupato regolarmente	60.2	63.0	59.0	56.7	55.9	60.7	54.5	66.7	63.2	56.3
	% pensione	21.5	15.0	18.8	12.3	24.1	22.6	20.0	13.9	23.7	25.0
	% studente	1.6	2.0	1.6	1.8	0.7	1.2	3.6	2.8	0.0	0.0
presa in carico	durata media in mesi	16.1	24.0	14.5	13.2	9.5	9.4	21.0	20.0	35.0	39.4
esito programma	% completato	2.7	9.0	5.5	3.5	3.4	0.0	1.8	19.4	28.9	28.1
	% dimissione concordata	3.2	4.5	7.1	4.7	6.9	3.6	3.6	5.6	7.9	12.5
	% passaggio altra struttura	0.5	0.0	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	8.3	7.9	3.1
	% abbandono	4.8	8.5	7.7	5.8	5.5	1.2	3.6	8.3	7.9	6.3
	% chiusura d'ufficio	18.8	12.0	18.6	22.8	20.7	31.0	9.1	19.4	26.3	25.0
	% decesso	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
	% in corso	69.4	65.5	61.2	62.0	62.1	64.3	80.0	36.1	18.4	21.9
altre dipendenze	% altre dipendenze	3.3	5.0	6.6	3.0	7.0	10.7	25.5	30.6	26.3	25.0
	Di cui % alcol	2.2	3.5	3.8	1.8	2.8	4.8	14.5	25.0	18.4	18.8
	Di cui % cocaina	1.1	1.0	1.1	0.6	1.4	1.2	7.3	5.6	2.6	0.0
	Di cui % eroina	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.6	3.1

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico

Tab. 17 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per Distretto e per comune di residenza. Anno 2018.

	Alcol			Illegali			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto di Casalecchio	5.53	1.57	3.53	5.77	1.60	3.67	0.33	0.00	0.16
CASALECCHIO DI RENO	4.23	1.72	2.94	5.48	1.54	3.45	0.48	0.00	0.23
MONTE SAN PIETRO	2.99	1.16	2.07	2.40	1.45	1.92	0.00	0.00	0.00
SASSO MARCONI	5.12	1.87	3.50	7.92	0.93	4.43	0.00	0.00	0.00
VALSAMOGGIA	7.29	1.30	4.33	5.92	2.16	4.06	0.42	0.00	0.21
ZOLA PREDOSA	6.81	1.75	4.25	6.45	1.40	3.90	0.36	0.00	0.18
Distretto Pianura Ovest	5.54	1.72	3.63	6.70	1.44	4.07	0.28	0.04	0.16
ANZOLA DELL'EMILIA	4.65	2.49	3.58	8.21	1.11	4.68	0.00	0.00	0.00
CALDERARA DI RENO	7.23	1.47	4.32	7.73	1.22	4.45	0.00	0.00	0.00
CREVALCORE	4.90	1.23	3.07	6.86	0.25	3.56	0.98	0.00	0.49
SALA BOLOGNESE	7.06	0.77	3.89	4.71	0.39	2.53	0.78	0.39	0.58
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	4.74	2.01	3.37	5.69	2.25	3.96	0.00	0.00	0.00
SANT'AGATA BOLOGNESE	6.39	1.83	4.19	8.09	2.75	5.52	0.43	0.00	0.22
Distretto Pianura Est	5.02	2.15	3.57	6.95	1.51	4.21	0.19	0.04	0.11
ARGELATO	5.39	1.01	3.20	8.08	1.34	4.71	0.34	0.00	0.17
BARICELLA	3.22	4.63	3.92	8.28	1.39	4.85	0.00	0.00	0.00
BENTIVOGLIO	4.20	2.37	3.28	5.40	0.59	2.98	0.00	0.00	0.00
BUDRIO	4.91	2.15	3.52	6.54	1.26	3.88	0.18	0.00	0.09
CASTELLO D'ARGILE	5.70	1.00	3.40	6.18	1.00	3.65	0.00	0.00	0.00
CASTEL MAGGIORE	4.64	2.63	3.60	3.34	2.10	2.70	0.37	0.00	0.18
CASTENASO	3.88	1.51	2.66	7.54	0.65	4.00	0.23	0.00	0.11
GALLIERA	5.30	1.20	3.26	10.01	0.60	5.34	0.00	0.00	0.00
GRANAROLO EMILIA	5.12	2.11	3.60	8.08	1.32	4.66	0.00	0.26	0.13
MALALBERGO	4.34	1.81	3.08	5.43	1.81	3.62	0.00	0.00	0.00
MINERBIO	6.66	2.22	4.44	7.77	2.95	5.36	0.74	0.00	0.37
MOLINELLA	5.15	2.34	3.74	8.79	2.13	5.45	0.21	0.21	0.21
PIEVE DI CENTO	5.88	1.94	3.90	6.37	1.94	4.14	0.00	0.00	0.00
SAN GIORGIO DI PIANO	5.37	2.61	3.97	6.13	1.86	3.97	0.38	0.00	0.19
SAN PIETRO IN CASALE	5.96	2.37	4.18	8.03	1.05	4.57	0.00	0.00	0.00
Distretto di S. Lazzaro	3.70	1.37	2.52	7.04	1.63	4.30	0.22	0.00	0.11
LOIANO	7.43	0.00	3.84	9.67	3.18	6.54	0.00	0.00	0.00
MONGHIDORO	7.03	1.89	4.56	10.54	1.89	6.38	0.00	0.00	0.00
MONTERENZIO	2.58	2.59	2.59	7.75	2.59	5.18	0.52	0.00	0.26
OZZANO DELL'EMILIA	4.11	0.95	2.51	7.74	0.71	4.18	0.24	0.00	0.12
PIANORO	3.18	2.13	2.65	7.75	2.13	4.90	0.20	0.00	0.10
SAN LAZZARO DI SAVENA	3.06	1.03	2.02	5.36	1.34	3.29	0.22	0.00	0.11
Distretto di Porretta	5.87	1.73	3.84	5.34	1.17	3.30	0.24	0.00	0.12
ALTO RENO TERME	6.98	0.49	3.72	2.49	0.98	1.73	0.00	0.00	0.00
CAMUGNANO	1.86	3.88	2.85	1.86	1.94	1.90	0.00	0.00	0.00
CASTEL D'AIANO	8.98	0.00	4.64	3.59	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
CASTEL DI CASIO	5.80	0.00	2.97	1.93	1.02	1.49	0.97	0.00	0.50
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	5.99	1.27	3.70	4.19	1.27	2.78	0.00	0.00	0.00
GAGGIO MONTANO	8.96	2.09	5.54	4.82	0.70	2.77	0.00	0.00	0.00
GRIZZANA MORANDI	5.67	0.90	3.41	8.91	0.90	5.11	0.00	0.00	0.00
LIZZANO IN BELVEDERE	3.08	0.00	1.56	1.54	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
MARZABOTTO	7.52	3.41	5.50	10.33	2.92	6.70	0.47	0.00	0.24
MONZUNO	2.97	2.65	2.81	4.45	0.53	2.56	0.49	0.00	0.26
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	3.75	0.84	2.38	3.75	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
VERGATO	6.26	2.66	4.45	8.04	1.78	4.90	0.45	0.00	0.22
Distretto Bologna città	4.78	1.77	3.24	8.68	2.32	5.43	0.14	0.04	0.09
BOLOGNA	4.78	1.77	3.24	8.68	2.32	5.43	0.14	0.04	0.09
Area metropolitana	4.56	1.64	3.09	6.84	1.73	4.26	0.18	0.03	0.10

Tab. 18 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per Distretto e per comune di residenza. Anno 2018.

	Alcol			Illegali			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto di Casalecchio	2.09	0.59	1.33	1.24	0.42	0.82	0.24	0.00	0.12
CASALECCHIO DI RENO	0.96	0.72	0.84	1.06	0.09	0.56	0.29	0.00	0.14
MONTE SAN PIETRO	0.60	0.00	0.30	0.60	0.58	0.59	0.00	0.00	0.00
SASSO MARCONI	3.03	0.70	1.87	2.33	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
VALSAMOGGIA	3.49	0.76	2.14	1.48	0.97	1.23	0.42	0.00	0.21
ZOLA PREDOSA	1.97	0.35	1.15	0.72	0.35	0.53	0.18	0.00	0.09
Distretto Pianura Ovest	1.40	0.68	1.04	1.08	0.24	0.66	0.12	0.04	0.08
ANZOLA DELL'EMILIA	1.09	1.11	1.10	1.09	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
CALDERARA DI RENO	1.50	0.24	0.86	2.24	0.24	1.24	0.00	0.00	0.00
CREVALCORE	1.47	0.25	0.86	0.24	0.00	0.12	0.24	0.00	0.12
SALA BOLOGNESE	2.35	0.00	1.17	1.18	0.00	0.58	0.39	0.39	0.39
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	0.71	1.06	0.89	0.71	0.47	0.59	0.00	0.00	0.00
SANT'AGATA BOLOGNESE	2.98	0.92	1.99	1.70	0.46	1.10	0.43	0.00	0.22
Distretto Pianura Est	1.89	0.78	1.33	1.31	0.27	0.78	0.12	0.02	0.07
ARGELATO	2.02	0.34	1.18	2.02	0.00	1.01	0.34	0.00	0.17
BARICELLA	0.92	1.85	1.39	0.00	0.46	0.23	0.00	0.00	0.00
BENTIVOGLIO	1.20	1.18	1.19	1.20	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
BUDRIO	2.54	0.72	1.62	1.82	0.36	1.08	0.18	0.00	0.09
CASTELLO D'ARGILE	3.33	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASTEL MAGGIORE	1.86	1.05	1.44	0.19	0.53	0.36	0.19	0.00	0.09
CASTENASO	1.83	0.43	1.11	0.91	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
GALLIERA	1.18	0.60	0.89	1.18	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
GRANAROLO EMILIA	2.69	0.79	1.73	2.42	0.26	1.33	0.00	0.00	0.00
MALALBERGO	1.81	1.09	1.45	2.17	0.72	1.45	0.00	0.00	0.00
MINERBIO	2.22	0.74	1.48	1.85	0.37	1.11	0.74	0.00	0.37
MOLINELLA	1.29	0.85	1.07	1.72	0.21	0.96	0.21	0.21	0.21
PIEVE DI CENTO	0.98	0.00	0.49	0.98	0.49	0.73	0.00	0.00	0.00
SAN GIORGIO DI PIANO	2.30	0.37	1.32	2.30	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
SAN PIETRO IN CASALE	1.30	1.32	1.31	0.52	0.26	0.39	0.00	0.00	0.00
Distretto di S. Lazzaro	1.06	0.56	0.80	0.92	0.26	0.59	0.13	0.00	0.07
LOIANO	3.72	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONGHIDORO	0.88	1.89	1.37	0.88	0.95	0.91	0.00	0.00	0.00
MONTERENZIO	1.03	1.56	1.29	1.03	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
OZZANO DELL'EMILIA	1.45	0.24	0.84	1.21	0.24	0.72	0.24	0.00	0.12
PIANORO	0.99	0.39	0.69	0.60	0.19	0.39	0.20	0.00	0.10
SAN LAZZARO DI SAVENA	0.55	0.52	0.53	1.09	0.31	0.69	0.11	0.00	0.05
Distretto di Porretta	1.84	0.93	1.39	0.89	0.06	0.48	0.18	0.00	0.09
ALTO RENO TERME	2.49	0.00	1.24	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
CAMUGNANO	0.00	1.94	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASTEL D'AIANO	3.59	0.00	1.86	1.80	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
CASTEL DI CASIO	2.90	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.50
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	1.80	0.64	1.23	0.00	0.64	0.31	0.00	0.00	0.00
GAGGIO MONTANO	3.45	1.39	2.42	0.69	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
GRIZZANA MORANDI	0.81	0.00	0.43	2.43	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
LIZZANO IN BELVEDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZABOTTO	2.35	2.44	2.39	1.88	0.00	0.96	0.47	0.00	0.24
MONZUNO	1.48	0.53	1.02	0.49	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	0.75	0.84	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VERGATO	1.34	1.78	1.56	1.34	0.00	0.67	0.45	0.00	0.22
Distretto Bologna città	1.50	0.48	0.98	1.14	0.31	0.71	0.09	0.02	0.05
BOLOGNA	1.50	0.48	0.98	1.14	0.31	0.71	0.09	0.02	0.05
Area metropolitana	1.49	0.56	1.02	1.05	0.27	0.65	0.12	0.02	0.07

**Tab.19 - Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose*:
caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2018**

	decessi per overdose nel territorio dell'area metropolitana di Bologna							accessi al Pronto Soccorso per overdose						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Numero totale	16	23	13	17	17	11	20	113	112	98	86	85	69	50
Età media	36.9	40.0	39.0	40.6	40.7	42.4	45.3	36.3	37.9	38	38.2	37.9	36.4	40.2
% Femmine	6.3	8.7	7.7	0.0	17.6	36.4	30.0	24.8	10.7	11.2	11.6	23.5	21.7	18.0
% Non nativi	31.3	21.7	7.7	17.6	5.9	9.1	5.0	12.4	24.1	19.4	22.4	31.8	21.7	28.0
% Non residenti	31.3	43.5	38.5	35.3	29.4	27.3	35.0	47.8	55.4	45.9	51.8	47.1	44.9	36.0
% sconosciuti al SERD	43.8	21.7	30.8	29.4	47.1	45.5	45.0	87.6	73.2	46.9	52.9	49.4	50.7	36.0

* Keywords: *"*abuso*" & "*alcol*"; "*abuso*" & "*alcohol*"; "*abuso*" & "*etil*"; "*abuso*" & "*etanol*"; "*intossicazione*" & "*alcol*"; "*intossicazione*" & "*alcohol*"; "*intossicazione*" & "*etil*"; "*esotossicosi etil*"; "*esotossicosi alc*"*. Per la metodologia utilizzata cfr. Pavarin RM et al., Cocaine-related medical and related problems: a consecutive series of 743 patients from a multicentre study in Italy, in *European Journal of Emergency Medicine*, 2011 Aug;18(4):208-14

**Tab. 20 - Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta*:
caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2018.**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1971	1729	1919	1602	2538	2000	1983	2000	1432	1468
% <18 anni	3.5	4.4	2.7	4.0	2.8	2.7	2.5	3.0	2.8	2.3
% 18-29 anni	23.5	23.5	22.3	24.8	20.9	27.5	23.2	23.4	31.7	28.5
% 30-39 anni	15.9	19.2	17.1	16.7	23.1	21.2	23.1	20.6	21.9	21.7
% 40-49 anni	22.7	22.2	22.7	22.2	22.4	22.4	22.5	23.9	24.0	21.2
% 50-59 anni	16.8	17.4	17.1	15.7	13.6	12.6	12.8	15.4	10.9	14.8
% =>60 anni	15.8	11.2	16.9	14.8	13.5	10.1	11.6	10.0	7.4	8.6
% Non noto	1.9	2.2	1.3	1.7	3.7	3.7	4.2	3.8	1.4	2.9
Età media	41.7	41.0	43.3	41.8	41.8	39.4	40.8	40.7	37.4	39.1
% Femmine	27.9	28.7	29.7	28.3	28.1	26.1	25.0	23.2	27.2	26.4
% Non nativi	41.1	44.9	37.9	35.8	42.5	39.6	40.4	34.7	43.4	35.4
% Non residenti in area metropolitana	35.9	42.7	32.9	32.2	37.8	39.1	38.3	42.0	43.0	38.6
% Arrivo al ps di notte (dalle 20 alle 8)	59.8	66.8	62.7	67.0	37.4	63.3	38.7	59.9	29.0	67.2
% Arrivo nel week end	45.7	48.8	50.2	50.9	29.1	47.4	30.4	47.1	23.0	50.5
% Forze dell'ordine	0.8	0.8	0.3	0.9	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	1.0
% Codice triage rosso	4.4	3.1	3.4	3.0	2.6	2.1	1.8	1.2	2.4	2.2
% Almeno un'altra sostanze psicoattiva illegale	10.1	10.0	12.4	7.2	6.8	10.5	9.6	6.5	7.2	5.6

* Keywords: *"*abuso*" & "*alcol*"; "*abuso*" & "*alcohol*"; "*abuso*" & "*etil*"; "*abuso*" & "*etanol*"; "*intossicazione*" & "*alcol*"; "*intossicazione*" & "*alcohol*"; "*intossicazione*" & "*etil*"; "*esotossicosi etil*"; "*esotossicosi alc*"*. Per la metodologia utilizzata cfr. Pavarin RM et al., Cocaine-related medical and related problems: a consecutive series of 743 patients from a multicentre study in Italy, in *European Journal of Emergency Medicine*, 2011 Aug;18(4):208-14

Metodologia utilizzata: note

Definizione di caso – Come “consumatori problematici” (CP) sono stati considerati i soggetti che si sono rivolti ad un servizio pubblico o privato per problemi dovuti all’uso/abuso di sostanze psicoattive. Come giocatori problematici sono stati considerati gli utenti dei SERD con diagnosi di gioco problematico (GP).

I soggetti inclusi nel presente studio sono stati selezionati dai sistemi informativi di SERD e Carcere (cartella socio-sanitaria informatizzata SISTER), Pronto Soccorso dell’AUSL di Bologna¹ (sistema informativo AREAS), Ospedali e case di cura private convenzionate (Scheda di Dimissione Ospedaliera - SDO), Registro Mortalità dell’AUSL di Bologna (Scheda ISTAT- codici ICD 10 F11, F14, F19, X42). Il periodo di riferimento è compreso tra il 2009 ed il 2017, il territorio è l’area metropolitana di Bologna.

Materiali e metodi - Un soggetto nello stesso periodo di riferimento può essere stato in contatto con più servizi ed essere presente in più archivi. Per ogni soggetto le informazioni sono state riunite in unico record ed aggiornate anno per anno. L’archivio finale distingue i “nuovi” contatti (soggetti presenti per la prima volta nell’anno considerato, e mai contattati negli anni precedenti). Per indicare la nazionalità si è tenuto conto del paese di nascita e si sono costruite due categorie “nativi” (nati in Italia) e “non nativi” (nati all’estero). Relativamente alla tabella 20 (accessi ai reparti di Pronto Soccorso) i casi incidenti sono stati marchiati in modo univoco con una chiave anonima.

Analisi - Per la stima del sommerso è stato utilizzato il metodo “cattura/ricattura” a due fonti (A*B/C) e sono stati calcolati i relativi intervalli di confidenza al 95%: A) i soggetti che hanno usufruito di servizi SERT (esclusi quelli che sono stati seguiti solo dal Carcere); B) i soggetti dimessi da Ospedali e case di cura private convenzionate²; C) i soggetti comuni tra le due fonti.

Per tutte le stime sono stati utilizzati i soggetti di età compresa tra 15 e 64 anni; per le sostanze illegali i soggetti con abuso di oppioidi, cocaina e cannabis.

Incidenza e prevalenza sono state calcolate per i soli soggetti residenti di età compresa tra 15-64 anni distintamente per sesso e nazionalità (utenti residenti/popolazione residente*1000). La popolazione residente (nativi e non nativi) è stata ricavata dal sito web della Regione Emilia-Romagna³.

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando i software SPSS 18.0 e STATA 15.0.

¹ Pavarin, R.M. (2014), *Access to the health services for problematic use of illegal psychoactive substances among natives and non-natives: a study in the metropolitan area of Bologna*, Ann Ist Super Sanità, 50(1): 40-46. Pavarin RM, (2015) Mortality risk among heroin abusers: clients and non-clients of public treatment centers for drug addiction – Substance use and Misuse vol 50 pg 1690-1696

² Vedi Pavarin, R.M. (2007), *Consumo, consumo problematico e dipendenza*, Franco Angeli, Milano: 37;56. Pavarin, R.M. (1998), *Stima della prevalenza di tossicodipendenti nella città di Bologna nel 1997 e analisi del sommerso*, Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo, 3:7-11

³ http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/statistica/pagine/statistica_self_service.htm