

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Rapporto 2021 sulle dipendenze in area metropolitana

*quadro epidemiologico
caratteristiche soggetti con consumo problematico di sostanze illegali,
alcol e giocatori d'azzardo problematici, attività dei servizi*

A cura di Raimondo Maria Pavarin
Con la collaborazione di Silvia Marani, Elsa Turino e Giovanni Coccagna

Azienda USL di Bologna
DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Via S. Isaia, 94/A
Tel. 051/6584313
<http://www.ausl.bologna.it/oem>

Si ringraziano

Luana Capitani – AUSL di Bologna – Ser. Dp Bologna Ovest, DSm-DP, Ausl Bologna

Meri Bassini - Programma Integrato Dipendenze Patologiche e Assistenza alle popolazioni vulnerabili, Ausl Bologna

Orietta Venturi – AUSL di Bologna, Equipe Carcere Ser. T Bologna Nord, DSm-DP, Ausl Bologna

Stefania Bongiovanni – Ser. Dp Bologna Pianura Ovest, DSm-DP, Ausl Bologna

Catia Leoni – AUSL di Bologna –Ser. Dp Bologna Est, DSm-DP, Ausl Bologna

Lara Malacarne – AUSL di Bologna –Ser. Dp Budrio, DSm-DP, Ausl Bologna

Vladimiro Albertazzi e Aurora Avola – AUSL di Bologna –Ser.Dp San Lazzaro di Savena, DSm-DP, Ausl Bologna

Leonardo Piscitelli – AUSL di Bologna –Ser. Dp Porretta, DSm-DP, Ausl Bologna

Cristina Nasonte – AUSL di Bologna –Ser. Dp Giorgio di Piano, DSm-DP, Ausl Bologna

Simona Sarti – AUSL di Bologna – Ser. Dp Casalecchio, DSm-DP, Ausl Bologna

Moreno Astorri – Opera Padre Marella, Comunità “La Sorgente”

Marco Sirotti – Gruppo Ceis, Casa San Martino e Casa San Matteo

Manuela Civettini – Opengroup Dipendenze

Gianfranco Preiti - Processo Assistenziale nella Salute Mentale, Resp. Documentazione e Sistemi Informativi nella Salute Mentale, DSm-DP, Ausl Bologna

Vincenza Perlangeli – U.O.C. Epidemiologia, promozione della salute e comunicazione del rischio, Ausl Bologna

Antonietta Moschetti – Equipe servizio ICT, Policlinico S.Orsola-Malpighi

Sono inoltre disponibili on line sul sito dell'Osservatorio.

<http://www.ausl.bologna.it/oem>:

1 – [Mappa dei servizi pubblici e privati per le dipendenze in area metropolitana](http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa-servizi)

<http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa-servizi>

2 – <https://www.ausl.bologna.it/oem/dati-statistici>

COVID-19 e consumo problematico di sostanze

- Nel corso del 2020 nell'area metropolitana di Bologna diminuisce il “consumo sociale” di sostanze ed emergono le conseguenze negative per le persone che hanno o avevano avuto un consumo problematico di sostanze.
- Diminuiscono i decessi per overdose.
- Cala il numero di consumatori problematici che si rivolgono ai servizi, ma aumentano il numero di consumatori problematici di cocaina, degli utenti dell'Unità Mobile Metadone, l'età media e il numero di persone senza fissa dimora che si rivolgono alle diverse strutture sanitarie.
- In aumento l'incidenza del consumo problematico di alcol tra i minori, in particolare tra i maschi nati in Italia.
- In calo il numero di Giocatori Problematici che si rivolgono ai servizi.

Cosa succede in città

- **Il consumo problematico di sostanze illegali**

Diminuisce il numero di decessi per overdose, il 60% in meno rispetto al 2019.

Rispetto agli anni precedenti diminuisce il numero di CP di sostanze illegali, sia di eroina che di cannabis, ma aumenta quello di cocaina. Il calo coinvolge tutti i servizi, ma si segnala l'aumento del numero di persone che si rivolgono all'Unità Mobile Metadone.

Per quanto riguarda la Cocaina, non si tratta di nuovi CP. Molti consumatori problematici ex utenti si sono rivolti ai servizi di emergenza nel 2020 ed hanno ripreso contatto coi SERD nel 2021.

Per quanto riguarda le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche, aumentano l'età media e il numero di persone senza fissa dimora.

Tra i residenti si segnala la diminuzione di incidenza e prevalenza, con i valori i più bassi mai registrati dal 2009.

I servizi sanitari di emergenza (PS) e l'Ospedale, con la loro elevata quota di nuovi contatti, si confermano tra i principali punti di primo accesso per il CP di sostanze illegali.

- **Il consumo problematico di alcol**

Diminuisce il numero complessivo e quello di nuovi accessi di persone con CP di alcol. In controtendenza, si segnala l'aumento del numero di soggetti seguiti in Psichiatria e di persone ristrette in Carcere.

Tra i residenti, si segnala che i valori di incidenza e prevalenza sono i più bassi mai registrati dal 2009.

- **I non nativi**

Il numero di non nativi con CP di alcol e di sostanze illegali, pur in costante aumento nel periodo, è diminuito nel 2020.

Per quanto riguarda le sostanze illegali, aumenta il numero di soggetti nati in paesi dell'Africa Mediterranea, di persone senza fissa dimora, di eroinomani e di utenti dell'Unità Mobile Metadone.

- **I residenti**

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti di entrambi i sessi e tra i residenti non nativi, è in diminuzione l'incidenza di CP di alcol e di sostanze illegali.

Sia tra le persone con CP di sostanze illegali che di alcol, l'incidenza è più elevata tra non i nativi rispetto ai nativi, tra i maschi rispetto alle femmine. Per l'alcol si segnalano i soggetti con età superiore a 50 anni, per le sostanze illegali la fascia di età 20-29 anni.

- **I minori**

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 17 anni è in aumento l'incidenza del CP di alcol sul totale, tra i maschi e tra i nativi. Nessun caso tra i non nativi.

Per quanto riguarda le sostanze illegali, diminuisce l'incidenza di CP in entrambi i sessi e tra i non nativi. Relativamente alle singole sostanze, si segnala che non vi sono casi con consumo di eroina e un solo caso di consumo di cocaina.

- **Il gioco d'azzardo problematico**

Diminuisce il numero di soggetti seguiti dai SERD per problemi dovuti al gioco. In aumento l'età media e la quota di non nativi.

1 - Il consumo problematico di sostanze illegali

Rispetto agli anni precedenti diminuisce il numero di CP sia di eroina che di cannabis ed aumenta quello di cocaina. Nel caso della cocaina non si tratta di nuovi contatti, ma di soggetti che erano già stati in contatto coi servizi in passato.

Per quanto riguarda le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche, si segnala l'aumento dell'età media e del numero di persone senza fissa dimora. Si segnala la diminuzione del numero di decessi per overdose, il 60% in meno rispetto al 2019. Diminuiscono gli utenti dei SERD, gli accessi al Pronto Soccorso ed i ricoverati all'ospedale, ma aumentano gli utenti dell'Unità Mobile Metadone e dei Centri di Salute Mentale. Tra i residenti si segnala la diminuzione di incidenza e prevalenza, i cui valori sono i più bassi mai registrati da quando si rileva tale dato.

Tra i nuovi contatti, tra cui solo il 6% utilizzava sostanze per via endovenosa, si segnala l'aumento dell'età media e del numero di soggetti senza fissa dimora.

I consumatori problematici di sostanze illegali

		2020	2019	2018
Sostanze	Numero	3365	3628	3424
	Oppioidi	2038	2110	2094
	Cocaina	1505	1487	1370
	Cannabis	567	613	592
Caratteristiche	% nuovi contatti	18.1	23.8	22.9
	Età media	42.0	41.2	41.1
	% femmine	19.3	20.7	20.1
	% non residenti	19.2	18.1	21.0
	% non nativi	21.7	21.8	22.1
Servizi	SERD	2674	2778	2667
	Pronto Soccorso	384	665	523
	Ospedale	238	314	318
	Psichiatria	266	220	186
Dati epidemiologici	Incidenza x 1000 residenti	0.62	0.88	0.73
	Prevalenza x 1000 residenti	4.40	4.86	4.46

Per quanto riguarda i servizi, l'accesso è più frequente al SERD, soprattutto per soggetti con problemi dovuti all'eroina. L'ospedale si caratterizza per una fascia di utenza con età mediamente più elevata e per la maggiore presenza di femmine; il Pronto Soccorso per la maggiore presenza di non residenti e di non nativi; la Psichiatria per la più bassa percentuale di non nativi. I servizi sanitari di emergenza (PS) e l'Ospedale, grazie alla loro elevata quota di nuovi contatti, si confermano tra i principali punti di primo accesso per il CP di sostanze illegali.

L'accesso ai servizi

		SERD	PS	Ospedale	Psichiatria
Sostanze	Numero	2674	384	238	266
	% Oppioidi	70.7	28.9	38.2	34.2
	% Cocaina	45.5	45.1	46.6	32.3
	% Cannabis	14.4	26.3	22.3	24.4
Caratteristiche	% nuovi	10.8	44.3	52.9	15.4
	Età media	42.2	38.1	43.5	40.3
	% femmine	17.8	24.2	28.6	26.3
	% non residenti	18.5	27.9	11.8	12.4
	% non nativi	21.4	28.9	20.6	12.8

Per quanto riguarda gli utenti SERD, rispetto al 2019 è stabile la quota di positivi all'HIV ed all'epatite C, mentre invece diminuisce il numero di pazienti testati.

Lo stato di salute degli utenti SERD

% positivi	HIV		Epatite C		% con almeno un test	HIV		Epatite C				
	2020	2019	2018	2020		2019	2018	2020	2019	2018		
	7.7	7.8	6.2	43.5	43.1	34.9	71.1	73.9	74.1	72.7	74.8	75.7

2 - Il consumo problematico di alcol

Rispetto agli anni precedenti diminuisce il numero di persone con CP di alcol che si rivolge ai servizi. Mentre cala la percentuale di non residenti, la diminuzione coinvolge diverse tipologie di soggetti (maschi, femmine, nativi, non nativi e residenti). In controtendenza, si segnala l'aumento del numero di persone seguite in Psichiatria e di persone ristrette in Carcere. Stabile il numero di soggetti con abuso concomitante di sostanze illegali.

Si segnala che i valori di incidenza e prevalenza sono i più bassi tra quelli rilevati a partire dal 2009.

Consumo problematico di alcol: dati epidemiologici

		2020	2019	2018
	Numero soggetti	2622	2902	2799
Caratteristiche	% nuovi contatti	36.0	40.4	40.9
	Età media	50.3	49.5	49.6
	% femmine	26.9	26.9	26.6
	% non residenti	13.6	14.6	16.6
	% non nativi	24.7	24.5	24.8
Servizi	SERD	1216	1276	1229
	Pronto Soccorso	1020	1330	1355
	Ospedale	535	569	577
	Psichiatria	286	229	224
Dati epidemiologici	Incidenza x 1000 residenti	0.95	1.14	1.08
	Prevalenza x 1000 residenti	3.11	3.40	3.23

3 – I non nativi

I non nativi con CP di alcol e di sostanze illegali, pur in costante aumento nel periodo, sono diminuiti nel 2020. Per quanto riguarda l'alcol, si segnala l'aumento del numero di persone seguite in Psichiatria o ristrette in Carcere e di persone con abuso concomitante di sostanze illegali, cocaina in particolare.

Per quanto riguarda le sostanze illegali, aumenta il numero di soggetti nati in paesi dell'Africa Mediterranea, di persone senza fissa dimora, di eroinomani e di utenti dell'Unità Mobile Metadone.

Da rilevare che i non nativi non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea. Per l'alcol si evidenziano nell'ordine i nativi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea, per le sostanze illegali la graduatoria si inverte.

Zona di provenienza	Sostanze illegali		Alcol	
	2020	2019	2020	2019
Totale	730	791	648	711
% Europa Est	25.8	24.9	44.6	43.9
% Altri paesi europei	7.9	9.7	7.6	8.3
% Asia	7.9	8.7	8.0	8.6
% Africa Mediterranea	46.7	42.7	23.3	24.3
% Altra Africa	5.2	6.3	9.0	8.2
% America Latina	6.2	6.8	6.3	5.9

Per quanto riguarda i settori di contatto, la maggior parte dei soggetti con CP di sostanze illegali si rivolge al SERD, in molti casi in seguito ad una carcerazione, mentre invece chi ha un CP di alcol si rivolge maggiormente al Pronto Soccorso.

	Sostanze illegali		Alcol	
	2020	2019	2020	2019
% Ospedale	6.7	9.7	17.0	15.3
% Pronto soccorso	15.2	22.4	50.2	57.7
% Psichiatria	4.7	2.1	6.6	4.4
% SERD	78.5	75.0	40.6	38.5
% di cui anche Carcere	33.4	32.2	7.9	6.6
% di cui anche Unità Mobile Metadone	12.9	10.9	1.7	2.4

4 – I residenti

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti di entrambi i sessi e tra i residenti non nativi, è in diminuzione l'incidenza di CP sia di alcol che di sostanze illegali.

Consumo problematico di sostanze illegali e di alcol – incidenza per mille residenti

	Alcol		Illegali		Alcol		Illegali	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Nativi	Non nativi	Nativi	Non nativi
2020	1.34	0.56	1.00	0.25	0.78	1.87	0.59	0.83
2019	1.65	0.65	1.34	0.44	0.97	2.15	0.78	1.47
2018	1.59	0.59	1.14	0.33	0.89	2.18	0.66	1.14
2017	1.47	0.62	1.12	0.30	0.86	2.05	0.68	0.89
2016	1.39	0.65	1.07	0.40	0.83	2.09	0.66	1.13
2015	1.70	0.62	1.14	0.30	1.01	2.00	0.67	0.98
2014	2.27	0.99	1.27	0.52	1.35	3.19	0.84	1.22
2013	1.97	0.81	1.36	0.58	1.15	2.73	0.92	1.28
2012	2.05	0.80	1.17	0.38	1.12	3.25	0.71	1.15
2011	2.17	0.72	1.31	0.45	1.19	3.08	0.84	1.16
2010	1.91	0.69	1.27	0.49	1.07	2.93	0.83	1.26
2009	1.62	0.55	1.15	0.41	0.90	2.55	0.74	1.10

Tra le persone con CP di sostanze illegali, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi e tra i maschi. Per quanto riguarda le fasce di età, è più elevata tra i maschi di età compresa tra 18 e 29 anni, con il picco nella classe 20-24 anni. Tra le femmine si segnalano le CP di 20/29 anni. Sia tra i nativi che tra i non nativi si segnalano i CP con età compresa tra 20 e 29 anni.

Da rilevare che l'incidenza è sempre più elevata tra i maschi rispetto alle femmine in tutte le classi di età; risulta invece più elevata per i non nativi in tutte le classi di età, esclusa le fasce 18-19 anni e 40-59 anni, dove è più elevata tra le persone nate in Italia.

Sostanze illegali: incidenza per mille residenti per età	Maschi		Femmine		Nativi	Non nativi
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
12-17	0.46	0.27	0.40	0.17	0.40	0.17
18-19	1.60	0.14	0.81	1.53	0.81	1.53
20-24	1.75	0.44	1.01	1.70	1.01	1.70
25-29	2.01	0.51	1.03	2.18	1.03	2.18
30-34	1.25	0.28	0.61	1.22	0.61	1.22
35-39	1.26	0.18	0.70	0.77	0.70	0.77
40-44	1.22	0.31	0.82	0.50	0.82	0.50
45-49	1.05	0.16	0.67	0.11	0.67	0.11
50-54	0.65	0.27	0.48	0.26	0.48	0.26
55-59	0.38	0.12	0.25	0.17	0.25	0.17
60-64	0.22	0.20	0.17	0.66	0.17	0.66

Tra i soggetti con abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi in tutte le classi di età, esclusi i minori di 20 anni e la fascia 55-59 anni, tra cui prevalgono i nativi. Tra i nativi l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 50 e 64 anni, tra i non nativi nelle fasce comprese tra 20-24 anni, 30-34 anni, 50-54 anni e 60-64 anni.

Per quanto riguarda il sesso, l'incidenza risulta più elevata tra i maschi in tutte le classi di età. Si segnalano le classi di età 50-54 anni e 60-64 anni tra i maschi, 20-24 anni e 50-54 anni tra le femmine, dove osserviamo i valori più elevati.

Alcol: incidenza per mille residenti per età	Maschi		Femmine		Nativi	Non nativi
12-17	0.71	0.54	0.72	0.00		
18-19	1.11	0.27	0.74	0.51		
20-24	1.30	0.66	0.60	2.94		
25-29	1.16	0.60	0.66	1.74		
30-34	1.41	0.40	0.43	2.36		
35-39	1.22	0.50	0.56	1.85		
40-44	1.51	0.55	0.71	2.42		
45-49	1.05	0.51	0.64	1.73		
50-54	1.69	0.78	1.12	2.12		
55-59	1.33	0.59	0.97	0.66		
60-64	1.94	0.54	1.10	2.43		

5 – Gli accessi al pronto soccorso

	Sostanze illegali			Alcol	
	2020	2019		2020	2019
Numero accessi	1184	1318	Numero accessi	2906	3548
Età media	37.6	35.6	Età media	46.8	45.5
% Femmine	15.5	13.9	% Femmine	17.5	17.6
% Non nativi	20.4	19.8	% Non nativi	20.1	18.6
% Non residenti	22.9	23.0	% Non residenti	16.1	18.0
% Anche alcol	26.6	27.1	% anche sostanze illegali	11.7	9.0
% Oppioidi	17.1	18.1			
% Cocaina	35.3	40.8			
% Cannabis	21.0	23.0			

Il numero di persone che accedono ai PS per CP di sostanze illegali, in costante aumento dal 2009, diminuisce nel 2020. Il calo coinvolge tutte le sostanze, aumenta invece l'età media.

Cala anche il numero di CP di alcol ed aumenta l'età media all'accesso.

6 – I ricoveri ospedalieri

	Sostanze illegali			Alcol	
	2020	2019		2020	2019
Numero ricoveri	447	450	Numero ricoveri	758	832
% Dipendenza droghe	20.6	23.5	% Danni epatici	58.3	55.6
% Abuso droghe senza dipendenza	52.8	50.8			
Età media	45.5	42.8	Età media	56.7	55.5
% Femmine	36.5	37.3	% Femmine	28.6	27.0
% Non nativi	19.9	22.7	% Non nativi	21.2	19.9
% Non residenti	7.4	8.9	% Non residenti	8.5	8.2
% Oppioidi	19.1	15.4			
% Cocaina	27.0	21.2			
% Cannabis	12.9	16.3			

Rispetto al 2019 rimane stabile il numero di ricoveri per abuso/dipendenza da sostanze illegali. Si segnala l'aumento dell'età media e della quota di ricoveri per cocaina.

Il numero di ricoveri per problemi alcol correlati è diminuzione, aumenta l'età media.

7 – I nuovi utenti dei SERD

Il numero di nuovi accessi ai SERD per CP di sostanze illegali è in calo rispetto al 2019, ma aumenta l'età media.

Per quanto riguarda la fonte del primo contatto, si segnala il carcere (23%). In aumento il numero di persone con lavoro stabile. Si segnalano 4 casi di utenti positivi all'epatite C e un utente positivo all'HIV.

	Sostanze illegali		Alcol	
	2020	2019	2020	2019
Numero soggetti	290	435	180	270
Età media	34.5	34.3	45.1	44.2
% Femmine	15.2	15.2	29.4	25.2
% Non nativi	32.4	33.8	34.4	31.9
% Non residenti	32.8	31.0	17.2	14.1
% Dimora stabile	46.8	45.5	83.7	79.5
% Occupati	44.1	40.7	48.7	53.0
% Oppioidi	39.3	32.2		
% Cocaina	57.9	60.5		

Il numero di nuovi accessi ai SERD per CP di alcol è in calo rispetto al 2019. Aumenta l'età media.

8 – I minori

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 17 anni è in aumento l'incidenza (nuovi casi su 1000 residenti) del CP di alcol sul totale, tra i maschi e tra i nativi. Nessun caso invece tra i non nativi.

Alcol: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-17 anni

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	0.62	0.48	0.62	0.61	0.46	1.00	0.93	0.83	0.63	0.83	0.80	0.38
Maschi	0.71	0.38	0.64	0.61	0.45	1.17	1.11	1.00	0.74	1.15	0.98	0.58
Femmine	0.54	0.59	0.59	0.60	0.47	0.82	0.74	0.66	0.52	0.49	0.60	0.17
Nativi	0.72	0.50	0.63	0.54	0.48	0.84	0.97	0.82	0.58	0.80	0.66	0.34
Non nativi	-	0.34	0.53	1.07	0.35	2.07	0.68	0.88	0.93	1.02	1.78	0.75

Per quanto riguarda le sostanze illegali, diminuisce l'incidenza di CP in entrambi i sessi e tra i non nativi. Relativamente alle singole sostanze, si segnala che non vi sono casi con consumo di eroina e un solo caso (accesso al Pronto Soccorso) di cocaina.

Sostanze illegali: incidenza per 1.000 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età 12-17 anni

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	0.37	0.44	0.77	0.52	0.64	0.42	0.45	0.46	0.38	0.42	0.29	0.41
Maschi	0.46	0.51	0.81	0.70	0.85	0.63	0.69	0.52	0.59	0.70	0.26	0.42
Femmine	0.27	0.36	0.73	0.32	0.43	0.19	0.20	0.40	0.16	0.11	0.33	0.39
Nativi	0.40	0.40	0.66	0.51	0.53	0.38	0.39	0.43	0.17	0.39	0.27	0.40
Non nativi	0.17	0.69	1.58	0.53	1.41	0.69	0.85	0.70	1.68	0.61	0.45	0.50
Eroina	-	-	0.07	0.02	0.11	0.07	0.02	0.07	-	0.03	-	0.08
Cocaina	0.02	0.02	0.13	-	0.07	0.02	0.02	-	-	-	-	-

9 – Il sistema di allerta rapida droghe/alcol

Nell'area metropolitana di Bologna nel 2020, rispetto all'anno precedente, diminuisce il numero di decessi per overdose, che si dimezza rispetto al 2019. Da segnalare che è il dato più basso nel periodo 2012/2020. Diminuisce anche il numero di accessi ai PS per overdose non letali, che anche in questo caso rappresenta il dato più basso nel periodo. In aumento l'età media sia per i decessi che per gli accessi ai PS. Tra i decessi, tutti maschi, uno su tre era un non nativo, uno su cinque non residente, uno su tre sconosciuto al SERD.

Il sistema di allerta rapida*

	Decessi per overdose		Accessi ai PS per overdose	
	Numero	Età media	Numero	Età media
2012	16	36.9	113	36.3
2013	23	40.0	112	37.9
2014	13	39.0	98	38.0
2015	17	40.6	86	38.2
2016	17	40.7	85	37.9
2017	11	42.4	69	36.4
2018	20	45.3	50	40.2
2019	23	40.3	68	38.3
2020	10	45.5	47	39.6

* <https://allertarapidadaroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

Pur con andamento altalenante, nei PS dell'Area Metropolitana di Bologna vi sono circa 2000 accessi per intossicazioni alcoliche acute ogni anno, dato che risulta in drastica diminuzione nel 2020 rispetto all'anno precedente, il più basso nel periodo 2012/2020.

L'età media è di 43 anni, in aumento. In aumento anche la percentuale di non nativi. La classe di età compresa tra 40 e 49 anni è la più rappresentata. Il 59% degli accessi avviene di notte e il 48% nel fine settimana. Nel 16% dei casi si osserva abuso concomitante di sostanze illegali.


Accessi al PS per intossicazione alcolica acuta*

	Numero	Età media	% Femmine	% Non nativi	% Non residenti
2012	1983	40.8	25.0	40.4	38.3
2013	2000	39.4	26.1	39.6	39.1
2014	2538	41.8	28.1	42.5	37.8
2015	1602	41.8	28.3	35.8	32.2
2016	1919	43.3	29.7	37.9	32.9
2017	1729	41.0	28.7	44.9	42.7
2018	1971	41.7	27.9	41.1	35.9
2019	2188	42.0	26.8	40.1	37.2
2020	1680	43.2	23.8	45.2	38.1

* <https://allertarapidadaroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

10 – Il gioco d'azzardo problematico

Considerando i soggetti che si sono rivolti ai SERD, agli ospedali ed ai servizi della psichiatria, il numero dei nuovi casi di gioco problematico diminuisce nel 2020 (64 nuovi casi).



Tra gli utenti dei SERD, diminuisce il numero di persone prese in carico (218 utenti nel 2020, 233 nel 2019, 186 nel 2018). Aumentano l'età media (51 anni) e la quota di non nativi (10%). Stabile la percentuale di femmine (21%) e di soggetti con scolarità medio alta (34%), in calo quella di pensionati (20%).

Anno 2020 e precedenti: tabelle dei dati

Tab. 1	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2020
Tab. 2	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020
Tab. 3	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2020
Tab. 4	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2020
Tab. 5	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2020
Tab. 6	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2020
Tab. 7	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2020
Tab. 8	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020
Tab. 9	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2020
Tab. 10	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020
Tab. 11	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2020
Tab. 12	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020
Tab. 13	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2020
Tab. 14	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche utenti con re-ingresso in carico al SERT. Periodo 2019-2020
Tab. 15	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2020
Tab. 16	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2020
Tab. 17	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2020
Tab. 18	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2020
Tab. 19	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2020
Tab. 20	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2020
Tab. 21	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2020
Tab. 22	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2020
Tab. 23	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020
Tab. 24	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2020
Tab. 25	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2020
Tab. 26	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2020
Tab. 27	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2020
Tab. 28	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2020
Tab. 29	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche utenti con re-ingresso in carico al SERT. Periodo 2019-2020
Tab. 30	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2020
Tab. 31	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2020
Tab. 32	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2020
Tab. 33	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2020
Tab. 34	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2020
Tab. 35	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2020
Tab. 36	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2020
Tab. 37	Gioco problematico. Caratteristiche casi incidenti inclusi nella coorte GAP. Periodo 2009-2020
Tab. 38	Gioco problematico. Caratteristiche soggetti in carico al SERT. Periodo 2009-2020
Tab. 39	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2020
Tab. 40	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2020
Tab. 41	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2020.
Tab. 42	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2020.
Tab. 43	Consumo problematico sostanze psicoattive. Stima del sommerso. Periodo 2009-2020
Tab. 44	Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2009-2020
Tab. 45	Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2020
Tab. 46	Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2020

Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	3365	3628	3414	3343	3526	3544	3696	3781	3791	3845	3898	3809
% nuovi contatti**	18.1	23.8	22.9	21.7	23.3	21.2	25.9	27.1	23.8	24.7	26.7	24.5
età media	42.0	41.23	41.1	40.6	40.4	39.8	40.1	39.7	38.8	38.9	37.7	37.1
% maschi	80.7	79.3	79.9	80.2	79.2	80.4	79.0	78.3	79.6	79.2	78.7	79.2
% femmine	19.3	20.7	20.1	19.8	20.8	19.6	21.0	21.7	20.4	20.8	21.3	20.8
% nativi	78.1	78.0	77.7	78.2	77.6	77.4	77.7	78.8	79.1	80.2	80.4	81.7
% non nativi	21.7	21.8	22.1	21.4	22.1	22.5	22.1	21.0	20.9	19.8	19.6	18.3
% residenti area metropolitana	77.9	79.4	76.9	78.2	73.5	75.1	74.6	73.1	71.1	72.0	113.1	70.1
% residenti fuori area metropolitana	19.2	18.2	21.0	18.6	24.2	23.4	23.6	25.2	27.8	27.9	35.9	29.7
% senza fissa dimora (SFD)	6.6	4.8	5.5	5.6	5.0	4.9	5.3	4.5	3.7	3.4	5.7	5.4
% decesso overdose	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2

% oppioidi	60.6	58.2	61.3	64.0	64.7	68.2	70.3	66.0	75.9	78.5	73.7	76.7
% di cui eroina	56.9	54.3	58.2	60.4	61.0	64.8	63.9	62.5	68.6	68.3	70.1	71.3
% cocaina	44.7	41.0	40.1	38.6	31.8	30.8	27.9	24.7	29.4	26.6	24.5	33.7
% di cui solo cocaina	23.8	23.5	21.9	20.9	17.7	16.2	14.5	13.7	10.6	9.7	12.2	10.3
% cannabinoidi	16.8	16.9	17.3	17.1	16.5	14.4	14.4	14.0	15.1	12.3	10.3	14.7
% di cui solo cannabinoidi	7.6	7.8	7.7	7.2	6.2	6.4	6.4	6.5	5.2	4.1	4.0	3.6
% altre sostanze illegali	11.9	12.1	12.2	12.3	12.8	11.8	14.0	10.2	14.7	12.4	11.6	14.0
di cui % allucinogeni	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.6	0.7	0.2	0.3
di cui % amfetamine	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
di cui % crack	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.9	0.3	0.4
di cui % ecstasy	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
di cui % GHB	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
di cui % altra non indicata	10.1	10.7	11.0	11.0	12.7	6.5	13.1	6.0	6.6	10.8	9.1	7.8

% abuso concomitante di psicofarmaci	3.3	6.2	5.4	4.2	7.0	5.5	6.4	10.1	5.4	5.8	7.8	8.2
di cui % benzodiazepine	2.4	4.6	3.7	2.7	4.3	3.4	4.0	8.8	4.0	3.1	3.0	4.1
di cui % antidepressivi	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.9	1.3	1.0	1.8	0.4
di cui % barbiturici	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.6	0.5	0.3	0.4
di cui % psicofarmaci	1.1	3.0	1.6	1.9	2.6	1.9	2.7	1.2	3.2	2.3	2.2	1.9

% anche alcol	18.1	16.9	16.3	15.9	15.8	15.0	15.2	13.5	22.2	20.2	24.8	27.2
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	26.3	25.6	27.8	29.3	30.0	31.5	31.0	31.2	33.1	35.4	37.8	36.0

% Ospedale	7.1	8.7	9.3	8.3	8.1	8.1	8.4	6.4	6.5	6.8	8.4	5.6
% Psichiatria	7.9	6.1	5.4	5.7	5.4	7.7	7.0	3.4	2.9	2.3	2.1	2.0
% Pronto soccorso	11.4	18.3	15.3	14.4	13.8	11.1	16.5	17.5	16.7	12.7	10.4	12.3
% SERT	79.5	76.6	78.1	80.0	78.6	80.5	77.5	75.9	77.4	78.9	81.8	79.4
di cui % anche Carcere	13.3	12.6	13.4	14.5	14.9	17.2	17.3	16.6	18.4	18.0	16.8	13.7
di cui % anche Unità Mobile Metadone	4.5	3.8	4.5	4.3	4.2	4.9	4.9	3.5	3.7	3.8	5.0	4.5

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 2 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	609	863	781	727	821	750	957	1026	902	950	1042	935
età media	37.0	36.9	35.8	35.7	36.9	36.9	38.9	38.8	34.9	36.4	36.2	35.2
% maschi	79.3	76.2	78.1	81.0	77.0	79.1	72.8	71.0	80.0	76.6	75.3	77.6
% femmine	20.7	23.8	21.9	19.0	23.0	20.9	27.2	29.0	20.0	23.4	24.7	22.4
% nativi	70.0	69.2	65.9	66.0	62.2	68.4	69.9	72.0	66.4	70.0	69.5	73.7
% non nativi	29.6	30.5	33.4	33.4	37.1	31.5	29.4	27.8	33.5	30.0	30.5	26.3
% residenti area metropolitana	63.1	64.2	58.9	59.7	55.7	60.3	62.6	65.1	51.6	57.2	53.1	51.7
% residenti fuori area metropolitana	33.2	32.4	38.3	36.9	39.5	37.7	34.7	32.4	46.6	42.7	43.6	48.0
% senza fissa dimora (SFD)	4.1	2.3	4.2	3.9	5.2	4.4	5.4	3.1	3.7	1.8	6.8	4.7
% decesso overdose	0.7	1.5	1.7	0.7	0.6	1.1	0.9	0.6	1.3	0.4	0.2	0.3

% oppioidi	29.6	24.8	26.0	30.4	33.1	38.0	45.9	28.2	44.6	48.9	48.6	52.6
di cui % eroina	20.2	15.9	20.7	25.0	25.3	30.4	29.4	21.6	37.7	36.0	42.6	45.0
% cocaina	44.0	41.7	43.8	46.1	34.8	35.1	27.4	23.4	26.3	24.8	21.8	29.8
di cui % solo cocaina	33.3	33.4	32.9	34.1	25.6	24.8	19.0	17.3	17.7	16.9	15.1	14.1
% cannabinoidi	25.9	24.7	29.4	32.0	25.5	23.1	23.2	24.5	22.4	15.6	11.5	15.7
di cui % solo cannabinoidi	18.9	16.3	19.0	18.4	12.9	14.4	13.9	15.7	14.1	10.6	7.7	5.9
% altre sostanze illegali	21.3	23.2	20.7	19.3	25.5	21.2	25.3	19.2	26.8	28.3	29.8	29.9
di cui % allucinogeni	0.8	0.9	0.5	0.4	0.2	1.1	0.3	0.5	0.9	1.7	0.0	0.4
di cui % amfetamine	0.8	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	0.8	0.4	1.2	0.9	0.9
di cui % crack	1.1	1.4	1.0	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.2
di cui % ecstasy	0.8	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2
di cui % GHB	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.4	0.6
di cui % altra non indicata	18.6	20.3	18.7	17.3	23.9	16.7	23.7	15.7	19.3	25.2	27.9	22.4

% abuso concomitante di psicofarmaci	4.1	10.5	10.1	6.7	11.1	9.7	11.1	25.4	7.6	6.8	16.1	10.4
di cui % benzodiazepine	2.3	8.3	7.3	3.9	6.9	6.1	6.6	23.0	2.9	2.3	4.1	3.4
di cui % antidepressivi	0.0	0.8	0.8	0.3	0.7	0.3	0.5	2.3	1.2	1.3	5.8	0.1
di cui % barbiturici	0.8	0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	1.0	0.4	0.6	1.3	0.2	0.1
di cui % psicofarmaci	2.5	6.6	2.4	3.7	3.9	2.9	5.2	2.0	4.0	3.6	5.0	2.4

% anche alcol	22.0	18.4	16.9	18.0	16.8	16.3	16.5	13.9	20.3	18.9	14.9	20.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	6.1	4.9	6.4	8.1	5.7	7.2	8.8	5.8	13.2	12.0	14.4	11.0

% Ospedale	20.7	22.6	19.1	17.5	16.6	21.2	18.8	11.0	10.3	15.8	21.3	10.8
% Psichiatria	6.7	4.3	3.6	0.0	3.0	4.0	9.2	3.0	2.5	1.3	1.6	1.7
% Pronto soccorso	27.9	32.0	33.5	35.1	31.5	24.9	34.2	33.5	35.7	25.4	22.3	29.6
% SERT	46.6	43.5	46.9	52.7	49.3	52.3	42.6	37.2	49.8	53.2	56.5	49.1
di cui % anche Carcere	12.5	13.7	15.2	20.1	20.7	17.5	13.8	14.0	24.8	22.8	20.9	21.1
di cui % anche Unità Mobile Metadone	4.3	2.7	4.4	4.7	4.4	6.0	6.9	3.4	4.2	3.4	7.2	3.5

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 3 - Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	730	791	754	716	779	797	815	795	793	763	765	696
% nuovi contatti**	24.7	33.2	34.6	33.9	39.2	29.6	34.5	35.8	38.1	37.4	41.6	35.3
età media	36.0	35.7	34.7	34.8	34.9	34.6	33.7	33.9	33.2	33.2	32.7	32.2
% maschi	89.0	86.9	86.9	87.8	86.1	89.7	90.1	89.3	91.0	88.5	88.2	89.1
% femmine	11.0	13.1	13.1	12.2	13.9	10.3	9.9	10.7	9.0	11.5	11.8	10.9
% residenti area metropolitana	47.5	51.2	44.7	43.2	39.2	38.3	36.0	35.6	33.0	34.6	34.0	35.9
% residenti fuori area metropolitana	44.2	42.2	48.7	47.2	53.8	56.8	58.2	58.5	63.2	65.3	59.9	63.8
% senza fissa dimora (SFD)	15.8	11.9	12.6	13.0	12.7	9.0	12.0	9.1	6.6	7.5	9.2	8.8
% decesso overdose	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0

% oppioidi	53.2	49.6	51.9	54.5	57.9	63.2	65.0	62.3	68.0	73.1	71.1	73.6
di cui % eroina	49.3	45.1	48.1	51.0	53.5	59.8	60.2	58.5	62.9	64.7	67.8	68.5
% cocaina	54.8	51.5	50.9	49.7	40.9	39.5	36.6	31.3	33.2	28.2	27.7	45.8
di cui % solo cocaina	30.0	31.6	28.9	28.2	23.1	20.3	19.1	17.5	15.8	12.7	14.6	14.2
% cannabinoidi	21.6	24.0	25.2	23.3	21.8	18.3	21.5	20.0	17.2	12.2	10.2	18.1
di cui % solo cannabinoidi	9.0	10.4	10.2	8.9	6.5	7.2	7.4	7.8	7.4	5.6	3.7	3.2
% altre sostanze illegali	11.9	11.1	12.5	13.1	12.5	10.5	11.7	9.9	12.9	11.1	11.1	13.9
% abuso concomitante di psicofarmaci	2.5	6.2	4.6	3.8	5.5	4.8	6.0	7.3	3.9	4.6	5.5	8.2
di cui % benzodiazepine	1.1	3.8	2.3	2.2	3.3	2.6	4.2	6.0	2.5	2.4	1.8	4.0
% anche alcol	19.6	17.7	16.0	15.9	15.1	12.7	13.1	12.1	19.2	14.2	18.6	22.8
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	11.6	11.1	12.3	12.6	12.8	14.4	14.4	14.5	14.8	16.5	17.3	14.4

% Ospedale	6.7	9.7	8.8	5.9	5.1	6.3	5.8	5.2	4.7	5.2	5.6	3.7
% Psichiatria	4.7	2.1	2.5	2.4	2.3	3.0	2.2	0.8	1.1	0.8	0.7	0.6
% Pronto soccorso	15.2	22.4	19.6	18.2	18.1	12.9	15.6	17.4	15.4	11.0	14.0	12.2
% SERT	78.5	75.0	75.3	79.5	77.4	80.2	80.9	78.0	78.4	81.0	81.4	77.4
di cui % anche Carcere	33.4	32.2	35.3	39.1	40.3	46.2	49.7	48.1	53.5	51.4	48.2	49.1
di cui % anche Unità Mobile Metadone	12.9	10.9	13.0	13.0	13.0	13.9	14.7	10.1	9.7	11.1	13.7	11.6

Area provenienza												
% Europa Est	25.8	24.9	26.5	23.0	22.5	21.7	20.4	18.7	18.7	19.0	19.5	19.4
% Altri paesi europei	7.9	9.7	8.6	9.2	8.9	9.0	9.1	11.7	10.5	11.1	13.5	13.6
% Africa Mediterranea	46.7	42.7	44.0	49.4	52.2	53.8	55.2	55.0	56.0	55.3	54.5	53.4
% Altra Africa	5.2	6.3	5.2	4.3	3.2	3.5	2.7	3.3	2.5	3.7	2.7	3.3
% Asia	7.9	8.7	9.0	8.7	7.7	7.7	7.6	6.2	6.8	6.0	5.4	5.2
% America Latina	6.2	6.8	6.2	5.3	5.1	4.1	4.8	3.8	3.5	3.9	3.8	4.0
% USA e Canada	0.3	0.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7
% Altro	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.9	1.6	0.4	0.3	0.3

Nazione												
% Tunisia	21.0	16.6	17.9	21.4	25.8	26.2	28.3	26.3	25.6	24.0	22.0	20.1
% Marocco	20.4	21.4	21.4	22.6	21.7	21.0	20.0	21.0	22.4	21.8	22.1	21.0
% Albania	5.1	4.8	5.4	3.5	3.6	3.4	3.9	4.2	3.3	2.5	4.1	3.9
% Algeria	4.1	4.0	4.5	4.9	4.2	6.1	6.3	7.0	7.3	8.9	9.9	11.9
% Romania	4.0	4.7	5.6	4.5	5.4	4.9	5.8	4.3	5.0	4.6	3.8	3.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 4 - Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	180	263	261	243	305	236	281	285	302	285	318	246
età media	32.4	33.1	30.7	31.4	32.5	32.5	30.0	31.6	31.1	31.1	31.3	30.4
% maschi	85.6	85.6	87.0	88.5	86.2	90.3	85.8	84.9	90.1	82.8	86.5	87.8
% femmine	14.4	14.4	13.0	11.5	13.8	9.7	14.2	15.1	9.9	17.2	13.5	12.2
% residenti area metropolitana	41.1	49.0	37.9	31.7	32.1	35.6	35.6	37.5	30.8	31.6	28.0	28.5
% residenti fuori area metropolitana	51.1	46.8	55.6	62.6	59.3	60.2	58.7	55.8	65.2	68.4	63.8	71.1
% senza fissa dimora (SFD)	8.9	6.8	10.0	6.2	12.1	6.8	12.5	7.4	4.3	3.9	11.0	7.3
% decesso overdose	1.7	0.0	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	1.1	1.7	0.4	0.0	0.0

% oppioidi	31.1	27.4	30.3	33.7	40.0	45.8	48.0	40.4	49.3	55.1	60.7	59.3
di cui % eroina	24.4	20.2	25.7	30.9	34.4	40.7	40.6	34.0	44.4	43.5	55.7	53.7
% cocaina	51.1	47.9	51.7	52.3	44.3	40.3	33.1	28.4	28.8	24.2	18.6	37.0
di cui % solo cocaina	36.1	37.6	36.8	35.4	29.5	22.0	19.9	18.6	20.9	17.2	13.5	17.5
% cannabinoidi	23.9	29.7	32.6	34.6	31.5	24.6	30.2	28.1	23.2	14.7	7.5	18.7
di cui % solo cannabinoidi	15.0	18.6	17.6	16.5	12.5	13.6	13.5	13.0	12.3	10.2	5.3	3.3
% altre sostanze illegali	21.7	17.1	16.5	15.6	17.0	19.1	22.4	18.9	20.2	20.4	20.4	22.8
% abuso concomitante di psicofarmaci	5.0	8.4	6.5	4.9	6.2	5.5	7.8	13.3	4.6	4.6	6.6	7.7
di cui % benzodiazepine	1.7	6.1	3.1	2.9	3.9	1.7	5.0	11.6	1.0	1.8	1.6	2.8
% anche alcol	27.2	20.5	18.4	16.9	15.4	14.0	13.9	15.1	20.9	14.4	12.3	17.9
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	5.0	3.0	6.5	7.0	4.9	6.8	8.5	4.6	11.3	8.8	10.4	7.7

% Ospedale	16.1	17.9	13.0	8.6	6.6	12.7	11.0	6.3	5.6	10.5	8.5	6.1
% Psichiatria	4.4	0.8	1.5	0.0	2.6	1.7	5.0	0.7	1.7	0.0	0.6	0.4
% Pronto soccorso	32.2	34.6	36.4	32.5	29.2	26.7	29.2	34.4	28.8	21.1	23.6	26.4
% SERT	50.6	52.1	52.5	60.9	63.9	58.1	59.1	51.9	60.6	64.6	67.9	60.6
di cui % anche Carcere	23.9	27.0	29.1	41.2	39.3	33.5	33.8	33.3	47.7	48.1	45.3	47.6
di cui % anche Unità Mobile Metadone	7.8	6.1	10.0	7.4	8.5	12.3	14.6	8.1	6.0	6.7	13.2	6.5

Area provenienza												
% Europa Est	30.6	25.9	30.3	24.3	21.0	21.6	23.5	21.8	20.9	20.4	22.0	21.5
% Altri paesi europei	3.9	9.1	5.4	5.3	4.6	6.4	3.9	7.4	7.6	6.0	8.2	8.9
% Africa Mediterranea	45.0	38.4	40.6	50.6	55.4	52.5	54.8	54.4	54.0	58.2	56.3	52.0
% Altra Africa	7.2	11.0	7.3	7.0	4.3	5.9	2.5	5.3	2.3	4.9	4.1	4.5
% Asia	7.2	8.0	9.6	9.5	9.8	10.2	10.3	5.3	7.6	5.6	6.0	6.5
% America Latina	6.1	5.7	5.7	3.3	4.3	3.4	5.0	4.2	3.6	3.5	0.0	5.3
% USA e Canada	0.0	1.5	1.1	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	0.3	0.4	3.1	0.8
% Altro	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.6	1.1	0.3	0.4

Nazione												
% Marocco	20.6	22.4	23.4	28.8	25.2	22.9	21.7	23.9	20.2	24.9	22.0	23.2
% Tunisia	20.0	12.5	14.9	16.5	27.2	27.5	29.5	25.6	29.1	26.3	26.7	18.3
% Albania	7.8	6.5	8.4	2.9	5.6	4.7	3.2	5.3	4.6	1.8	5.3	5.3
% Romania	5.6	6.5	7.7	7.4	6.6	4.2	11.7	7.4	8.6	7.4	6.6	3.7

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 5 - Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	24	31	43	42	45	25	26	23	20	21	15	18
% nuovi contatti**	87.5	80.6	90.7	69.0	77.8	80.0	84.6	95.7	100.0	95.2	100.0	94.4
età media	16.3	16.1	16.3	16.3	16.1	16.1	16.3	16.2	15.8	16.4	16.1	16.2
% maschi	70.8	67.7	55.8	69.0	75.6	84.0	88.5	60.9	85.0	85.7	60.0	44.4
% femmine	29.2	32.3	44.2	31.0	24.4	16.0	11.5	39.1	15.0	14.3	40.0	55.6
% nativi	87.5	67.7	67.4	76.2	71.1	76.0	69.2	78.3	45.0	71.4	80.0	88.9
% non nativi	12.5	32.3	32.6	23.8	28.9	24.0	30.8	21.7	55.0	28.6	20.0	11.1
% residenti area metropolitana	83.3	87.1	90.7	81.0	80.0	84.0	88.5	87.0	75.0	81.0	73.3	88.9
% residenti fuori area metropolitana	16.7	12.9	7.0	16.7	15.6	16.0	11.5	13.0	15.0	19.0	26.7	11.1
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	2.3	2.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% oppioidi	0.0	6.5	16.3	16.7	17.8	16.0	11.5	13.0	5.0	9.5	20.0	22.2
di cui % eroina	0.0	3.2	11.6	14.3	17.8	16.0	7.7	4.3	5.0	9.5	13.3	22.2
% cocaina	8.3	9.7	20.9	9.5	20.0	12.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
di cui % solo cocaina	8.3	9.7	18.6	7.1	20.0	8.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
% cannabinoidi	87.5	74.2	74.4	66.7	57.8	72.0	69.2	52.2	60.0	66.7	46.7	50.0
di cui % solo cannabinoidi	83.3	64.5	53.5	61.9	40.0	60.0	57.7	47.8	60.0	66.7	40.0	38.9
% altre sostanze illegali	8.3	19.4	14.0	23.8	24.4	20.0	42.3	26.1	40.0	19.0	40.0	44.4
% abuso concomitante di psicofarmaci	8.3	6.5	4.7	4.8	2.2	8.0	3.8	17.4	0.0	4.8	20.0	0.0
di cui % benzodiazepine	4.2	3.2	2.3	0.0	2.2	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	6.7	0.0
% anche alcol	12.5	12.9	14.0	14.3	11.1	24.0	19.2	17.4	25.0	28.6	13.3	5.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	3.8	0.0	5.0	4.8	6.7	0.0
% Ospedale	4.2	9.7	18.6	11.9	6.7	8.0	19.2	21.7	0.0	4.8	13.3	16.7
% Psichiatria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Pronto soccorso	50.0	61.3	58.1	54.8	31.1	44.0	46.2	47.8	75.0	52.4	46.7	66.7
% SERT	50.0	35.5	34.9	42.9	66.7	60.0	38.5	26.1	25.0	47.6	46.7	27.8
di cui % anche Carcere Minorile	0.0	0.0	7.0	7.1	13.3	-	-	-	-	-	-	-
di cui % anche Carcere	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.0	3.8	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 6 - Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	21	25	39	29	35	20	22	22	20	20	15	17
età media	16.1	15.9	16.3	16.1	16.1	16.0	16.4	16.3	15.8	16.4	16.1	16.2
% maschi	71.4	64.0	56.4	75.9	82.9	80.0	86.4	59.1	85.0	85.0	60.0	47.1
% femmine	28.6	36.0	43.6	24.1	17.1	20.0	13.6	40.9	15.0	15.0	40.0	52.9
% nativi	85.7	72.0	69.2	75.9	68.6	80.0	63.6	77.3	45.0	70.0	80.0	88.2
% non nativi	14.3	28.0	30.8	24.1	31.4	20.0	36.4	22.7	55.0	30.0	20.0	11.8
% residenti area metropolitana	81.0	84.0	89.7	79.3	80.0	85.0	86.4	86.4	75.0	80.0	73.3	88.2
% residenti fuori area metropolitana	19.0	16.0	7.7	17.2	14.3	15.0	13.6	13.6	15.0	20.0	26.7	11.8
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	2.6	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% oppioidi	0.0	4.0	10.3	6.9	14.3	15.0	9.1	13.6	5.0	10.0	20.0	17.6
di cui % eroina	0.0	0.0	5.1	3.4	14.3	15.0	4.5	4.5	5.0	10.0	13.3	17.6
% cocaina	9.5	4.0	20.5	6.9	17.1	5.0	9.1	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
di cui % solo cocaina	9.5	4.0	20.5	3.4	17.1	0.0	9.1	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
% cannabinoidi	85.7	72.0	76.9	72.4	57.1	70.0	68.2	50.0	60.0	65.0	46.7	47.1
di cui % solo cannabinoidi	81.0	68.0	56.4	69.0	42.9	65.0	59.1	45.5	60.0	65.0	40.0	41.2
% altre sostanze illegali	9.5	24.0	15.4	27.6	25.7	25.0	50.0	27.3	40.0	20.0	40.0	47.1
% abuso concomitante di psicofarmaci	9.5	4.0	5.1	3.4	2.9	10.0	4.5	18.2	0.0	5.0	20.0	0.0
di cui % benzodiazepine	9.5	0.0	2.6	0.0	2.9	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	6.7	0.0
% anche alcol	14.3	12.0	12.8	20.7	11.4	25.0	22.7	18.2	25.0	30.0	13.3	5.9
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	4.5	0.0	5.0	5.0	6.7	0.0

% Ospedale	4.8	8.0	20.5	17.2	5.7	10.0	22.7	22.7	0.0	5.0	13.3	17.6
% Psichiatria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Pronto soccorso	57.1	68.0	61.5	75.9	37.1	50.0	50.0	50.0	75.0	55.0	46.7	70.6
% SERT	42.9	28.0	30.8	17.2	60.0	50.0	31.8	22.7	25.0	45.0	46.7	23.5
di cui % anche Carcere Minorile	0.0	0.0	5.1	3.4	14.3	-	-	4.5	-	-	-	-
di cui % anche Carcere	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 7 - Consumo problematico di oppioidi*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	2038	2110	2094	2138	2281	2418	2600	2495	2877	3019	2872	2923
% nuovi contatti**	8.8	10.1	9.7	10.3	11.9	11.8	16.9	11.6	14.0	15.4	17.6	16.8
età media	44.3	43.6	42.9	42.2	41.3	41.0	41.0	39.7	39.5	39.3	37.3	36.8
% maschi	78.7	78.8	78.8	78.3	79.0	79.9	78.7	80.1	79.3	79.4	80.1	79.8
% femmine	21.3	21.2	21.2	21.7	21.0	20.1	21.3	19.9	20.7	20.6	19.9	20.2
% nativi	80.8	81.2	81.1	81.5	80.0	79.1	79.3	80.0	81.3	81.5	81.1	82.5
% non nativi	19.0	18.6	18.7	18.2	19.8	20.8	20.4	19.8	18.7	18.5	18.9	17.5
% residenti area metropolitana	80.0	81.5	78.6	81.0	73.5	74.7	74.3	71.6	71.7	72.1	68.9	69.6
% residenti fuori area metropolitana	16.3	15.7	18.9	15.5	24.2	23.4	23.5	26.2	27.0	27.8	28.7	30.2
% senza fissa dimora (SFD)	8.7	6.5	7.1	7.0	6.4	6.7	7.0	6.3	4.6	4.1	7.2	6.7
% decesso overdose	0.2	0.6	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	0.4	0.3	0.1	0.2

di cui % solo oppioidi	65.5	70.0	70.2	72.4	78.2	78.7	80.9	83.3	75.2	78.4	83.3	69.6
di cui % eroina	94.0	93.3	94.8	94.4	94.3	95.0	90.8	94.7	90.3	87.0	95.1	92.9
% cocaina	34.5	30.0	29.8	27.6	21.8	21.3	19.1	16.7	24.7	21.6	16.7	30.4
% cannabinoidi	7.2	6.9	7.5	7.6	9.2	6.9	7.3	8.0	10.5	8.9	7.0	11.3
% altre sostanze illegali	4.6	3.8	5.3	4.5	3.6	3.8	7.3	3.7	7.0	5.0	1.7	5.1
% abuso concomitante di psicofarmaci	1.6	2.7	2.7	2.4	4.6	3.3	3.4	2.4	3.8	5.0	3.6	6.6
di cui % benzodiazepine	1.2	1.6	1.5	1.4	2.3	1.7	1.6	1.7	3.5	2.6	1.6	3.1
% anche alcol	9.1	8.5	9.2	8.3	8.2	9.0	9.5	8.2	18.6	18.2	22.3	23.5
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	42.3	42.8	43.7	44.7	45.0	44.9	43.4	46.6	43.4	44.7	50.1	46.6

% Ospedale	4.5	4.2	5.8	5.4	4.8	4.0	5.2	4.7	4.9	3.8	3.5	3.6
% Psichiatria	4.5	4.1	4.0	3.6	3.6	4.4	3.7	2.3	2.1	1.7	1.5	1.4
% Pronto soccorso	5.4	13.2	8.2	6.6	6.0	5.7	12.8	11.3	11.6	10.5	6.9	7.7
% SERT	94.7	93.7	95.1	95.5	94.5	94.7	90.3	94.3	88.4	87.2	93.5	89.9
di cui % anche Carcere	11.2	10.8	12.2	12.5	15.1	17.0	17.1	17.6	18.4	17.4	17.2	13.6
di cui % anche Unità Mobile Metadone	7.2	6.1	6.6	6.5	6.4	7.1	7.0	5.3	4.8	4.9	6.7	5.9

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di oppioidi

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 8 - Consumo problematico di oppioidi*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	180	214	203	221	272	285	439	289	402	465	506	492
età media	38.9	38.9	37.2	36.7	34.7	37.3	41.7	35.0	35.1	36.6	33.0	32.4
% maschi	74.4	75.7	78.8	75.6	78.3	80.0	70.6	81.7	81.3	78.5	83.4	80.5
% femmine	25.6	24.3	21.2	24.4	21.7	20.0	29.4	18.3	18.7	21.5	16.6	19.5
% nativi	68.3	66.4	60.1	62.4	55.1	62.1	68.3	59.5	62.9	66.2	61.9	70.3
% non nativi	31.1	33.6	38.9	37.1	44.9	37.9	30.8	39.8	37.1	33.8	38.1	29.7
% residenti area metropolitana	54.4	53.3	40.9	55.7	41.2	47.0	52.6	37.7	38.1	47.3	35.8	39.2
% residenti fuori area metropolitana	37.2	39.7	52.7	38.9	50.7	48.8	42.4	54.0	59.2	52.5	58.1	60.4
% senza fissa dimora (SFD)	11.7	7.0	12.3	9.5	11.8	10.2	10.9	9.7	8.0	3.7	13.4	8.3
% decesso overdose	0.0	3.3	1.0	1.8	1.8	2.8	2.1	2.1	2.0	0.9	0.2	0.0

di cui % solo oppioidi	63.9	66.4	58.1	60.6	72.1	73.0	81.8	78.5	80.8	83.9	86.2	70.1
di cui % eroina	68.3	64.0	79.8	82.4	76.5	80.0	64.0	76.8	84.6	73.5	87.7	85.6
% cocaina	36.1	33.6	41.9	39.4	27.9	27.0	18.2	21.5	19.2	16.1	13.8	29.9
% cannabinoidi	5.6	6.5	8.9	10.4	11.4	6.0	9.6	16.6	9.5	6.2	6.3	12.2
% altre sostanze illegali	4.4	6.5	5.4	2.3	1.8	2.1	10.5	2.8	4.5	7.3	1.2	5.1
% abuso concomitante di psicofarmaci	0.6	6.1	4.4	6.3	7.0	7.4	3.6	4.2	5.5	6.7	5.3	9.8
di cui % benzodiazepine	0.0	1.9	1.5	1.8	2.9	2.5	0.2	2.8	2.7	1.7	0.8	2.0
% anche alcol	7.8	6.1	5.4	6.3	5.1	8.4	8.9	4.5	11.7	14.4	11.1	11.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	20.0	17.3	22.2	24.9	15.4	18.2	18.7	20.1	29.6	24.3	28.9	20.3

% Ospedale	22.2	22.4	15.8	14.0	11.8	15.1	14.6	11.8	5.5	8.0	5.3	4.9
% Psichiatria	3.9	4.7	2.0	0.0	0.7	1.4	3.6	1.7	1.0	0.2	1.6	0.8
% Pronto soccorso	13.9	22.0	18.7	15.8	15.1	11.9	30.5	18.7	20.9	20.2	12.3	16.3
% SERT	67.8	58.4	72.4	79.2	74.3	73.3	56.0	72.7	75.6	71.6	81.4	68.5
di cui % anche Carcere	16.1	13.1	25.6	25.8	32.0	21.8	17.5	28.4	38.6	28.8	30.4	27.6
di cui % anche Unità Mobile Metadone	13.9	9.8	14.3	13.6	11.8	15.4	15.0	12.1	9.5	6.9	14.6	6.7

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di oppioidi

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 9 - Consumo problematico di cocaina*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1505	1487	1370	1289	1121	1091	1033	933	1115	1023	955	1282
% nuovi contatti**	17.8	24.2	25.0	26.0	25.5	24.1	25.4	25.7	21.3	23.1	23.8	21.8
età media	39.8	39.0	38.8	38.6	38.1	37.9	38.0	37.9	38.0	38.0	37.3	35.7
% maschi	82.3	82.6	84.2	83.6	84.6	84.8	85.7	87.0	85.6	85.4	86.0	86.0
% femmine	17.7	17.4	15.8	16.4	15.4	15.2	14.3	13.0	14.4	14.6	14.0	14.0
% nativi	73.3	72.4	71.9	72.2	71.5	70.9	71.0	73.0	76.4	79.0	77.8	75.1
% non nativi	26.6	27.4	28.0	27.6	28.5	28.9	28.8	26.7	23.6	21.0	22.2	24.9
% residenti area metropolitana	72.4	73.4	70.7	71.1	67.3	68.3	67.2	67.8	67.7	69.8	67.0	60.5
% residenti fuori area metropolitana	24.1	23.9	26.9	25.8	30.2	30.0	30.3	29.9	30.9	30.0	32.1	39.4
% senza fissa dimora (SFD)	8.6	5.6	5.7	5.5	5.6	5.0	6.7	4.9	5.5	4.6	6.0	8.4
% decesso overdose	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4

di cui % solo cocaina	53.3	57.4	54.5	54.2	55.6	52.7	51.9	55.4	36.1	36.4	49.8	30.6
% oppioidi	46.7	42.6	45.5	45.8	44.4	47.3	48.1	44.6	63.9	63.6	50.2	69.4
% cannabinoidi	11.8	13.0	13.9	14.0	15.1	12.4	11.0	10.1	13.0	8.8	6.7	13.0
% altre sostanze illegali	6.0	5.2	6.3	8.5	5.5	6.1	9.5	5.4	9.2	7.5	2.3	6.5
% abuso concomitante di psicofarmaci	2.3	3.7	3.1	3.6	3.9	3.2	3.2	3.0	7.8	6.5	5.4	8.9
di cui % benzodiazepine	1.3	2.0	1.8	1.9	2.0	1.4	1.5	1.3	3.7	2.7	1.8	3.5
% anche alcol	18.7	18.6	15.7	16.0	17.3	17.3	16.8	15.4	21.7	19.8	30.9	31.0
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	22.0	21.0	22.7	23.9	24.7	25.2	26.6	27.0	30.8	32.8	29.3	30.0

% Ospedale	7.4	6.7	8.2	9.6	7.9	6.5	6.1	6.4	5.7	6.3	4.8	3.9
% Psichiatria	5.7	4.8	4.2	5.3	6.4	8.2	6.9	3.8	2.4	2.7	1.9	1.6
% Pronto soccorso	11.5	17.6	14.2	14.7	13.5	12.5	14.7	18.8	17.4	14.7	10.6	7.7
% SERT	84.8	83.1	84.2	83.9	83.4	84.6	83.7	84.2	85.1	85.6	84.2	85.1
di cui % anche Carcere	22.8	22.5	25.0	27.5	27.2	31.6	31.3	28.4	27.6	27.9	28.3	26.4
di cui % anche Unità Mobile Metadone	5.3	4.2	5.3	5.2	5.0	1.9	6.7	4.4	5.4	5.0	3.5	6.9

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cocaina

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 10 - Consumo problematico di cocaina*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	268	360	342	335	286	263	262	240	237	236	227	279
età media	36.8	34.6	34.2	34.7	34.0	34.7	33.6	34.2	34.3	35.5	35.6	32.2
% maschi	83.6	83.9	87.4	86.6	86.4	87.1	86.6	90.8	91.1	86.0	88.5	88.2
% femmine	16.4	16.1	12.6	13.4	13.6	12.9	13.4	9.2	8.9	14.0	11.5	11.8
% nativi	65.3	64.7	60.5	62.1	52.8	63.5	64.1	65.8	63.3	70.8	74.0	67.4
% non nativi	34.3	35.0	39.5	37.9	47.2	36.1	35.5	33.8	36.7	29.2	26.0	32.6
% residenti area metropolitana	59.0	60.8	53.2	53.7	43.7	52.1	50.8	55.4	49.8	59.7	55.1	37.6
% residenti fuori area metropolitana	36.2	36.1	43.6	42.4	50.7	46.0	45.0	41.3	48.1	40.3	43.2	62.4
% senza fissa dimora (SFD)	5.6	3.1	6.4	5.4	7.0	4.2	9.5	6.3	5.9	1.7	5.7	7.9
% decesso overdose	0.4	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0

di cui % solo cocaina	75.7	80.0	75.1	74.0	73.4	70.7	69.5	74.2	67.5	68.2	69.2	47.3
% oppioidi	24.3	20.0	24.9	26.0	22.7	29.3	30.5	25.8	32.5	31.8	30.8	52.7
% cannabinoidi	12.3	17.2	19.3	23.6	26.2	19.0	19.1	18.8	19.0	8.5	4.4	13.6
% altre sostanze illegali	4.5	5.0	4.4	7.5	3.8	5.7	13.0	3.8	5.5	11.9	1.3	3.2
% abuso concomitante di psicofarmaci	3.7	4.4	3.2	3.0	2.4	3.0	3.1	3.8	5.1	8.5	7.0	8.6
di cui % benzodiazepine	2.2	3.1	2.3	1.8	1.0	0.8	1.1	0.8	3.0	2.5	0.9	1.1
% anche alcol	23.9	21.1	17.3	14.6	13.6	14.8	16.0	17.9	17.7	19.9	26.0	20.8
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	7.5	6.9	9.6	10.4	8.0	8.4	11.5	12.1	12.2	8.9	12.3	10.4

% Ospedale	16.8	10.6	8.2	12.5	8.0	8.7	9.2	5.0	3.4	11.0	7.9	4.3
% Psichiatria	4.1	2.8	2.6	0.0	2.8	4.6	8.0	5.4	2.5	2.1	1.8	1.1
% Pronto soccorso	21.3	26.7	24.0	26.6	21.0	17.9	23.7	31.3	28.3	29.2	21.1	10.4
% SERT	61.9	65.6	69.3	69.3	73.4	74.9	68.7	65.4	64.1	62.3	66.5	70.3
di cui % anche Carcere	21.6	23.6	28.4	33.4	39.5	35.4	26.0	30.8	35.9	30.9	28.2	39.8
di cui % anche Unità Mobile Metadone	4.5	2.8	7.0	5.4	5.6	6.1	10.7	6.3	5.9	3.8	3.5	4.3

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cocaina

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 11 - Consumo problematico di cannabinoidi*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	567	613	592	570	583	512	533	530	572	472	401	560
% nuovi contatti**	27.9	34.7	38.9	40.9	35.8	33.8	41.7	47.4	35.3	31.4	29.9	26.3
età media	34.7	33.7	33.3	33.36	34.26	33.37	33.0	32.2	34.39	33.54	33.22	32.8
% maschi	86.4	86.1	85.5	85.6	85.8	84.8	87.2	88.7	85.5	86.0	87.8	86.1
% femmine	13.6	13.9	14.5	14.4	14.2	15.2	12.8	11.3	14.5	14.0	12.2	13.9
% nativi	72.1	68.7	67.9	70.7	70.8	71.3	66.8	69.8	76.2	80.3	80.5	77.5
% non nativi	27.9	31.0	32.1	29.3	29.2	28.5	32.8	30.0	23.8	19.7	19.5	22.5
% residenti area metropolitana	74.3	76.2	73.0	73.0	69.3	73.6	69.4	67.5	76.2	77.3	72.1	68.2
% residenti fuori area metropolitana	24.5	23.0	26.0	25.6	28.5	25.6	29.3	31.3	23.4	22.7	27.4	31.8
% senza fissa dimora (SFD)	4.4	2.0	3.2	3.3	3.1	2.9	3.8	2.8	3.8	3.6	5.5	6.3
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.2

di cui % solo cannabinoidi	45.3	46.2	44.4	42.1	37.4	44.1	44.1	46.4	34.4	33.1	38.7	24.3
% cocaina	31.2	31.6	32.3	31.8	29.0	26.4	21.4	17.7	25.3	19.1	16.0	29.8
% oppioidi	25.9	23.8	26.5	28.4	35.8	32.8	35.6	37.7	52.6	57.0	49.9	59.1
% altre sostanze illegali	6.5	7.8	8.3	9.1	6.5	8.8	10.9	6.6	8.7	7.0	5.2	8.4
% abuso concomitante di psicofarmaci	2.3	3.6	2.5	1.9	1.9	2.9	3.2	3.2	6.5	5.1	4.5	3.9
di cui % benzodiazepine	1.1	2.0	1.7	0.5	0.5	0.8	0.8	1.3	3.3	3.2	2.0	2.0
% anche alcol	18.2	15.8	16.9	15.6	16.6	15.6	17.1	14.2	22.0	16.7	24.4	24.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	9.2	9.6	10.1	10.9	14.1	10.2	9.6	11.1	17.8	23.5	19.7	20.5

% Ospedale	9.3	12.1	14.2	10.7	10.6	11.3	9.8	10.8	8.0	6.4	6.7	5.5
% Psichiatria	11.5	9.1	6.4	7.9	8.7	10.4	7.9	5.7	3.8	4.4	3.7	2.9
% Pronto soccorso	17.8	23.7	23.8	22.1	15.3	13.5	19.5	26.2	18.4	16.9	11.2	7.1
% SERT	69.7	67.4	66.9	70.9	76.7	75.2	71.9	69.8	76.6	81.4	80.0	85.0
di cui % anche Carcere	19.4	19.2	21.1	23.2	23.2	24.8	26.6	21.9	17.0	14.6	17.0	20.7
di cui % anche Unità Mobile Metadone	2.3	0.7	1.4	0.9	1.4	0.8	1.9	0.9	2.4	2.3	1.2	3.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cannabinoidi

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 12 - Consumo problematico di cannabinoidi*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	158	213	230	233	209	173	222	251	202	148	120	147
età media	28.8	28.6	27.6	29.2	29.6	29.6	29.6	28.4	30.4	29.3	29.7	28.3
% maschi	83.5	87.3	83.5	87.6	87.1	83.8	86.0	87.6	87.1	83.1	86.7	87.8
% femmine	16.5	12.7	16.5	12.4	12.9	16.2	14.0	12.4	12.9	16.9	13.3	12.2
% nativi	72.8	62.9	63.0	63.9	54.1	66.5	60.8	68.1	65.3	71.6	80.0	68.7
% non nativi	27.2	36.6	37.0	36.1	45.9	33.5	38.3	31.9	34.7	28.4	20.0	31.3
% residenti area metropolitana	66.5	65.7	66.1	60.9	51.2	63.6	60.8	60.6	67.8	66.2	67.5	49.0
% residenti fuori area metropolitana	31.6	33.3	32.2	37.3	44.0	35.8	38.3	38.2	31.2	33.8	31.7	51.0
% senza fissa dimora (SFD)	1.3	0.9	0.9	1.7	4.8	2.3	2.7	2.8	2.5	0.7	2.5	2.7
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.8	0.0

di cui % solo cannabinoidi	72.8	66.2	64.3	57.5	50.7	62.4	59.9	64.1	62.9	68.2	66.7	37.4
% cocaina	20.9	29.1	28.7	33.9	35.9	28.9	22.5	17.9	22.3	13.5	8.3	25.9
% oppioidi	6.3	6.6	7.8	9.9	14.8	9.8	18.9	19.1	18.8	19.6	26.7	40.8
% altre sostanze illegali	3.8	6.6	6.5	4.3	5.3	6.4	11.7	5.6	5.0	3.4	4.2	5.4
% abuso concomitante di psicofarmaci	4.4	3.3	3.9	3.0	0.0	4.0	3.6	2.8	4.5	6.1	5.0	2.0
di cui % benzodiazepine	3.2	2.8	3.5	1.3	0.0	0.6	0.9	0.8	1.0	3.4	2.5	0.7
% anche alcol	24.7	16.0	17.8	15.0	13.4	16.2	15.3	15.1	24.8	21.6	15.0	10.9
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	1.4	1.7	5.2	5.3	0.0	4.5	2.0	4.0	4.1	9.2	9.5

% Ospedale	13.9	15.0	15.7	11.6	10.0	15.6	14.4	11.2	8.9	10.8	13.3	9.5
% Psichiatria	5.1	5.2	2.6	0.0	5.3	4.0	9.0	6.0	2.0	2.0	1.7	2.0
% Pronto soccorso	39.9	37.6	42.6	38.6	24.4	24.9	27.5	37.8	30.7	31.1	25.8	13.6
% SERT	42.4	46.5	47.0	55.4	65.1	61.3	55.4	54.2	52.0	56.1	63.3	72.8
di cui % anche Carcere	12.7	20.2	15.2	25.3	30.1	26.0	23.9	20.7	22.3	18.2	10.8	36.7
di cui % anche Unità Mobile Metadone	3.8	0.5	0.9	1.3	1.9	1.2	1.4	1.6	1.5	2.0	0.0	2.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cannabinoidi

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 13 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	2674	2778	2667	2673	2770	2853	2864	2871	2933	3032	3189	3026
% mai stato in precedenza al SERT**	10.8	15.7	14.8	15.3	15.5	15.6	14.7	13.2	14.3	15.1	16.7	17.8
% re-ingresso al SERT	5.9	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
età media	42.2	41.5	41.2	40.7	40.1	39.6	39.3	38.8	38.1	37.5	36.8	36.4
% maschi	82.2	81.9	81.7	81.7	81.6	82.1	82.4	82.3	81.5	81.8	81.8	81.3
% femmine	17.8	18.1	18.3	18.3	18.4	17.9	17.6	17.7	18.5	18.2	18.2	18.7
% nativi	78.4	78.5	78.6	78.6	78.1	77.6	76.9	78.2	78.8	79.6	80.5	82.2
% non nativi	21.4	21.3	21.3	21.3	21.8	22.4	23.0	21.6	21.2	20.4	19.5	17.8
% residenti area metropolitana	78.4	80.5	78.1	79.0	73.1	74.6	73.5	71.7	70.4	70.1	69.6	71.3
% residenti fuori area metropolitana	18.5	17.0	19.5	17.5	24.6	23.8	24.6	26.4	28.3	29.7	28.5	28.5
% senza fissa dimora (SFD)	7.7	5.9	6.4	6.5	6.2	5.9	6.6	5.7	4.3	4.0	5.9	5.7
% decesso overdose	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

% eroina	70.7	69.3	72.6	73.8	75.8	78.8	79.7	80.4	82.5	82.6	82.5	72.9
% cocaina	45.5	42.3	41.2	38.7	31.9	30.8	28.9	25.8	23.2	21.5	23.1	19.2
% cannabinoidi	14.4	14.2	14.1	14.4	15.3	13.0	13.0	12.3	10.5	9.9	9.6	7.6
% crack	1.2	1.1	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4
% amfetamine	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2
% ecstasy	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2

% benzodiazepine	1.4	1.6	1.4	1.4	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.2	1.1
% tramadolo	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
% codeina	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
% ossicodone	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% anche gioco	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
% anche alcol	9.1	7.9	6.4	6.8	6.1	7.0	6.3	6.3	5.8	6.1	5.4	5.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	32.9	33.2	35.2	36.5	37.6	38.7	40.0	41.1	42.7	44.8	46.1	45.0

% Ospedale	2.8	2.5	4.6	4.0	3.4	2.4	2.6	2.8	3.4	2.8	2.6	2.7
% Psichiatria	4.0	3.4	3.4	3.5	3.6	4.5	3.7	2.3	2.2	1.7	1.4	1.3
% Pronto soccorso	4.4	9.7	5.6	4.9	4.2	4.0	7.1	8.4	8.4	6.7	4.5	4.6
% anche Carcere	16.0	16.0	16.6	17.9	18.7	20.9	22.0	21.5	23.5	22.5	20.2	15.9
% anche Unità Mobile Metadone	5.5	5.0	5.7	5.3	5.4	6.0	6.3	4.6	4.8	4.8	6.1	5.2

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 14 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche utenti con re-ingresso in carico al SERT. Periodo 2019-2020

	2020**	2019***
Numero totale	157	212
età media	39.5	40.8
% maschi	81.5	85.8
% femmine	18.5	14.2
% nativi	72.6	74.1
% non nativi	27.4	25.9
% residenti area metropolitana	67.5	73.1
% residenti fuori area metropolitana	21.0	22.2
% senza fissa dimora (SFD)	19.7	11.8
% decesso overdose	0.6	0.0

% eroina	65.6	62.3
% cocaina	61.1	54.2
% cannabinoidi	7.6	10.8
% crack	1.9	0.9
% amfetamine	0.6	0.0

% benzodiazepine	0.0	1.4
% anche gioco	0.0	0.5
% anche alcol	10.2	9.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	19.1	22.6

% Ospedale	4.5	1.9
% Psichiatria	1.9	3.8
% Pronto soccorso	3.2	11.8
% anche Carcere	25.5	32.5
% anche Unità Mobile Metadone	16.6	11.3

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

** nuove prese in carico nel 2020 di soggetti già stati utenti SERT negli anni precedenti

*** nuove prese in carico nel 2019 di soggetti già stati utenti SERT negli anni precedenti

Tab. 15 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	290	435	396	408	429	444	422	380	420	459	532	539
età media	34.5	34.3	33.3	33.9	32.8	33.1	32.8	32.6	32.4	32.1	31.6	31.9
% maschi	84.8	84.8	86.9	85.8	86.0	86.5	84.1	87.9	85.0	85.2	86.5	85.2
% femmine	15.2	15.2	13.1	14.2	14.0	13.5	15.9	12.1	15.0	14.8	13.5	14.8
% nativi	67.2	66.0	64.4	63.5	56.2	67.8	62.8	66.3	59.3	65.4	63.5	69.6
% non nativi	32.4	33.8	35.6	36.5	43.8	32.2	37.0	33.2	40.7	34.6	36.5	30.4
% residenti area metropolitana	61.7	65.1	58.1	58.6	50.3	57.4	53.3	53.7	43.3	43.8	41.7	46.2
% residenti fuori area metropolitana	32.8	31.0	36.6	37.0	43.1	39.9	42.9	42.9	53.8	55.8	54.5	53.6
% senza fissa dimora (SFD)	9.0	5.7	10.6	7.6	9.6	8.1	12.3	7.9	6.9	2.6	8.3	4.1
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0

% eroina	39.3	32.2	40.9	42.6	46.2	55.0	56.4	52.4	61.7	60.8	68.4	55.5
% cocaina	57.9	60.5	60.1	56.9	52.7	49.5	44.8	40.8	30.7	27.2	24.6	24.5
% cannabinoidi	23.4	26.4	28.0	30.9	32.9	24.1	28.2	32.6	21.4	15.3	12.4	13.0
% crack	2.1	3.2	2.5	2.0	0.7	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4
% amfetamine	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	1.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6
% ecstasy	1.0	0.5	0.5	0.0	0.9	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0

% benzodiazepine	0.7	1.6	2.3	1.2	1.4	2.3	0.0	1.8	1.2	1.1	0.8	1.3
% tramadolo	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0
% codeina	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% ossicodone	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% anche gioco	0.3	0.5	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
% anche alcol	10.7	9.9	4.0	4.9	6.1	6.8	7.1	8.2	5.5	5.2	3.4	4.1
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	12.8	11.3	13.1	15.2	11.9	17.1	21.6	16.1	25.0	20.3	24.6	23.7

% Ospedale	2.8	3.7	5.3	5.1	3.0	3.8	2.1	2.6	1.4	2.2	1.7	3.0
% Psichiatria	3.4	1.8	1.5	1.0	2.6	4.3	5.2	2.6	1.2	1.5	1.1	0.9
% Pronto soccorso	3.8	8.3	6.8	6.4	4.7	5.0	7.8	7.9	6.2	5.0	3.9	5.4
% anche Carcere	23.1	26.0	28.0	32.1	38.5	30.9	30.6	32.9	46.0	43.1	37.6	40.3
% anche Unità Mobile Metadone	9.7	5.7	10.4	8.8	7.9	11.3	14.9	8.4	8.6	5.9	12.0	3.2

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 16 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	384	665	523	482	488	393	609	660	632	487	406	469
% nuovi contatti**	44.3	41.5	50.1	52.9	53.1	47.6	53.7	52.1	50.9	49.5	57.4	59.1
età media	38.1	38.6	37.6	37.7	37.9	37.3	41.5	36.2	37.0	37.8	36.5	39.2
% maschi	75.8	75.2	77.6	79.0	74.4	76.8	68.0	78.6	77.7	75.8	76.4	73.1
% femmine	24.2	24.8	22.4	21.0	25.6	23.2	32.0	21.4	22.3	24.2	23.6	26.9
% nativi	70.3	73.1	70.9	72.6	70.5	73.5	78.5	78.8	80.7	82.8	73.6	81.9
% non nativi	28.9	26.6	28.3	27.0	28.9	26.2	20.9	20.9	19.3	17.2	26.4	18.1
% residenti area metropolitana	69.3	73.7	69.0	67.8	69.1	71.8	75.2	71.7	67.4	73.5	68.0	72.5
% residenti fuori area metropolitana	27.9	23.2	29.8	29.7	27.0	27.7	23.8	26.5	32.4	26.3	30.0	27.3
% senza fissa dimora (SFD)	3.9	5.4	3.8	4.8	2.9	2.8	3.8	5.3	3.8	3.9	6.9	4.7
% decesso overdose	0.3	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.2	0.2

% oppioidi	28.9	42.0	32.7	29.3	28.3	34.9	54.7	42.9	53.0	64.9	48.8	48.2
di cui % eroina	21.9	35.3	27.0	23.4	20.9	27.5	37.3	35.5	45.7	43.9	35.2	32.6
% cocaina	45.1	39.4	37.3	39.4	30.9	34.6	25.0	26.5	30.7	30.8	24.9	21.1
di cui % solo cocaina	31.0	24.1	23.1	25.9	20.5	22.1	12.2	15.8	12.5	11.7	11.3	6.0
% cannabinoidi	26.3	21.8	27.0	26.1	18.2	17.6	17.1	21.1	16.6	16.4	11.1	8.5
di cui % solo cannabinoidi	16.1	12.2	19.5	17.8	10.5	13.7	11.7	13.2	10.6	7.8	6.7	5.1
% altre sostanze illegali	43.2	27.4	38.2	41.1	57.0	37.7	46.5	41.1	40.5	34.1	36.2	58.4
% abuso concomitante di psicofarmaci	9.6	16.7	17.4	14.5	14.8	19.6	21.8	10.5	16.1	20.1	17.5	25.2
di cui % benzodiazepine	4.9	10.7	10.7	8.3	5.9	8.4	10.7	4.1	8.9	8.4	7.6	11.7
% anche alcol	39.8	32.9	38.2	39.8	37.7	39.7	33.7	32.0	40.5	27.3	43.3	46.1
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	13.0	19.5	12.4	12.2	10.5	16.0	20.7	21.1	25.2	26.1	22.4	19.8

% Ospedale	14.3	9.6	13.6	14.9	9.0	10.9	11.7	10.0	10.8	9.2	13.8	13.6
% Psichiatria	7.0	4.8	3.6	3.1	4.1	6.6	3.8	3.5	2.7	2.9	2.0	2.3
% SERT	30.7	40.6	28.7	27.4	23.8	29.3	33.3	36.7	38.8	41.9	35.2	29.9
di cui % anche Carcere	2.1	3.5	2.3	4.4	4.3	3.6	4.6	3.8	4.4	4.5	6.9	2.1
di cui % anche Unità Mobile Metadone	2.9	5.4	3.3	3.9	2.0	2.3	3.4	3.6	3.5	3.5	3.7	3.4

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 17 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	170	276	262	255	259	187	327	344	322	241	233	277
età media	32.8	33.7	32.1	33.8	35.5	33.6	42.0	31.9	34.1	35.1	33.8	38.8
% maschi	75.9	78.3	75.6	78.4	72.2	77.0	62.7	78.8	78.3	72.6	72.5	71.8
% femmine	24.1	21.7	24.4	21.6	27.8	23.0	37.3	21.2	21.7	27.4	27.5	28.2
% nativi	64.7	66.3	62.2	68.2	64.5	65.8	74.3	71.5	73.0	75.1	67.8	76.5
% non nativi	34.1	33.0	36.3	31.0	34.4	33.7	25.1	28.5	27.0	24.9	32.2	23.5
% residenti area metropolitana	52.4	58.0	54.2	57.3	54.4	57.2	64.8	62.5	52.5	62.7	60.1	63.5
% residenti fuori area metropolitana	42.9	38.0	43.9	38.8	40.2	42.2	34.6	35.5	47.2	37.3	37.8	36.1
% senza fissa dimora (SFD)	2.4	1.4	1.1	2.4	1.2	1.1	1.8	1.2	1.2	1.2	2.6	1.8
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0

% oppioidi	14.7	17.0	14.5	13.7	15.8	18.2	41.0	15.7	26.1	39.0	26.6	28.9
di cui % eroina	5.9	8.3	9.9	8.2	6.6	11.8	16.8	7.8	17.4	10.8	11.6	10.8
% cocaina	33.5	34.8	31.3	34.9	23.2	25.1	19.0	21.8	20.8	28.6	20.6	10.5
di cui % solo cocaina	28.8	29.0	24.0	29.0	18.5	20.3	14.1	18.9	16.1	17.8	14.6	6.5
% cannabinoidi	37.1	29.0	37.4	35.3	19.7	23.0	18.7	27.6	19.3	19.1	13.3	7.2
di cui % solo cannabinoidi	30.0	21.0	32.4	26.7	15.1	21.4	15.6	22.4	17.1	14.5	10.3	6.1
% altre sostanze illegali	32.4	31.9	33.6	34.1	52.9	39.6	43.1	49.1	45.0	40.2	49.8	64.3
% abuso concomitante di psicofarmaci	8.2	13.8	13.4	12.2	10.8	15.5	22.3	7.3	8.1	16.6	15.0	18.4
di cui % benzodiazepine	4.1	10.5	8.8	8.6	3.1	7.0	11.0	1.7	4.0	5.8	6.0	7.2
% anche alcol	34.7	29.3	31.7	31.8	28.6	30.5	25.7	25.6	33.9	21.2	28.8	34.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	1.2	1.8	1.1	2.4	0.8	2.1	3.4	1.5	3.7	4.6	3.9	2.5

% Ospedale	8.8	5.8	8.8	9.0	3.1	4.8	7.6	5.8	6.2	5.4	13.3	7.2
% Psichiatria	1.2	0.4	1.5	0.0	1.5	0.5	1.2	3.2	0.0	0.4	1.3	0.7
% SERT	3.5	8.3	8.8	8.2	3.5	7.5	6.7	6.7	7.5	10.0	10.3	5.8
di cui % anche Carcere	0.6	0.7	0.8	2.0	1.9	1.6	0.9	2.0	1.9	0.8	2.1	1.1
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.8	2.5	1.1	2.7	0.8	1.1	1.8	0.9	1.6	2.1	2.1	1.4

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 18 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	238	314	318	279	285	287	310	242	245	261	326	214
% nuovi contatti**	52.9	62.1	46.9	45.5	47.7	55.4	58.1	46.7	39.6	57.5	57.7	47.2
età media	43.5	43.4	43.2	42.5	45.6	45.7	45.0	44.4	45.5	48.4	47.3	42.0
% maschi	71.4	60.8	64.8	66.7	68.8	65.9	66.8	66.9	66.9	62.5	52.1	55.6
% femmine	28.6	39.2	35.2	33.3	31.2	34.1	33.2	33.1	50.6	60.2	47.9	44.4
% nativi	79.4	75.2	78.9	84.2	86.0	82.6	84.8	83.1	99.6	105.4	86.8	87.9
% non nativi	20.6	24.5	20.8	15.1	14.0	17.4	15.2	16.9	18.0	17.2	13.2	12.1
% residenti area metropolitana	87.4	88.2	86.2	86.7	87.0	86.8	90.3	87.2	102.4	104.2	83.4	83.2
% residenti fuori area metropolitana	11.8	11.1	13.5	12.2	12.6	12.9	9.4	12.0	15.1	18.4	16.6	16.4
% senza fissa dimora (SFD)	4.6	2.2	2.8	4.7	1.1	2.8	2.6	2.5	4.1	1.1	2.1	3.7
% decesso overdose	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5

% oppioidi	38.2	28.3	38.1	41.6	38.6	33.4	43.9	48.8	57.6	44.4	30.4	46.7
di cui % eroina	18.9	12.7	26.4	26.9	23.5	16.0	21.0	28.5	40.8	30.7	22.1	32.2
% cocaina	46.6	31.8	35.5	44.4	30.9	24.7	20.3	24.8	25.7	24.5	14.1	21.0
di cui % solo cocaina	30.3	21.3	19.8	25.1	18.6	15.3	10.6	10.3	8.2	9.2	6.7	7.9
% cannabinoidi	22.3	23.6	26.4	21.9	21.8	20.2	16.8	23.6	18.8	11.5	8.3	12.1
di cui % solo cannabinoidi	11.8	13.7	14.2	11.8	9.8	11.8	12.3	14.5	9.0	6.1	4.6	7.9
% altre sostanze illegali	45.0	46.5	46.2	49.5	47.4	49.1	45.8	30.6	51.8	59.8	58.3	60.3
% abuso concomitante di psicofarmaci	10.9	22.9	19.8	14.7	25.3	25.8	24.5	28.1	40.4	37.9	50.6	28.5
di cui % benzodiazepine	3.8	15.9	13.2	4.3	15.8	15.3	16.1	20.7	27.3	29.1	15.3	7.9
% anche alcol	27.7	23.9	27.0	33.7	24.9	28.9	30.0	24.4	32.7	24.5	18.4	26.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	14.3	8.0	15.4	17.6	18.6	10.5	13.5	19.8	20.4	20.7	15.3	22.0

% Psichiatria	10.1	8.3	6.9	8.2	11.6	14.3	9.0	7.4	7.8	5.0	2.5	5.6
% Pronto soccorso	23.1	20.4	22.3	25.8	15.4	15.0	22.9	27.3	27.8	19.9	17.2	29.4
% SERT	31.1	22.3	39.0	38.4	32.6	24.0	23.9	32.6	41.2	32.6	25.5	38.3
di cui % anche Carcere	2.5	1.3	2.5	3.6	3.5	1.4	2.3	0.8	4.9	3.1	4.9	0.5
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.7	1.9	1.9	2.9	1.1	1.4	1.3	1.2	4.1	1.9	0.6	0.9

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 19 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	126	195	149	127	136	159	180	113	97	150	188	101
età media	44.5	46.5	44.7	42.9	50.0	48.7	46.8	48.0	44.8	45.8	51.5	44.0
% maschi	67.5	55.9	59.1	61.4	65.4	62.3	61.7	54.0	53.6	50.0	41.0	50.5
% femmine	32.5	44.1	40.9	38.6	34.6	37.7	38.3	46.0	42.3	50.0	59.0	49.5
% nativi	77.0	75.4	76.5	81.9	85.3	81.1	82.8	84.1	78.4	80.0	86.7	85.1
% non nativi	23.0	24.1	22.8	16.5	14.7	18.9	17.2	15.9	17.5	20.0	13.3	14.9
% residenti area metropolitana	85.7	84.6	79.2	78.7	77.9	80.5	85.6	82.3	81.4	75.3	79.8	73.3
% residenti fuori area metropolitana	13.5	14.4	20.1	19.7	21.3	18.9	13.9	16.8	14.4	24.7	20.2	26.7
% senza fissa dimora (SFD)	0.8	0.0	1.3	1.6	0.0	1.9	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% oppioidi	31.7	24.6	21.5	24.4	23.5	27.0	35.6	30.1	22.7	24.7	11.2	23.8
di cui % eroina	1.6	2.6	5.4	5.5	0.0	3.8	4.4	3.5	5.2	6.0	1.6	7.9
% cocaina	35.7	19.5	18.8	33.1	16.9	14.5	13.3	10.6	8.2	17.3	5.3	11.9
di cui % solo cocaina	29.4	14.9	16.1	26.0	14.7	10.1	7.8	5.3	7.2	11.3	4.8	8.9
% cannabinoidi	17.5	16.4	24.2	21.3	15.4	17.0	17.8	24.8	18.6	10.7	4.8	13.9
di cui % solo cannabinoidi	12.7	11.3	17.4	17.3	11.0	12.6	14.4	20.4	16.5	7.3	2.1	11.9
% altre sostanze illegali	38.9	40.0	38.3	46.5	41.2	39.6	40.0	22.1	55.7	64.7	81.9	63.4
% abuso concomitante di psicofarmaci	7.1	25.1	24.2	15.0	26.5	25.8	24.4	37.2	20.6	10.7	63.8	17.8
di cui % benzodiazepine	3.2	19.0	18.8	3.9	20.6	17.0	17.8	30.1	10.3	2.7	18.6	5.0
% anche alcol	19.8	12.8	12.1	20.5	13.2	17.6	17.2	9.7	21.6	13.3	5.9	18.8
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	1.6	1.5	1.3	3.1	0.0	1.3	0.6	0.9	1.0	2.7	0.5	3.0

% Psichiatria	4.0	2.1	5.4	0.0	3.7	3.1	4.4	6.2	2.1	0.7	4.3	11.9
% Pronto soccorso	11.9	8.2	15.4	18.1	5.9	5.7	13.9	17.7	20.6	8.7	12.8	19.8
% SERT	4.0	5.6	10.1	12.6	3.7	5.7	2.2	5.3	4.1	6.7	2.1	7.9
di cui % anche Carcere	0.0	0.5	0.0	1.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.5	0.7	2.4	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 20 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	266	220	186	191	189	273	258	129	111	89	80	76
% nuovi contatti**	15.4	16.8	15.1	0.0	13.2	11.0	34.1	24.0	20.7	13.5	21.3	21.1
età media	40.3	39.1	41.3	40.4	37.9	37.9	39.4	38.7	38.9	39.4	38.3	37.7
% maschi	73.7	73.6	71.0	69.6	70.4	70.7	73.3	75.2	72.1	71.9	73.8	75.0
% femmine	26.3	26.4	29.0	30.4	29.6	29.3	26.7	24.8	27.9	28.1	26.3	25.0
% nativi	87.2	91.4	88.7	89.0	88.9	90.5	91.5	94.6	91.0	93.3	93.8	94.7
% non nativi	12.8	7.7	10.2	8.9	9.5	8.8	7.0	4.7	8.1	6.7	6.3	5.3
% residenti area metropolitana	87.6	87.7	90.3	91.6	91.5	92.7	89.5	86.8	84.7	93.3	91.3	93.4
% residenti fuori area metropolitana	12.4	11.4	8.6	6.3	6.3	6.2	8.5	12.4	13.5	6.7	8.8	5.3
% senza fissa dimora (SFD)	1.9	1.8	2.7	1.0	0.5	2.6	1.6	2.3	1.8	1.1	1.3	1.3
% decesso overdose	0.0	0.9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% oppioidi	34.2	39.5	45.2	39.8	42.9	38.8	37.2	45.0	54.1	56.2	55.0	52.6
di cui % eroina	25.9	30.9	38.7	34.0	37.0	34.8	29.8	41.1	45.0	49.4	45.0	44.7
% cocaina	32.3	32.3	31.2	35.6	38.1	32.6	27.5	27.1	24.3	31.5	22.5	26.3
di cui % solo cocaina	20.7	21.4	21.0	21.5	23.3	21.2	20.2	16.3	10.8	13.5	10.0	7.9
% cannabinoidi	24.4	25.5	20.4	23.6	27.0	19.4	16.3	23.3	19.8	23.6	18.8	21.1
di cui % solo cannabinoidi	16.2	15.5	10.2	13.1	13.2	12.8	11.6	16.3	11.7	11.2	13.8	11.8
% altre sostanze illegali	53.4	48.2	50.0	55.5	33.9	54.6	56.2	55.8	60.4	58.4	50.0	63.2
% abuso concomitante di psicofarmaci	4.9	4.1	3.2	2.6	6.3	5.9	3.9	7.8	9.9	3.4	5.0	7.9
di cui % benzodiazepine	1.9	1.4	1.6	2.1	2.1	2.9	2.7	3.1	5.4	3.4	3.8	3.9
% anche alcol	17.3	17.7	17.7	19.9	18.5	20.5	22.5	17.8	19.8	19.1	32.5	34.2
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	17.7	20.5	24.2	23.0	26.5	24.2	21.3	23.3	27.0	27.0	27.5	31.6

% Ospedale	9.0	11.8	11.8	12.0	17.5	15.0	10.9	14.0	17.1	14.6	10.0	15.8
% Pronto soccorso	10.2	14.5	10.2	7.9	10.6	9.5	8.9	17.8	15.3	15.7	10.0	14.5
% SERT	40.2	43.2	49.5	49.2	52.9	47.3	41.5	51.2	57.7	59.6	56.3	52.6
di cui % anche Carcere	0.0	0.9	1.1	3.1	3.7	2.9	2.3	1.6	0.9	4.5	3.8	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 21 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	41	37	28	0	25	30	88	31	23	12	17	16
età media	37.3	33.1	33.0	-	32.6	32.9	31.6	30.0	39.7	30.2	37.5	36.3
% maschi	61.0	64.9	78.6	-	72.0	63.3	73.9	71.0	56.5	58.3	76.5	62.5
% femmine	39.0	35.1	21.4	-	28.0	36.7	26.1	29.0	43.5	41.7	23.5	37.5
% nativi	80.5	94.6	85.7	-	60.0	86.7	79.5	93.5	73.9	100.0	88.2	93.8
% non nativi	19.5	5.4	14.3	-	32.0	13.3	15.9	6.5	21.7	0.0	11.8	6.3
% residenti area metropolitana	63.4	59.5	64.3	-	84.0	83.3	80.7	77.4	56.5	91.7	88.2	81.3
% residenti fuori area metropolitana	36.6	40.5	35.7	-	8.0	16.7	14.8	22.6	34.8	8.3	11.8	12.5
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	3.6	-	0.0	3.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	2.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% oppioidi	17.1	27.0	14.3	-	8.0	13.3	18.2	16.1	17.4	8.3	47.1	25.0
di cui % eroina	7.3	5.4	7.1	-	8.0	6.7	4.5	9.7	8.7	8.3	17.6	12.5
% cocaina	26.8	27.0	32.1	-	32.0	40.0	23.9	41.9	26.1	41.7	23.5	18.8
di cui % solo cocaina	22.0	21.6	28.6	-	28.0	36.7	22.7	32.3	21.7	41.7	11.8	12.5
% cannabinoidi	19.5	29.7	21.4	-	44.0	23.3	22.7	48.4	17.4	25.0	11.8	18.8
di cui % solo cannabinoidi	14.6	21.6	14.3	-	28.0	20.0	17.0	29.0	17.4	16.7	5.9	18.8
% altre sostanze illegali	58.5	37.8	64.3	-	44.0	56.7	53.4	51.6	56.5	50.0	47.1	56.3
% abuso concomitante di psicofarmaci	4.9	2.7	3.6	-	4.0	3.3	1.1	12.9	4.3	0.0	0.0	6.3
di cui % benzodiazepine	2.4	0.0	3.6	-	4.0	3.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
% anche alcol	4.9	5.4	14.3	-	12.0	13.3	12.5	19.4	8.7	16.7	23.5	18.8
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	7.3	2.7	0.0	-	0.0	0.0	3.4	3.2	4.3	0.0	0.0	0.0

% Ospedale	12.2	10.8	28.6	-	20.0	16.7	9.1	22.6	8.7	8.3	11.8	6.3
% Pronto soccorso	4.9	2.7	14.3	-	16.0	3.3	4.5	35.5	0.0	8.3	17.6	12.5
% SERT	14.6	8.1	17.9	-	24.0	23.3	11.4	25.8	17.4	41.7	35.3	18.8
di cui % anche Carcere	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 22 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	2622	2902	2799	2723	2671	2827	3354	2901	3087	2837	2976	2927
% nuovi contatti**	36.0	40.4	40.9	40.4	40.0	40.6	49.9	47.7	48.6	50.2	42.4	37.1
età media	50.3	49.5	49.6	49.1	49.0	49.0	47.8	47.1	47.6	47.3	46.7	45.9
%maschi	73.1	73.1	73.4	73.5	72.7	74.0	73.0	74.6	74.6	75.4	75.0	75.4
%femmine	26.9	26.9	26.6	26.5	27.3	26.0	27.0	25.4	25.4	24.6	25.0	24.6
%nativi	75.1	74.7	74.4	73.8	75.6	77.0	72.6	75.2	74.7	77.9	79.4	80.5
%non nativi	24.7	24.5	24.8	25.0	23.5	22.7	24.8	24.6	25.3	22.0	20.6	19.5
%residenti area metropolitana	85.0	83.5	82.4	82.2	82.3	84.1	79.9	80.4	79.9	81.7	82.1	80.7
%residenti fuori area metropolitana	13.6	14.6	16.6	15.4	15.2	14.8	19.2	17.2	19.7	18.3	16.3	19.1
%senza fissa dimora (SFD)	2.9	2.3	2.5	2.5	2.1	2.1	2.3	2.5	2.0	1.8	4.3	3.8
%decesso overdose	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2

%abuso concomitante di sostanze illegali	23.2	21.1	19.9	19.5	20.9	18.8	16.7	17.6	29.2	28.9	32.6	35.4
di cui % oppioidi	7.1	6.2	6.9	6.5	7.0	7.7	7.3	7.0	17.3	19.4	21.7	23.4
di cui % cocaina	10.7	9.5	7.7	7.6	7.3	6.7	5.2	5.0	7.8	7.2	9.9	13.6
di cui % cannabinoidi	3.9	3.3	3.6	3.3	3.6	2.8	2.7	2.6	4.1	2.8	3.3	4.7
di cui % altre sostanze illegali	4.2	3.5	4.6	4.6	5.5	3.6	4.7	4.2	7.4	6.1	4.8	8.2

% abuso concomitante di psicofarmaci	3.8	5.1	4.5	4.5	5.0	6.4	4.6	3.7	8.7	6.6	5.2	7.9
% Ospedale	20.4	19.6	20.6	22.0	22.9	21.5	21.9	22.0	21.2	22.7	22.7	21.0
% Psichiatria	10.9	7.9	8.0	8.2	8.4	14.6	12.2	6.7	6.0	6.3	5.2	5.0
% Pronto Soccorso	38.9	45.8	48.4	44.8	44.8	41.1	50.0	51.4	49.2	44.4	26.6	29.3
% SERT	46.4	44.0	43.9	43.5	43.7	44.2	36.3	41.5	36.2	40.0	42.1	41.5
di cui % anche Carcere	3.7	3.1	2.5	3.0	3.1	3.7	2.2	2.0	2.2	2.5	4.1	2.6
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.9	0.8	1.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9	1.9	2.3

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 23 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	944	1171	1144	1101	1069	1147	1672	1384	1500	1424	1262	1086
età media	47.4	46.0	46.5	46.3	46.1	46.6	45.3	44.0	45.6	45.5	46.4	44.4
% maschi	72.0	73.4	73.1	72.3	67.1	75.0	71.9	73.6	73.7	74.8	73.5	76.5
% femmine	28.0	26.6	26.9	27.7	31.2	25.0	28.1	26.5	26.6	25.2	26.4	23.3
% residenti area metropolitana	68.6	67.4	65.8	66.6	67.1	71.4	65.1	67.5	65.5	71.0	71.0	70.5
% residenti fuori area metropolitana	30.9	30.9	32.6	31.2	31.2	28.2	31.1	33.4	33.7	31.5	33.5	29.8
% senza fissa dimora (SFD)	75.2	72.1	70.7	70.6	70.7	74.6	70.8	70.1	70.7	71.6	71.4	68.9
% decesso overdose	23.0	25.1	28.0	26.2	25.7	24.1	28.6	25.8	29.2	28.3	26.7	29.4
% maschi	0.7	0.3	0.6	0.9	0.9	1.0	0.7	1.1	0.6	0.2	2.7	1.7
% femmine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0

% abuso concomitante di sostanze illegali	14.2	13.6	11.5	11.9	12.9	10.6	9.4	10.3	13.7	13.8	13.2	17.6
di cui % oppioidi	1.5	1.1	1.0	1.3	1.3	2.1	2.3	0.9	3.1	4.7	4.8	5.2
di cui % cocaina	6.8	6.5	5.2	4.5	3.6	3.4	2.5	3.1	2.8	3.4	4.7	5.3
di cui % cannabinoidi	4.1	2.9	3.6	3.2	2.6	2.4	2.0	2.7	3.3	2.2	1.4	1.5
di cui % altre sostanze illegali	3.5	2.5	2.7	3.0	5.1	2.9	3.6	3.6	5.1	5.5	4.4	8.3

% abuso concomitante di psicofarmaci	4.4	4.7	3.8	5.5	4.0	6.4	4.3	2.3	5.3	4.8	4.8	6.1
% Ospedale	30.1	22.5	21.3	26.2	25.0	26.8	25.7	20.7	21.6	26.7	33.3	32.2
% Psichiatria	2.5	2.1	2.4	0.2	2.9	3.7	7.4	3.0	3.3	3.6	3.4	4.8
% Pronto Soccorso	58.4	64.4	67.7	64.5	64.2	60.9	69.2	71.7	73.9	68.0	55.9	57.8
% SERT	15.8	18.7	17.8	20.2	15.8	16.8	13.3	15.8	13.3	14.3	17.4	16.3
di cui % anche Carcere	2.1	3.5	1.2	2.2	2.7	2.3	0.9	1.2	0.7	1.1	0.9	2.5
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.5	0.0	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.9	0.6

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 24 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	648	711	694	680	627	643	832	713	781	625	612	572
% nuovi contatti**	45.1	50.9	53.7	50.4	53.3	50.2	53.2	45.6	46.1	46.1	32.1	37.0
età media	41.3	41.3	41.4	40.6	39.8	40.6	39.6	39.4	39.2	39.2	38.2	38.5
% maschi	74.8	73.6	73.9	72.9	72.4	71.7	72.8	73.2	73.2	74.2	76.6	75.0
% femmine	25.2	26.4	26.1	27.1	27.6	28.3	27.2	26.8	26.8	25.8	23.4	25.0
% residenti area metropolitana	66.7	62.7	61.8	61.6	60.9	62.2	60.2	58.3	58.3	61.3	60.9	58.7
% residenti fuori area metropolitana	30.1	34.0	35.9	34.4	33.3	35.1	37.7	33.7	41.1	38.7	35.3	40.7
% senza fissa dimora (SFD)	4.5	4.4	4.0	3.4	4.1	3.3	3.4	4.5	3.2	3.7	6.5	4.7
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0

% abuso concomitante di sostanze illegali	22.1	19.7	17.4	16.8	18.8	15.7	12.9	13.5	20.6	18.2	23.5	27.8
di cui % oppioidi	4.3	4.8	4.0	4.3	4.3	4.8	4.0	3.6	9.2	10.2	13.1	15.4
di cui % cocaina	11.3	9.3	7.3	7.1	6.9	6.5	4.2	3.1	5.4	4.0	6.5	11.4
di cui % cannabinoidi	5.2	4.8	4.2	3.5	3.7	3.0	3.0	3.6	4.4	1.8	1.5	3.3
di cui % altre sostanze illegali	4.5	3.4	4.5	5.1	5.6	2.6	3.7	3.6	7.0	5.9	5.6	8.2
% abuso concomitante di psicofarmaci	3.1	5.5	3.2	4.6	4.5	5.4	3.8	3.5	5.6	4.2	3.4	8.6

% Ospedale	17.0	15.3	17.1	17.6	18.3	17.0	16.3	13.7	13.6	15.8	15.7	14.0
% Psichiatria	6.6	4.4	5.5	4.6	4.9	7.9	7.1	2.9	3.8	4.2	2.5	4.0
% Pronto Soccorso	50.2	57.7	61.1	59.9	60.4	54.9	66.0	68.9	70.3	62.6	50.8	47.4
% SERT	40.6	38.5	37.9	35.9	33.8	37.6	27.6	31.4	24.2	29.0	30.7	29.5
di cui % anche Carcere	7.9	6.6	5.8	6.9	8.0	8.7	4.8	4.5	3.7	4.2	8.2	8.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.7	2.4	2.9	2.1	1.9	2.2	1.8	2.1	1.8	2.2	3.4	4.2

Area provenienza												
% Europa Est	44.6	43.9	43.7	45.6	45.6	43.1	45.3	40.7	36.4	39.2	35.3	34.6
% Altri paesi europei	7.6	8.3	8.4	8.1	6.4	8.4	7.2	8.1	8.5	8.2	11.8	12.1
% Africa Mediterranea	23.3	24.3	22.2	22.2	26.8	25.3	25.5	25.8	23.6	25.1	30.4	27.1
% Altra Africa	9.0	8.2	7.9	6.3	6.1	7.0	6.1	5.9	6.1	8.5	7.0	8.2
% Asia	8.0	8.6	9.4	9.1	8.3	10.6	9.7	8.3	10.2	9.4	8.5	9.4
% America Latina	6.3	5.9	7.3	7.6	5.6	4.8	5.0	4.8	6.4	5.9	5.9	6.3
% USA e Canada	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.4	0.8	1.0	1.9
% Altro	0.5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	5.5	8.5	2.9	0.2	0.3

Nazione												
% Marocco	17.3	17.4	17.6	15.0	19.3	18.4	18.6	19.1	17.7	18.4	20.8	17.5
% Romaniaa	13.7	17.3	14.1	17.1	17.9	16.6	20.4	16.8	15.1	13.3	12.4	12.2
% Polonia	6.9	6.5	7.3	5.9	6.1	7.2	6.4	5.9	7.2	7.7	6.7	7.5
% Ucraina	5.7	5.8	6.1	5.9	5.6	4.5	4.2	4.3	3.2	4.5	5.6	3.5
% Tunisia	4.8	5.5	3.5	5.4	5.6	4.8	4.6	4.3	4.4	4.5	5.4	4.7

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 25 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	292	362	373	343	334	323	504	446	516	412	365	320
età media	39.1	38.3	39.3	38.5	37.5	37.7	37.9	37.5	37.7	37.4	36.4	36.8
% maschi	77.4	75.1	75.3	72.6	75.4	75.9	74.8	74.2	74.2	74.0	76.7	75.3
% femmine	22.6	24.9	24.7	27.4	24.6	24.1	25.2	25.8	25.8	26.0	23.3	24.7
% residenti area metropolitana	58.9	53.0	53.1	52.5	54.2	52.9	52.8	52.0	51.4	57.0	56.7	75.3
% residenti fuori area metropolitana	38.4	44.8	44.8	44.6	41.3	45.8	46.2	37.4	48.4	43.0	38.9	24.7
% senza fissa dimora (SFD)	1.0	0.6	1.1	1.2	1.8	0.9	0.8	1.3	1.4	1.2	5.5	2.5
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0

% abuso concomitante di sostanze illegali	16.8	14.9	12.9	12.0	14.1	10.2	7.7	9.6	13.0	10.7	11.0	13.8
di cui % oppioidi	1.7	1.9	1.3	1.2	1.5	2.2	1.4	1.6	2.7	3.4	4.1	4.4
di cui % cocaina	7.9	6.4	6.4	4.7	5.7	2.5	2.6	2.2	2.3	2.2	2.2	3.4
di cui % cannabinoidi	4.5	4.4	4.3	3.5	3.0	3.4	1.6	2.9	3.9	1.0	0.5	0.6
di cui % altre sostanze illegali	4.1	2.2	3.5	2.9	4.8	2.8	3.2	2.7	5.2	5.3	5.8	6.6

% abuso concomitante di psicofarmaci	4.5	5.0	2.4	4.7	3.0	4.6	3.0	2.2	3.7	3.4	2.5	6.9
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

% Ospedale	24.3	15.2	16.4	16.3	16.2	17.3	15.5	10.5	11.8	16.3	18.6	18.1
% Psichiatria	3.1	1.1	1.9	0.0	2.1	1.2	3.8	0.7	1.9	2.9	0.8	3.4
% Pronto Soccorso	64.0	70.7	74.5	72.3	73.7	70.0	74.8	81.2	83.9	76.9	72.1	70.9
% SERT	15.4	19.9	17.7	16.3	15.6	15.8	11.9	14.3	9.5	12.1	13.7	11.6
di cui % anche Carcere	3.8	7.7	2.9	4.1	7.2	5.3	2.4	3.1	1.4	1.7	3.8	3.1
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.7	0.0	1.1	0.6	0.6	0.9	0.4	0.7	0.6	1.0	0.8	0.9

Area provenienza												
% Europa Est	44.2	45.0	43.2	43.1	43.4	44.6	45.8	43.0	37.6	41.0	36.4	37.2
% Altri paesi europei	6.2	7.7	7.2	7.6	5.1	7.1	6.2	6.5	7.6	7.5	8.5	8.4
% Africa Mediterranea	22.3	22.7	20.9	19.0	27.2	22.3	25.6	24.0	19.8	22.6	32.3	25.3
% Altra Africa	9.2	9.1	7.8	8.5	6.0	6.5	5.8	4.7	6.2	9.0	6.8	9.7
% Asia	9.6	9.9	11.0	11.7	10.5	13.9	10.5	8.3	10.9	9.5	9.9	11.3
% America Latina	6.8	4.4	8.0	9.0	5.7	4.6	4.8	3.8	6.0	5.6	5.2	5.9
% USA e Canada	0.7	1.1	1.6	1.2	1.5	0.9	1.2	1.3	0.4	0.5	0.5	2.2
% Altro	1.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.2	8.3	11.6	4.4	0.3	0.0

Nazione												
% Marocco	17.8	14.9	18.0	12.8	20.1	17.0	18.7	17.5	15.1	17.5	24.9	19.7
% Romaniaa	14.0	20.2	13.9	17.2	17.7	18.3	22.4	18.4	17.4	14.1	14.5	15.0
% Polonia	5.1	3.6	7.0	5.2	3.6	5.9	5.0	4.7	6.6	7.0	6.3	9.1
% Ucraina	4.5	4.7	6.2	5.2	4.8	5.3	3.8	4.3	2.3	4.1	5.5	3.4
% Tunisia	3.4	6.4	2.9	5.2	6.6	4.6	5.2	4.7	4.1	4.4	5.5	3.4

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 26 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	30	28	29	33	24	51	44	40	26	37	34	19
% nuovi contatti**	100.0	92.9	96.6	100.0	91.7	96.1	100.0	97.5	100.0	100.0	97.1	100.0
età media	15.5	16.2	16.0	15.7	16.0	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
% maschi	60.0	42.9	55.2	54.5	58.3	64.7	61.4	65.0	57.7	70.3	64.7	78.9
% femmine	40.0	57.1	44.8	45.5	41.7	35.3	38.6	35.0	42.3	29.7	35.3	21.1
% nativi	96.7	82.1	86.2	78.8	87.5	74.5	90.9	80.0	80.8	83.8	70.6	78.9
% non nativi	3.3	17.9	13.8	21.2	12.5	25.5	9.1	20.0	19.2	16.2	29.4	21.1
% residenti area metropolitana	96.7	85.7	100.0	81.8	91.7	88.2	88.6	87.5	96.2	86.5	91.2	73.7
% residenti fuori area metropolitana	3.3	14.3	0.0	15.2	8.3	11.8	11.4	12.5	3.8	13.5	8.8	26.3
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% abuso concomitante di sostanze illegali	10.0	14.3	20.7	18.2	20.8	11.8	11.4	10.0	19.2	16.2	2.9	5.3
di cui % oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0
di cui % cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabinoidi	10.0	10.7	13.8	18.2	8.3	3.9	6.8	5.0	7.7	13.5	0.0	5.3
di cui % altre sostanze illegali	0.0	3.6	6.9	0.0	12.5	7.8	9.1	5.0	11.5	2.7	2.9	0.0
% abuso concomitante di psicofarmaci	0.0	0.0	10.3	3.0	0.0	3.9	11.4	0.0	3.8	2.7	5.9	0.0
% Ospedale	0.0	7.1	3.4	9.1	12.5	5.9	4.5	10.0	11.5	5.4	17.6	15.8
% Psichiatria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Pronto Soccorso	100.0	89.3	96.6	90.9	91.7	94.1	97.7	95.0	92.3	91.9	82.4	84.2
% SERT	0.0	3.6	0.0	0.0	8.3	2.0	0.0	0.0	2.7	2.9	0.0	0.0
di cui % anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
di cui % anche Carcere	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 27 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti minorenni. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	30	26	28	33	22	49	44	39	26	37	33	19
età media	15.5	11.0	15.9	15.7	15.9	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
% maschi	60.0	57.7	53.6	54.5	54.5	63.3	61.4	64.1	57.7	70.3	63.6	78.9
% femmine	40.0	100.0	46.4	45.5	45.5	36.7	38.6	35.9	42.3	29.7	36.4	21.1
% nativi	96.7	80.8	89.3	78.8	90.9	73.5	90.9	79.5	80.8	83.8	69.7	78.9
% non nativi	3.3	19.2	10.7	21.2	9.1	26.5	9.1	20.5	19.2	16.2	30.3	21.1
% residenti area metropolitana	96.7	84.6	100.0	81.8	90.9	87.8	88.6	87.2	96.2	86.5	90.9	73.7
% residenti fuori area metropolitana	3.3	15.4	0.0	15.2	9.1	12.2	11.4	12.8	3.8	13.5	9.1	26.3
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% abuso concomitante di sostanze illegali	10.0	11.5	17.9	18.2	18.2	10.2	11.4	10.3	19.2	16.2	3.0	5.3
di cui % oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
di cui % cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabinoidi	10.0	7.7	10.7	18.2	4.5	2.0	6.8	5.1	7.7	13.5	0.0	5.3
di cui % altre sostanze illegali	0.0	3.8	7.1	0.0	13.6	8.2	9.1	5.1	11.5	2.7	3.0	0.0

% abuso concomitante di psicofarmaci	0.0	0.0	10.7	3.0	0.0	4.1	11.4	0.0	3.8	2.7	6.1	0.0
--------------------------------------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

% Ospedale	0.0	7.7	3.6	9.1	9.1	6.1	4.5	10.3	11.5	5.4	18.2	15.8
% Psichiatria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Pronto Soccorso	100.0	92.3	96.4	90.9	100.0	93.9	97.7	94.9	92.3	91.9	81.8	84.2
% SERT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.0	0.0
di cui % anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
di cui % anche Carcere	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 28 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1216	1276	1229	1184	1167	1249	1216	1204	1116	1135	1252	1216
% mai stato in precedenza al SERT**	14.8	21.2	20.7	18.9	17.9	21.1	21.0	22.2	20.3	18.4	17.3	18.3
% re-ingresso al SERT	7.1	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
età media	48.9	48.8	49.1	48.8	48.8	48.3	48.2	47.8	48.2	47.9	47.9	47.7
% maschi	73.9	73.2	72.6	72.6	71.1	74.3	72.9	73.4	74.6	74.8	73.8	73.1
% femmine	26.1	26.8	27.4	27.4	28.9	25.7	27.1	26.6	25.4	25.2	26.2	26.9
% nativi	78.4	78.5	78.5	79.3	81.7	80.6	80.8	81.3	83.1	84.1	85.0	86.1
% non nativi	21.6	21.5	21.4	20.6	18.2	19.4	18.9	18.6	16.9	15.9	15.0	13.9
% residenti area metropolitana	88.9	92.1	91.1	91.3	90.1	90.6	91.6	90.1	90.0	90.3	90.6	90.6
% residenti fuori area metropolitana	9.9	7.2	8.0	7.5	9.1	8.4	7.7	9.1	9.7	9.7	9.1	8.5
% senza fissa dimora (SFD)	6.0	4.6	5.0	5.3	4.5	4.5	5.4	5.2	4.0	3.4	3.5	2.6
% decesso overdose	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0

% alcol primaria	78.7	79.3	84.1	82.3	82.9	83.8	85.0	84.6	84.4	82.8	85.1	81.5
% alcol secondaria	20.5	17.6	14.6	16.0	14.4	15.9	15.0	15.3	15.4	16.4	13.9	10.0

% abuso concomitante di sostanze illegali	36.3	30.6	29.4	27.3	26.6	25.5	24.5	24.8	38.4	26.1	29.7	22.5
di cui % eroina	10.7	9.0	9.4	9.0	9.4	10.9	10.8	11.6	12.5	13.0	11.3	11.9
di cui % cocaina	15.6	13.0	10.6	10.0	10.7	9.4	8.3	7.3	5.8	6.0	6.8	7.1
di cui % cannabinoidi	4.3	3.7	3.0	2.9	3.3	3.1	2.6	3.0	2.5	1.9	2.1	2.4
di cui % GHB	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
di cui % crack	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % amfetamine	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
di cui % ketamina	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
di cui % ecstasy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% benzodiazepine	2.2	1.8	1.3	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	0.9
% tramadolo	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
% codeina	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
% ossicodone	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

% anche gioco	1.2	1.1	0.9	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.0	0.5	0.5
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

% Ospedale	5.4	7.2	9.8	10.1	9.9	10.2	11.2	11.6	11.3	9.9	9.5	10.9
% Psichiatria	10.7	7.6	8.3	8.5	9.0	14.7	14.6	7.6	7.6	6.4	5.2	4.9
% Pronto Soccorso	10.3	13.8	16.8	13.2	13.6	12.4	15.0	15.5	15.7	13.5	7.2	8.4
% anche Carcere	7.7	6.3	5.5	6.6	6.3	7.8	5.1	4.0	3.3	4.5	4.2	2.2
% anche Unità Mobile Metadone	1.6	1.3	2.1	1.4	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	1.6	0.7	0.7

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 29 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche utenti con re-ingresso in carico al SERT. Periodo 2019-2020

	2020**	2019***
Numero totale	86	117
età media	47.7	49.6
% maschi	75.6	73.5
% femmine	24.4	26.5
% nativi	81.4	83.8
% non nativi	18.6	16.2
% residenti area metropolitana	91.9	93.2
% residenti fuori area metropolitana	5.8	6.8
% senza fissa dimora (SFD)	8.1	5.1
% decesso overdose	0.0	0.0

% alcol primaria	79.1	80.3
% alcol secondaria	22.1	17.9

% abuso concomitante di sostanze illegali	38.4	33.3
di cui % eroina	9.3	2.6
di cui % cocaina	19.8	20.5
di cui % cannabinoidi	4.7	2.6
% benzodiazepine	1.2	1.7

% anche gioco	2.3	5.1
---------------	-----	-----

% Ospedale	7.0	15.4
% Psichiatria	5.8	6.8
% Pronto Soccorso	10.5	22.2
% anche Carcere	8.1	6.8
% anche Unità Mobile Metadone	2.3	0.9

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** nuove prese in carico nel 2020 di soggetti già stati utenti SERT negli anni precedenti

*** nuove prese in carico nel 2019 di soggetti già stati utenti SERT negli anni precedenti

Tab. 30 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	180	270	254	224	209	264	255	267	227	209	217	223
età media	45.1	44.2	45.9	44.8	44.8	44.2	44.6	43.8	45.4	44.6	43.6	44.6
% maschi	70.6	74.8	71.3	73.7	67.5	73.1	71.0	68.5	74.0	70.8	78.3	77.6
% femmine	29.4	25.2	28.7	26.3	32.5	26.9	29.0	31.5	26.0	29.2	21.7	22.4
% nativi	65.6	68.1	67.3	67.4	71.3	75.8	72.2	70.0	76.7	75.6	74.2	81.6
% non nativi	34.4	31.9	32.7	32.6	28.7	24.2	27.5	30.0	23.3	24.4	25.8	18.4
% residenti area metropolitana	80.0	85.2	86.2	83.5	83.7	84.5	90.6	85.4	85.5	87.6	78.8	87.0
% residenti fuori area metropolitana	17.2	14.1	12.6	15.2	14.8	14.4	9.0	12.7	14.1	12.4	19.8	11.2
% senza fissa dimora (SFD)	5.6	2.6	3.1	5.8	5.7	4.2	4.7	8.6	5.3	3.8	6.0	1.3
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% alcol primaria	79.4	79.3	90.9	85.7	86.1	88.3	87.8	88.0	89.9	88.5	88.9	88.3
% alcol secondaria	17.2	15.6	6.3	9.8	13.4	11.0	11.8	11.6	10.1	11.5	8.3	6.7

% abuso concomitante di sostanze illegali	34.4	28.5	24.4	18.8	23.4	17.4	15.7	23.2	27.8	20.6	23.0	18.4
di cui % eroina	2.8	1.5	2.0	1.3	1.4	2.3	4.3	3.4	6.2	5.3	5.5	7.2
di cui % cocaina	20.6	17.0	11.4	10.7	12.9	11.7	9.4	9.4	7.9	7.7	7.8	9.0
di cui % cannabinoidi	6.7	5.9	4.7	3.1	2.9	5.3	3.1	6.7	4.8	3.3	3.2	3.1
di cui % GHB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % crack	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % amfetamine	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ecstasy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% benzodiazepine	1.7	1.5	0.0	0.0	0.5	0.8	1.2	1.1	0.9	0.5	0.9	0.9
% tramadolo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% codeina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% ossicodone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% anche gioco	0.6	0.0	0.4	1.8	0.5	1.1	1.2	0.7	0.4	0.0	0.0	1.8
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

% Ospedale	7.8	7.8	12.6	12.1	12.4	11.7	12.5	15.0	16.3	15.3	11.1	18.4
% Psichiatria	8.9	5.2	6.7	1.3	6.2	11.0	13.7	6.7	10.6	5.3	6.9	5.4
% Pronto Soccorso	11.7	12.6	19.3	13.4	18.2	13.6	17.6	19.5	20.7	17.7	9.2	13.5
% anche Carcere	6.7	14.1	6.7	11.2	12.0	13.3	6.7	6.4	3.5	4.3	9.7	4.5
% anche Unità Mobile Metadone	3.9	0.4	2.4	3.6	1.4	1.1	1.6	1.5	1.8	2.4	2.8	0.4

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 31 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	1020	1330	1355	1220	1196	1162	1678	1490	1520	1259	791	858
% nuovi contatti**	54.0	56.7	57.2	58.2	57.4	60.1	65.0	65.0	70.8	72.3	78.8	71.2
età media	48.5	47.9	47.7	46.5	46.2	46.1	45.1	43.9	45.3	43.7	42.4	42.3
% maschi	74.0	72.9	75.1	74.8	73.0	73.9	72.9	73.6	75.1	75.3	72.2	75.8
% femmine	26.0	27.1	24.9	25.2	27.0	26.1	27.1	26.4	24.9	24.7	27.8	24.2
% nativi	67.7	67.7	67.5	64.9	67.1	69.5	62.7	66.9	63.9	68.9	60.7	68.4
% non nativi	31.9	30.8	31.3	33.4	31.7	30.4	32.7	33.0	36.1	31.1	39.3	31.6
% residenti area metropolitana	78.1	73.4	73.2	72.3	73.7	74.6	69.0	70.7	69.7	71.2	69.3	68.5
% residenti fuori area metropolitana	19.9	23.5	26.0	24.2	22.0	24.2	30.0	25.1	30.0	28.8	28.2	31.4
% senza fissa dimora (SFD)	1.2	1.4	1.5	1.2	0.8	1.0	1.4	2.1	1.2	1.0	3.5	1.2
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

% abuso concomitante di sostanze illegali	14.2	16.4	16.4	16.6	20.2	14.2	13.7	15.7	20.7	21.8	15.2	23.7
di cui % oppioidi	2.5	3.1	4.7	4.0	5.2	4.6	4.7	4.8	8.7	12.2	5.8	6.4
di cui % cocaina	5.9	7.5	5.3	5.2	5.0	5.1	3.5	3.6	4.4	4.6	4.2	4.5
di cui % cannabinoidi	4.1	3.0	3.6	3.4	3.8	2.3	2.7	2.3	3.0	2.8	1.3	2.0
di cui % altre sostanze illegali	5.7	5.0	6.4	6.5	9.9	4.5	7.0	6.8	8.8	8.5	6.7	15.0

% abuso concomitante di psicofarmaci	6.0	8.4	7.6	7.9	8.1	12.4	7.1	5.5	8.9	7.9	6.1	12.4
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

% Ospedale	11.9	12.5	15.7	14.7	14.7	13.7	13.1	14.7	14.7	15.3	16.1	19.2
% Psichiatria	4.2	2.9	3.4	2.5	3.8	6.4	4.7	3.4	3.2	3.3	3.3	4.2
% SERT	12.3	13.2	15.3	12.8	13.3	13.3	10.9	14.9	11.5	12.2	11.4	11.9
di cui % anche Carcere	0.4	0.5	0.5	0.6	1.0	1.4	1.2	0.8	0.5	1.0	0.5	0.3
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.6	0.8	0.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.6	0.1	0.3

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 32 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti con accesso al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	551	754	775	710	686	698	1091	968	1076	910	623	611
età media	44.0	43.8	43.4	42.8	42.5	42.8	42.3	40.6	43.1	41.7	40.9	40.3
% maschi	73.3	72.7	74.3	72.8	70.8	74.1	72.1	73.6	74.3	74.5	71.3	76.3
% femmine	26.7	27.3	25.7	27.2	29.2	25.9	27.9	26.4	25.7	25.5	28.7	23.7
% nativi	65.3	63.5	62.2	62.1	62.4	67.5	58.7	62.5	59.8	65.2	57.8	62.8
% non nativi	33.9	34.0	35.9	34.9	35.9	32.4	34.6	37.4	40.2	34.8	42.2	37.2
% residenti area metropolitana	70.2	64.2	62.7	63.2	64.9	68.1	61.6	64.2	63.0	66.4	65.2	62.8
% residenti fuori area metropolitana	27.4	31.8	36.3	32.5	30.5	31.2	37.7	30.7	36.8	33.6	31.9	37.0
% senza fissa dimora (SFD)	0.5	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0	0.2	0.4	0.4	0.2	2.7	0.2
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0

% abuso concomitante di sostanze illegali	10.9	10.6	9.9	11.3	13.6	8.2	8.0	9.7	13.0	12.9	9.0	16.9
di cui % oppioidi	0.7	0.7	0.9	0.8	1.2	1.4	1.0	0.4	2.4	4.0	1.9	1.6
di cui % cocaina	3.6	4.4	3.1	2.8	2.8	1.7	1.6	2.3	1.9	1.8	1.8	1.8
di cui % cannabinoidi	3.8	2.4	3.4	3.4	2.5	1.9	1.8	2.2	2.8	2.1	1.1	1.0
di cui % altre sostanze illegali	4.5	2.8	3.1	3.9	6.7	2.9	4.5	5.0	6.0	6.8	5.1	12.3
% abuso concomitante di psicofarmaci	6.2	6.0	4.9	6.9	5.5	9.5	5.0	2.9	5.5	4.9	3.7	7.2
% Ospedale	6.9	6.8	7.6	7.0	6.6	7.6	6.7	7.6	7.2	9.9	11.4	11.9
% Psichiatria	0.4	0.3	0.3	0.0	0.7	0.9	1.6	1.0	1.0	1.1	0.6	1.6
% SERT	1.6	3.3	3.5	2.4	2.6	2.4	2.6	3.6	3.7	2.5	2.7	3.4
di cui % anche Carcere	0.4	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 33 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	535	569	577	600	611	608	736	637	654	644	676	614
% nuovi contatti**	53.1	46.4	42.3	48.2	43.7	50.5	52.4	46.3	48.6	60.7	65.5	55.5
età media	57.3	55.9	56.3	56.4	56.8	56.9	55.7	55.5	55.7	56.7	56.1	55.5
% maschi	72.3	73.5	71.4	72.7	74.5	78.0	75.8	76.9	75.8	77.2	77.1	75.7
% femmine	27.7	26.5	28.6	27.3	25.5	22.0	24.2	23.1	24.2	22.8	22.9	24.3
% nativi	79.3	80.8	79.4	79.5	80.7	81.9	81.3	84.0	83.8	84.6	85.8	87.0
% non nativi	20.6	19.2	20.6	20.0	18.8	17.9	18.5	15.4	16.2	15.4	14.2	13.0
% residenti area metropolitana	91.0	91.7	91.7	90.8	90.2	91.4	90.8	89.3	87.9	89.8	90.7	87.9
% residenti fuori area metropolitana	8.4	7.9	8.1	8.7	8.8	8.4	9.0	10.5	12.1	10.2	8.6	11.9
% senza fissa dimora (SFD)	0.9	1.9	2.8	1.2	1.3	2.1	2.2	2.0	1.7	1.1	2.2	1.6
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2

% abuso concomitante di sostanze illegali	15.0	16.3	18.5	17.5	15.7	14.8	14.7	12.7	21.7	20.0	14.6	16.4
di cui % oppioidi	5.2	5.3	6.2	6.7	5.1	5.9	8.3	3.8	11.5	11.8	6.2	8.1
di cui % cocaina	6.2	7.0	5.5	5.8	4.7	3.8	3.7	3.1	4.4	3.3	3.3	4.9
di cui % cannabinoidi	2.4	3.0	4.0	3.8	3.4	2.1	1.9	2.0	2.6	1.2	1.8	2.0
di cui % altre sostanze illegali	5.8	5.6	7.5	6.7	5.9	6.3	6.3	4.7	7.3	7.0	6.5	8.5

% abuso concomitante di psicofarmaci	3.9	6.2	7.3	7.2	6.9	6.1	6.3	6.0	10.1	6.7	6.7	8.5
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

% Pronto soccorso	22.6	29.2	36.9	29.8	28.8	26.2	29.9	34.4	34.1	30.0	18.8	26.9
% Psichiatria	4.5	3.5	6.2	4.2	6.1	9.9	7.9	4.4	6.9	5.0	4.1	6.4
% SERT	12.3	16.2	21.0	20.0	18.8	21.1	18.5	22.0	19.3	17.4	17.6	21.5
di cui % anche Carcere	0.0	0.9	0.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.4	0.9	1.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.5

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 34 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	284	264	244	289	267	307	386	295	318	391	443	341
età media	56.2	56.4	58.6	57.2	57.4	58.6	55.9	57.1	56.4	57.4	57.2	55.3
% maschi	70.1	73.5	71.3	69.6	70.4	79.2	74.9	74.6	73.9	77.7	76.1	76.0
% femmine	29.9	26.5	28.7	30.4	29.6	20.8	25.1	25.4	26.1	22.3	23.9	24.0
% nativi	75.0	79.2	75.0	79.9	79.4	81.4	79.8	83.1	80.8	82.9	84.7	83.0
% non nativi	25.0	20.8	25.0	19.4	20.2	18.2	20.2	15.9	19.2	17.1	15.3	17.0
% residenti area metropolitana	85.2	90.2	86.9	87.2	84.6	87.0	86.8	87.8	84.6	88.5	88.9	82.1
% residenti fuori area metropolitana	14.4	9.5	12.7	12.5	14.2	12.7	13.0	12.2	15.4	11.5	10.2	17.6
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.9	0.0	1.1	0.6
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% abuso concomitante di sostanze illegali	9.5	9.8	6.1	10.0	8.6	8.8	6.7	5.4	8.5	11.0	5.6	9.1
di cui % oppioidi	2.1	2.3	0.4	1.7	1.1	2.6	3.6	0.3	1.3	3.6	0.7	2.6
di cui % cocaina	3.9	3.4	2.5	3.1	1.1	1.3	1.3	0.7	1.3	1.5	0.7	2.1
di cui % cannabinoidi	2.5	0.4	2.5	2.4	2.6	2.0	0.8	0.7	2.5	0.8	1.6	0.9
di cui % altre sostanze illegali	3.2	3.0	2.5	2.8	3.4	3.6	2.1	3.1	3.5	4.9	3.4	3.8
% abuso concomitante di psicofarmaci	3.2	3.8	3.3	6.6	2.6	2.9	4.7	2.4	5.7	4.3	3.6	4.4
% Pronto soccorso	13.4	19.3	24.2	17.3	16.9	17.3	18.9	25.1	24.5	23.0	16.0	21.4
% Psichiatria	0.7	0.8	0.8	0.0	1.9	1.3	3.9	1.7	2.8	3.3	1.6	4.4
% SERT	3.9	4.2	7.8	4.8	5.2	6.8	4.4	7.5	9.4	6.9	5.4	8.8
di cui % anche Carcere	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 35 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	286	229	224	224	224	414	409	195	185	179	155	147
% nuovi contatti**	8.4	10.9	12.5	0.9	13.8	10.4	30.3	21.5	26.5	28.5	27.7	35.4
età media	53.2	51.5	50.0	49.6	49.8	50.5	48.6	48.6	47.7	48.9	48.1	47.0
% maschi	66.8	68.6	63.8	64.7	64.7	65.0	64.5	62.1	65.4	66.5	71.0	68.7
% femmine	33.2	31.4	36.2	35.3	35.3	35.0	35.5	37.9	34.6	33.5	29.0	31.3
% nativi	85.0	85.2	81.3	82.1	83.0	86.2	84.4	88.7	83.2	84.9	89.0	84.4
% non nativi	15.0	13.5	17.0	13.8	13.8	12.3	14.4	10.8	16.2	14.5	9.7	15.6
% residenti area metropolitana	94.1	92.6	94.6	92.0	90.6	94.4	93.6	93.8	93.5	91.1	91.0	90.5
% residenti fuori area metropolitana	5.6	4.8	3.6	3.6	5.4	3.9	5.4	5.6	5.9	8.4	6.5	8.2
% senza fissa dimora (SFD)	2.1	0.0	0.0	0.4	0.4	1.2	1.0	1.0	1.6	0.0	1.3	0.0
% decesso overdose	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% abuso concomitante di sostanze illegali	16.4	13.5	14.7	14.7	18.3	16.4	19.8	21.0	28.6	24.6	20.0	18.4
di cui % oppioidi	2.8	3.5	4.0	3.6	4.5	4.1	5.6	5.6	13.0	13.4	9.7	8.8
di cui % cocaina	7.3	5.7	5.8	6.7	6.3	7.0	6.8	6.7	5.9	5.6	7.7	8.2
di cui % cannabinoidi	3.8	3.9	2.7	4.9	5.4	3.4	4.4	5.1	3.8	2.8	1.9	2.7
di cui % altre sostanze illegali	2.8	1.7	4.0	3.6	4.9	4.6	7.3	5.6	10.3	7.3	3.9	8.8

% abuso concomitante di psicofarmaci	2.8	3.1	3.6	1.8	4.0	7.0	7.6	6.2	11.9	7.3	7.1	8.8
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

% Ospedale	8.4	8.7	16.1	11.2	16.5	14.5	14.2	14.4	24.3	17.9	18.1	26.5
% Pronto soccorso	15.0	17.0	20.5	13.4	20.1	17.9	19.3	25.6	26.5	22.9	16.8	24.5
% SERT	45.5	42.4	45.5	45.1	46.9	44.4	43.5	47.2	45.9	40.8	41.9	40.1
di cui % anche Carcere	0.3	0.9	1.3	1.3	1.3	0.7	0.7	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 36 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti in carico alla Psichiatria. Periodo 2009-2020**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	24	25	28	2	31	43	124	42	49	51	43	52
età media	49.4	46.1	44.9	29.5	47.5	49.5	46.7	46.7	45.7	47.6	48.8	44.3
% maschi	62.5	80.0	64.3	100.0	71.0	58.1	61.3	66.7	57.1	66.7	74.4	71.2
% femmine	37.5	20.0	35.7	0.0	29.0	41.9	38.7	33.3	42.9	33.3	25.6	28.8
% nativi	62.5	80.0	64.3	0.0	61.3	81.4	82.3	92.9	77.6	74.5	90.7	78.8
% non nativi	37.5	16.0	25.0	0.0	22.6	9.3	15.3	7.1	20.4	23.5	7.0	21.2
% residenti area metropolitana	87.5	88.0	85.7	0.0	71.0	86.0	86.3	92.9	93.9	80.4	88.4	86.5
% residenti fuori area metropolitana	12.5	4.0	3.6	0.0	9.7	4.7	11.3	7.1	4.1	17.6	7.0	11.5
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0											
% abuso concomitante di sostanze illegali	8.3	16.0	7.1	0.0	12.9	11.6	16.9	21.4	16.3	19.6	11.6	5.8
di cui % oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.8	2.0	5.9	4.7	0.0
di cui % cocaina	0.0	4.0	3.6	0.0	0.0	4.7	2.4	7.1	2.0	2.0	7.0	0.0
di cui % cannabinoidi	8.3	8.0	0.0	0.0	3.2	4.7	5.6	4.8	2.0	5.9	2.3	1.9
di cui % altre sostanze illegali	0.0	0.0	3.6	0.0	6.5	2.3	6.5	9.5	8.2	9.8	0.0	3.8
	0.0											
% abuso concomitante di psicofarmaci	4.2	8.0	0.0	0.0	3.2	0.0	8.1	4.8	6.1	5.9	2.3	5.8
	0.0											
% Ospedale	8.3	8.0	7.1	0.0	16.1	9.3	12.1	11.9	18.4	25.5	16.3	28.8
% Pronto soccorso	8.3	8.0	7.1	0.0	16.1	14.0	14.5	23.8	22.4	19.6	9.3	19.2
% SERT	33.3	36.0	17.9	0.0	19.4	11.6	23.4	33.3	30.6	19.6	27.9	23.1
di cui % anche Carcere	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 37 - Gioco problematico*. Caratteristiche casi incidenti inclusi nella coorte GAP. Periodo 2009-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale	64	104	89	92	103	128	123	97	52	25	20	22
età media	47.0	46.7	49.6	46.4	47.3	46.6	46.1	48.5	51.1	53.6	47.8	46.3
% maschi	78.1	80.8	78.7	82.6	81.6	85.9	79.7	76.3	73.1	56.0	90.0	86.4
% femmine	21.9	19.2	21.3	17.4	18.4	14.1	20.3	23.7	26.9	44.0	10.0	13.6
% nativi	78.1	85.6	91.0	85.9	86.4	82.8	83.7	86.6	88.5	84.0	90.0	90.9
% non nativi	21.9	14.4	9.0	14.1	13.6	17.2	16.3	13.4	11.5	16.0	10.0	9.1
% residenti area metropolitana	96.9	92.3	95.5	92.4	95.1	93.0	96.7	91.8	96.2	100.0	95.0	95.5
% residenti fuori area metropolitana	3.1	6.7	4.5	5.4	4.9	6.3	3.3	7.2	3.8	0.0	5.0	4.5
% primo contatto SERT	96.9	90.4	95.5	98.9	90.3	77.3	71.5	74.2	59.6	52.0	65.0	63.6
% primo contatto Ospedale	1.6	6.7	2.2	1.1	0.0	2.3	4.9	2.1	13.5	4.0	5.0	0.0
% primo contatto Psichiatria	1.6	2.9	2.2	0.0	9.7	20.3	23.6	23.7	26.9	44.0	30.0	36.4
% anche alcol	12.5	7.7	4.5	6.5	1.9	5.5	10.6	13.4	5.8	8.0	15.0	18.2
% anche sostanze illegali	7.8	3.8	6.7	5.4	6.8	8.6	7.3	12.4	7.7	12.0	20.0	13.6

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico

Tab. 38 - Gioco problematico*. Caratteristiche soggetti in carico al SERT. Periodo 2009-2020

		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero totale		218	233	186	200	183	171	145	84	55	36	38	32
 sesso	% femmine	20.6	20.6	19.4	18.5	19.7	18.7	59.0	26.2	20.0	19.4	10.5	18.8
nuovo/già in carico	% nuovi	26.6	38.6	49.5	45.0	40.4	50.3	55.9	66.7	54.5	41.7	21.1	46.9
età media	all'ingresso	50.9	47.0	49.9	46.3	49.5	45.1	48.5	49.2	45.7	46.1	46.9	47.5
nazionalità	% non nativi	10.1	6.9	8.6	10.0	8.7	11.1	11.7	11.9	7.3	8.3	7.9	6.3
residenza	% fuori area metropolitana	3.7	5.1	5.4	5.0	6.0	5.8	9.0	8.3	5.5	5.6	5.3	3.1
stato civile	% celibe/nubile	41.3	41.2	42.5	39.5	45.9	42.7	35.9	40.5	50.9	30.6	23.7	28.1
	% coniugato	35.3	31.8	30.6	33.5	33.9	32.7	35.2	38.1	34.5	55.6	60.5	53.1
	% separato/divorziato/vedovo	22.5	12.1	25.8	25.5	19.1	12.3	12.4	21.4	12.7	13.9	15.8	18.8
titolo di studio	% elementari	5.0	5.2	8.6	5.5	5.5	8.8	13.1	16.7	7.3	11.1	15.8	12.5
	% media inferiore	36.7	48.1	37.1	37.5	38.8	42.7	40.0	32.1	29.1	27.8	36.8	31.3
	% qualifica professionale	10.6	5.2	10.8	11.0	14.2	10.5	8.3	9.5	14.5	5.6	7.9	9.4
	% media superiore	29.4	26.6	30.6	32.5	27.9	28.7	28.3	34.5	29.1	36.1	31.6	34.4
	% livello universitario	5.0	7.7	7.0	8.0	5.0	5.3	6.2	6.0	3.6	11.1	7.9	6.3
	% sconosciuto	13.3	7.3	5.4	5.5	6.6	4.0	4.1	1.2	16.4	8.3	0.0	6.3
condizione lavorativa	% disoccupato/in cerca di occupazione	12.8	13.7	21.1	16.0	16.4	16.4	11.7	13.1	12.0	11.1	13.2	12.5
	% lavori precari/occupato regolarmente	64.2	61.8	60.2	63.0	59.0	56.7	55.9	60.7	54.5	66.7	63.2	56.3
	% pensione	20.2	22.3	21.5	15.0	18.8	12.3	24.1	22.6	20.0	13.9	23.7	25.0
	% studente	0.0	0.9	1.6	2.0	1.6	1.8	0.7	1.2	3.6	2.8	0.0	0.0
presa in carico	durata media in mesi	7.5	16.5	16.1	24.0	14.5	13.2	9.5	9.4	21.0	20.0	35.0	39.4
esito programma	% completato	10.6	7.3	2.7	9.0	5.5	3.5	3.4	0.0	1.8	19.4	28.9	28.1
	% dimissione concordata	3.2	1.3	3.2	4.5	7.1	4.7	6.9	3.6	3.6	5.6	7.9	12.5
	% passaggio altra struttura	2.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	8.3	7.9	3.1
	% abbandono	9.6	9.4	4.8	8.5	7.7	5.8	5.5	1.2	3.6	8.3	7.9	6.3
	% chiusura d'ufficio	14.7	15.5	18.8	12.0	18.6	22.8	20.7	31.0	9.1	19.4	26.3	25.0
	% decesso	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
	% in corso	59.2	66.1	69.4	65.5	61.2	62.0	62.1	64.3	80.0	36.1	18.4	21.9
altre dipendenze	% altre dipendenze	2.3	1.7	3.3	5.0	6.6	3.0	7.0	10.7	25.5	30.6	26.3	25.0
	di cui % alcol	1.4	1.3	2.2	3.5	3.8	1.8	2.8	4.8	14.5	25.0	18.4	18.8
	di cui % cocaina	0.5	0.4	1.1	1.0	1.1	0.6	1.4	1.2	7.3	5.6	2.6	0.0
	di cui % eroina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.6	3.1
	di cui % tabacco	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.4	1.8	0.0	2.6	3.1
	di cui % altro	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	0	0.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	% ex utente Sert Tossicodipendente	2.3	1.3	2.7	4.0	3.8	2.9	3.4	3.6	-	-	-	-
	% ex utente Sert Alcolista	0.9	1.3	1.6	2.5	2.2	2.3	2.8	2.4	-	-	-	-

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico

Tab. 40 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2020

Totale												
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	0.95	1.14	1.08	1.04	1.02	1.15	1.62	1.39	1.42	1.44	1.30	1.09
illegali	0.62	0.88	0.73	0.71	0.73	0.72	0.90	0.97	0.77	0.88	0.88	0.78
oppioidi	0.16	0.18	0.13	0.20	0.20	0.21	0.31	0.17	0.25	0.35	0.31	0.32
cocaina	0.27	0.38	0.31	0.31	0.22	0.24	0.23	0.23	0.20	0.25	0.22	0.19
gioco	0.10	0.14	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.06	0.03	0.02	0.02
Maschi												
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	1.34	1.65	1.59	1.47	1.39	1.70	2.27	1.97	2.05	2.17	1.91	1.62
illegali	1.00	1.34	1.14	1.12	1.07	1.14	1.27	1.36	1.17	1.31	1.27	1.15
oppioidi	0.23	0.27	0.19	0.29	0.26	0.32	0.41	0.24	0.37	0.53	0.49	0.48
cocaina	0.44	0.62	0.53	0.52	0.37	0.39	0.39	0.41	0.36	0.41	0.39	0.31
gioco	0.16	0.24	0.16	0.19	0.21	0.25	0.24	0.17	0.10	0.04	0.04	0.04
Femmine												
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	0.56	0.65	0.59	0.62	0.65	0.62	0.99	0.81	0.80	0.72	0.69	0.55
illegali	0.25	0.44	0.33	0.30	0.40	0.30	0.52	0.58	0.38	0.45	0.49	0.41
oppioidi	0.10	0.10	0.07	0.11	0.14	0.11	0.22	0.09	0.14	0.17	0.13	0.16
cocaina	0.10	0.14	0.10	0.11	0.07	0.09	0.08	0.06	0.05	0.08	0.05	0.07
gioco	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00
Nativi												
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	0.78	0.97	0.89	0.86	0.83	1.01	1.35	1.15	1.12	1.19	1.07	0.90
illegali	0.59	0.78	0.66	0.68	0.66	0.67	0.84	0.92	0.71	0.84	0.83	0.74
oppioidi	0.15	0.15	0.11	0.18	0.18	0.20	0.30	0.16	0.25	0.34	0.29	0.31
cocaina	0.24	0.34	0.29	0.31	0.20	0.23	0.24	0.22	0.18	0.25	0.21	0.18
gioco	0.09	0.14	0.11	0.11	0.13	0.14	0.13	0.10	0.07	0.03	0.03	0.02
Non Nativi												
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol	1.87	2.15	2.18	2.05	2.09	2.00	3.19	2.73	3.25	3.08	2.93	2.55
illegali	0.83	1.47	1.14	0.89	1.13	0.98	1.22	1.28	1.15	1.16	1.26	1.10
oppioidi	0.23	0.35	0.22	0.31	0.27	0.29	0.39	0.23	0.28	0.44	0.42	0.39
cocaina	0.40	0.60	0.45	0.32	0.34	0.30	0.20	0.29	0.35	0.27	0.28	0.22
gioco	0.15	0.13	0.08	0.12	0.11	0.18	0.23	0.13	0.01	0.05	0.01	0.02

Tab. 41 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2020.

	Alcol			Illegali			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto di Casalecchio	4.71	1.78	3.24	5.25	1.43	3.33	0.73	0.11	0.42
CASALECCHIO DI RENO	3.64	1.49	2.54	4.43	1.41	2.88	0.69	0.17	0.42
MONTE SAN PIETRO	4.44	1.92	3.17	4.44	0.82	2.62	0.55	0.00	0.28
SASSO MARCONI	3.35	1.90	2.63	5.44	1.06	3.26	0.42	0.21	0.32
VALSAMOGGIA	5.94	2.04	4.02	5.47	1.75	3.64	0.85	0.10	0.48
ZOLA PREDOSA	5.77	1.74	3.75	6.74	1.58	4.14	0.96	0.00	0.48
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto Pianura Ovest	5.05	1.85	3.46	6.30	1.41	3.88	0.71	0.22	0.47
ANZOLA DELL'EMILIA	4.35	1.50	2.95	7.50	0.75	4.17	0.73	0.25	0.49
CALDERARA DI RENO	4.24	2.00	3.12	7.14	0.89	4.01	0.45	0.00	0.22
CREVALCORE	6.05	1.32	3.71	6.91	0.66	3.82	1.73	0.66	1.20
SALA BOLOGNESE	4.50	2.11	3.31	3.46	0.35	1.92	0.69	0.00	0.35
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	5.15	2.26	3.71	5.69	2.37	4.03	0.43	0.22	0.32
SANT'AGATA BOLOGNESE	6.04	1.21	3.71	7.18	2.43	4.88	0.38	0.00	0.20
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto Pianura Est	4.32	1.74	3.03	6.14	1.42	3.78	0.59	0.09	0.34
ARGELATO	6.74	2.48	4.63	7.36	1.55	4.47	0.92	0.00	0.46
BARICELLA	4.46	2.56	3.54	8.10	2.56	5.41	0.41	0.00	0.21
BENTIVOGLIO	4.70	2.60	3.65	5.74	2.08	3.91	0.52	0.00	0.26
BUDRIO	3.62	1.47	2.55	4.61	1.31	2.96	0.82	0.00	0.41
CASTELLO D'ARGILE	3.82	2.21	3.03	7.22	0.44	3.90	0.85	0.00	0.43
CASTEL MAGGIORE	3.01	3.04	3.02	4.35	0.96	2.61	0.33	0.00	0.16
CASTENASO	3.05	1.17	2.09	5.08	0.78	2.89	0.61	0.00	0.30
GALLIERA	5.74	1.09	3.46	6.79	0.54	3.73	0.52	0.00	0.27
GRANAROLO EMILIA	4.30	0.94	2.60	7.64	0.94	4.26	0.00	0.23	0.12
MALALBERGO	4.96	2.26	3.60	4.63	1.62	3.11	0.00	0.65	0.33
MINERBIO	4.98	0.67	2.84	5.31	2.68	4.00	1.00	0.00	0.50
MOLINELLA	3.45	1.56	2.51	7.67	1.75	4.73	0.96	0.19	0.58
PIEVE DI CENTO	4.81	2.20	3.51	7.88	2.20	5.05	0.00	0.44	0.22
SAN GIORGIO DI PIANO	4.40	0.00	2.16	4.74	2.29	3.49	0.34	0.00	0.17
SAN PIETRO IN CASALE	6.02	1.90	3.98	7.64	0.95	4.34	1.16	0.00	0.59
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto di S. Lazzaro	4.13	1.53	2.82	6.44	1.49	3.95	0.44	0.08	0.26
LOIANO	6.21	1.44	3.87	11.72	2.88	7.39	0.69	0.00	0.35
MONGHIDORO	13.58	0.91	7.64	9.58	0.91	5.52	0.00	0.91	0.42
MONTERENZIO	0.91	2.91	1.88	5.00	1.94	3.52	0.45	0.00	0.23
OZZANO DELL'EMILIA	3.48	1.52	2.50	5.22	0.65	2.93	0.65	0.00	0.33
PIANORO	3.04	1.58	2.31	6.26	2.64	4.44	0.36	0.00	0.18
SAN LAZZARO DI SAVENA	4.27	1.31	2.75	6.25	1.03	3.57	0.40	0.09	0.24
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto di Porretta	5.21	2.16	3.71	5.26	1.82	3.57	0.82	0.23	0.53
ALTO RENO TERME	4.60	1.36	2.97	1.84	0.91	1.37	0.92	0.00	0.46
CAMUGNANO	3.52	1.82	2.69	5.28	5.47	5.38	1.76	0.00	0.90
CASTEL D'AIANO	6.73	1.80	4.35	5.05	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
CASTEL DI CASIO	4.43	0.00	2.28	2.66	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	2.30	2.40	2.35	6.32	2.40	4.40	1.15	0.00	0.59
GAGGIO MONTANO	7.29	1.27	4.34	4.25	1.90	3.10	0.61	0.63	0.62
GRIZZANA MORANDI	6.84	3.27	5.12	6.84	3.27	5.12	0.76	0.00	0.39
LIZZANO IN BELVEDERE	5.86	1.53	3.74	5.86	0.00	2.99	1.46	0.00	0.75
MARZABOTTO	3.50	1.75	2.63	9.64	3.06	6.35	0.44	0.88	0.66
MONZUNO	3.18	2.42	2.81	3.18	2.42	2.81	1.36	0.00	0.70
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	8.37	2.31	5.50	6.98	1.54	4.40	0.70	0.77	0.73
VERGATO	7.25	4.08	5.68	5.24	0.82	3.04	0.81	0.00	0.41
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto Bologna città	4.38	1.69	3.01	8.41	2.27	5.29	0.46	0.11	0.28
BOLOGNA	4.38	1.69	3.01	8.41	2.27	5.29	0.46	0.11	0.28
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Area metropolitana	4.51	1.74	3.11	7.01	1.83	4.40	0.56	0.12	0.34

Tab. 42 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2020.

	Alcol			Illegali			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Distretto di Casalecchio	1.47	0.67	1.07	0.95	0.13	0.54	0.27	0.00	0.14
CASALECCHIO DI RENO	1.21	0.50	0.85	0.61	0.17	0.38	0.26	0.00	0.13
MONTE SAN PIETRO	1.94	0.55	1.24	1.94	0.00	0.96	0.28	0.00	0.14
SASSO MARCONI	1.26	0.42	0.84	1.05	0.00	0.53	0.42	0.00	0.21
VALSAMOGGIA	1.79	1.17	1.48	0.94	0.29	0.62	0.28	0.00	0.14
ZOLA PREDOSA	1.28	0.48	0.88	0.96	0.00	0.48	0.16	0.00	0.08
Distretto Pianura Ovest	1.53	0.83	1.18	1.21	0.18	0.70	0.11	0.11	0.11
ANZOLA DELL'EMILIA	0.97	1.00	0.98	1.21	0.00	0.61	0.00	0.25	0.12
CALDERARA DI RENO	1.56	1.33	1.45	1.78	0.22	1.00	0.22	0.00	0.11
CREVALCORE	2.81	0.66	1.75	1.30	0.00	0.65	0.22	0.22	0.22
SALA BOLOGNESE	0.69	1.06	0.87	0.00	0.35	0.17	0.00	0.00	0.00
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	1.29	0.75	1.02	0.97	0.22	0.59	0.00	0.11	0.05
SANT'AGATA BOLOGNESE	1.89	0.00	0.98	2.27	0.40	1.37	0.38	0.00	0.20
Distretto Pianura Est	1.06	0.55	0.81	0.63	0.20	0.42	0.15	0.06	0.10
ARGELATO	1.84	1.86	1.85	0.61	0.31	0.46	0.31	0.00	0.15
BARICELLA	0.81	0.85	0.83	0.41	1.28	0.83	0.00	0.00	0.00
BENTIVOGLIO	1.57	0.52	1.04	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.26
BUDRIO	1.15	0.49	0.82	0.49	0.16	0.33	0.00	0.00	0.00
CASTELLO D'ARGILE	1.27	0.88	1.08	0.42	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
CASTEL MAGGIORE	0.67	0.80	0.74	1.17	0.00	0.57	0.17	0.00	0.08
CASTENASO	0.61	0.20	0.40	0.41	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
GALLIERA	0.52	0.54	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRANAROLO EMILIA	1.19	0.23	0.71	0.72	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
MALALBERGO	1.98	0.65	1.31	0.00	0.32	0.16	0.00	0.32	0.16
MINERBIO	1.00	0.34	0.67	0.33	0.00	0.17	0.33	0.00	0.17
MOLINELLA	0.77	0.39	0.58	1.15	0.19	0.68	0.58	0.19	0.39
PIEVE DI CENTO	0.44	0.00	0.22	1.75	0.00	0.88	0.00	0.44	0.22
SAN GIORGIO DI PIANO	0.34	0.00	0.17	0.00	0.98	0.50	0.00	0.00	0.00
SAN PIETRO IN CASALE	1.85	0.71	1.29	0.93	0.24	0.59	0.23	0.00	0.12
Distretto di S. Lazzaro	1.79	0.35	1.07	0.83	0.27	0.55	0.08	0.00	0.04
LOIANO	2.07	0.00	1.06	1.38	0.72	1.06	0.00	0.00	0.00
MONGHIDORO	7.19	0.00	3.82	1.60	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
MONTERENZIO	0.91	0.97	0.94	0.00	0.48	0.23	0.00	0.00	0.00
OZZANO DELL'EMILIA	1.31	0.43	0.87	0.44	0.22	0.33	0.00	0.00	0.00
PIANORO	1.43	0.18	0.80	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.09
SAN LAZZARO DI SAVENA	1.69	0.37	1.01	1.39	0.28	0.82	0.10	0.00	0.05
Distretto di Porretta	1.75	0.80	1.28	0.82	0.23	0.53	0.16	0.11	0.14
ALTO RENO TERME	0.46	0.00	0.23	0.92	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
CAMUGNANO	1.76	1.82	1.79	1.76	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
CASTEL D'AIANO	1.68	1.80	1.74	1.68	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
CASTEL DI CASIO	1.77	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	1.15	0.60	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GAGGIO MONTANO	2.43	0.63	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.31
GRIZZANA MORANDI	0.00	0.82	0.39	0.00	0.82	0.39	0.00	0.00	0.00
LIZZANO IN BELVEDERE	2.93	1.53	2.24	2.93	0.00	1.49	1.46	0.00	0.75
MARZABOTTO	0.44	0.44	0.44	1.31	0.44	0.88	0.44	0.00	0.22
MONZUNO	1.82	0.97	1.41	0.00	0.97	0.47	0.00	0.00	0.00
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	3.49	0.77	2.20	1.40	0.00	0.73	0.00	0.77	0.37
VERGATO	3.62	1.63	2.64	1.61	0.00	0.81	0.40	0.00	0.20
Distretto Bologna città	1.23	0.49	0.85	1.17	0.32	0.74	0.15	0.04	0.09
BOLOGNA	1.23	0.49	0.85	1.17	0.32	0.74	0.15	0.04	0.09
Area metropolitana	1.34	0.56	0.95	1.00	0.25	0.62	0.16	0.04	0.10

Tab. 43 - Stima del sommerso. Periodo 2009-2020

	2020		2019		2018		2017		2016		2015	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
alcol	6505	5054-7956	5208	4270-6147	3913	3338-4488	3732	3171-4294	4034	3404-4665	3804	3257-4351
illegali	7060	5744-8376	9379	7528-11231	5261	4587-5935	5418	4669-6167	6270	5287-7253	8335	6700-9969
di cui oppioidi	3411	2735-4088	3813	2966-4660	2326	2100-2553	2394	2160-2627	2990	2580-3400	3492	2854-4130
di cui cocaina	2014	1649-2379	1927	1563-2291	1338	1169-1507	1516	1289-1743	1269	1041-1498	1321	1040-1602
Sconosciuti/Conosciuti	2020		2019		2018		2017		2016		2015	
alcol	6.17		4.71		3.59		3.64		4.05		3.58	
illegali	3.04		3.87		2.27		2.32		2.62		3.46	
di cui oppioidi	1.93		2.10		1.29		1.28		1.55		1.75	
di cui cocaina	1.98		2.00		1.51		1.80		1.79		1.89	

	2014		2013		2012		2011		2010		2009	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
alcol	4461	3810-5111	3884	3343-4424	3848	3280-4416	4135	3476-4795	4728	3989-5467	3784	3244-4324
illegali	8533	6919-10147	6070	5055-7084	5387	4613-6161	6793	5663-7922	8376	6872-9880	6157	5156-7158
di cui oppioidi	3987	3312-4661	3232	2764-3700	3161	2802-3520	3141	2774-3508	2933	2592-3275	2530	2326-2734
di cui cocaina	1354	1014-1693	911	741-1081	1052	885-1219	1175	934-1416	967	755-1178	934	806-1061

Sconosciuti/Conosciuti	2014		2013		2012		2011		2010		2009	
alcol	4.18		3.63		3.90		4.16		4.32		3.52	
illegali	3.58		2.56		2.25		2.73		3.25		2.40	
di cui oppioidi	1.97		1.61		1.47		1.40		1.33		1.13	
di cui cocaina	2.14		1.61		1.44		1.75		1.61		1.19	

Tab. 44 - Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2009-2020

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KG HEROINA	22.5	52.7	25.3	9.2	30.6	2.4	11.9	3.9	31.5	3.5	27.4	6.3
KG COCAINA	39.9	38.4	33.5	28.4	35.0	22.0	10.7	54.4	46.3	12.8	40.0	10.1
KG HASCISH	506.8	66.7	140.7	157.7	38.2	41.8	63.1	69.5	546.3	94.2	90.5	30.2
KG MARIJUANA	41.0	4.44	89.7	170.7	68.0	75.2	69.2	46.8	641.2	163.4	128.2	666.0
operazioni	544	483	616	574	652	489	328	448	411	274	448	368
denunce	825	696	888	709	616	606	398	572	574	477	480	433
arresti	708	573	790	621	542	493	308	471	488	384	325	278
minori denunciati	23	14	17	11	12	9	15	16	13	15	16	4
non nativi denunciati	451	385	569	461	410	375	286	466	447	329	296	206

Fonte Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza

Tab. 45 - Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2012-2020

decessi per overdose area metropolitana di Bologna										accessi al PS per overdose area metropolitana di Bologna									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	16	23	13	17	17	11	20	23	10	113	112	98	86	85	69	50	67	47	
Età media	36.9	40.0	39.0	40.6	40.7	42.4	45.3	40.3	45.5	36.3	37.9	38	38.2	37.9	36.4	40.2	38.2	39.6	
% Femmine	6.3	8.7	7.7	0.0	17.6	36.4	30.0	26.1	0.0	24.8	10.7	11.2	11.6	23.5	21.7	18.0	10.4	14.9	
% Non nativi	31.3	21.7	7.7	17.6	5.9	9.1	5.0	8.7	30.0	12.4	24.1	19.4	22.4	31.8	21.7	28.0	38.8	36.2	
% Non residenti	31.3	43.5	38.5	35.3	29.4	27.3	35.0	39.1	20.0	47.8	55.4	45.9	51.8	47.1	44.9	36.0	46.3	44.7	
% sconosciuti al Sert	43.8	21.7	30.8	29.4	47.1	45.5	45.0	43.5	30.0	87.6	73.2	46.9	52.9	49.4	50.7	36.0	61.2	46.8	

Tab. 46 – Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta*: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2020.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	1680	2188	1971	1729	1919	1602	2538	2000	1983	1992	1398	1468

% <18 anni	3.6	3.4	3.5	4.4	2.7	4.0	2.8	2.7	2.5	2.3	3.6	2.3
% 18-29 anni	18.3	22.8	23.5	23.5	22.3	24.8	20.9	27.5	23.2	11.8	31.3	28.5
% 30-39 anni	18.9	17.8	15.9	19.2	17.1	16.7	23.1	21.2	23.1	14.2	22.2	21.7
% 40-49 anni	25.5	24.0	22.7	22.2	22.7	22.2	22.4	22.4	22.5	16.2	23.4	21.2
% 50-59 anni	20.2	18.3	16.8	17.4	17.1	15.7	13.6	12.6	12.8	9.5	11.1	14.8
% =>60 anni	11.9	12.3	15.8	11.2	16.9	14.8	13.5	10.1	11.6	6.1	7.1	8.6
% Non noto	1.7	1.4	1.9	2.2	1.3	1.7	3.7	3.7	4.2	40.0	1.4	2.9

Età media	43.2	42.0	41.7	41.0	43.3	41.8	41.8	39.4	40.8	40.7	37.4	39.1
% Femmine	23.8	26.8	27.9	28.7	29.7	28.3	28.1	26.1	25.0	23.1	27.0	26.4
% Non nativi	45.2	40.1	41.1	44.9	37.9	35.8	42.5	39.6	40.4	34.8	43.5	35.4
% Non residenti in area metropolitana	38.1	37.2	35.9	42.7	32.9	32.2	37.8	39.1	38.3	42.0	43.1	38.6

% Arrivo al ps di notte (dalle 20 alle 8)	62.4	64.9	59.8	66.8	62.7	67.0	37.4	63.3	38.7	59.9	29.7	67.2
% Arrivo nel week end	43.0	46.9	45.7	48.8	50.2	50.9	29.1	47.4	30.4	47.0	23.6	50.5
% Forze dell'ordine	0.7	0.9	0.8	0.8	0.3	0.9	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	1.0
% Codice triage rosso	4.8	5.0	4.4	3.1	3.4	3.0	2.6	2.1	1.8	1.2	2.1	2.2
% Almeno un'altra sostanza psicoattiva illegale	12.7	11.0	10.1	10.0	12.4	7.2	6.8	10.5	9.6	7.5	7.8	5.6

* Keywords: *"*abuso*" & "*alcol*"; "*abuso*" & "*alcool*"; "*abuso*" & "*etil*"; "*abuso*" & "*etanolic*"; "*intossicazione*" & "*alcol*"; "*intossicazione*" & "*alcool*"; "*intossicazione*" & "*etil*"; "*esotossicosi etil*"; "*esotossicosi alc*"*

Per la metodologia utilizzata cfr. Pavarin RM et al., Cocaine-related medical and related problems: a consecutive series of 743 patients from a multicentre study in Italy, in *European Journal of Emergency Medicine*, 2011 Aug;18(4):208-14

Metodologia utilizzata: note

Definizione di caso – Come “consumatori problematici” (CP) sono stati considerati i soggetti che si sono rivolti ad un servizio pubblico o privato per problemi dovuti all’uso/abuso di sostanze psicoattive. Come giocatori problematici sono stati considerati gli utenti dei SERD con diagnosi di gioco problematico (GP).

I soggetti inclusi nel presente studio sono stati selezionati dai sistemi informativi di SERD e Carcere (cartella socio-sanitaria informatizzata SISTER), Centri Territoriali di Salute Mentale (cartella informatizzata SIT), Pronto Soccorso dell’AUSL di Bologna¹ (sistema informativo AREAS), Ospedali e case di cura private convenzionate (Scheda di Dimissione Ospedaliera - SDO), Registro Mortalità dell’AUSL di Bologna (Scheda ISTAT- codici ICD 10 F11, F14, F19, X42). Il periodo di riferimento è compreso tra il 2009 ed il 2019, il territorio è l’area metropolitana di Bologna.

Materiali e metodi - Un soggetto nello stesso periodo di riferimento può essere stato in contatto con più servizi ed essere presente in più archivi. Per ogni soggetto le informazioni sono state riunite in unico record ed aggiornate anno per anno. L’archivio finale distingue i “nuovi” contatti (soggetti presenti per la prima volta nell’anno considerato, e mai contattati negli anni precedenti). Per indicare la nazionalità si è tenuto conto del paese di nascita e si sono costruite due categorie “nativi” (nati in Italia) e “non nativi” (nati all’estero). Relativamente alle tabelle 15 e 29 (accessi ai reparti di Pronto Soccorso) i casi incidenti sono stati marchiati in modo univoco con una chiave anonima.

Analisi - Per la stima del sommerso è stato utilizzato il metodo “cattura/ricattura” a due fonti (A*B/C) e sono stati calcolati i relativi intervalli di confidenza al 95%: A) i soggetti che hanno usufruito di servizi SERT (esclusi quelli che sono stati seguiti solo dal Carcere); B) i soggetti dimessi da Ospedali e case di cura private convenzionate²; C) i soggetti comuni tra le due fonti.

Per tutte le stime sono stati utilizzati i soggetti di età compresa tra 15 e 64 anni; per le sostanze illegali i soggetti con abuso di oppioidi, cocaina e cannabis.

Incidenza e prevalenza sono state calcolate per i soli soggetti residenti di età compresa tra 15-64 anni distintamente per sesso e nazionalità (utenti residenti/popolazione residente*1000). La popolazione residente (nativi e non nativi) è stata ricavata dal sito web della Regione Emilia-Romagna³.

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando i software SPSS 18.0 e STATA 15.0.

¹Pavarin, R.M. (2014), *Access to the health services for problematic use of illegal psychoactive substances among natives and non-natives: a study in the metropolitan area of Bologna*, Ann Ist Super Sanità, 50(1): 40-46. Pavarin RM, (2015) Mortality risk among heroin abusers: clients and non-clients of public treatment centers for drug addiction – Substance use and Misuse vol 50 pg 1690-1696

²Pavarin, R.M. (2007), *Consumo, consumo problematico e dipendenza*, Franco Angeli, Milano: 37;56. Pavarin, R.M. (1998), *Stima della prevalenza di tossicodipendenti nella città di Bologna nel 1997 e analisi del sommerso*, Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo, 3:7-11

³<https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service>

Pubblicazioni recenti

[Pavarin, R.M. \(2021\). Io non sono uno spacciatore. Sono un consumatore, aiuto gli amici. Una ricerca qualitativa con interviste a venditori di cannabis non professionisti. Prospettive sociali e sanitarie, 3: 42-45.](#)

[Santo, T., Jr, Clark, B., Hickman, M., Grebely, J., Campbell, G., Sordo, L., Chen, A., Tran, L. T., Bharat, C., Padmanathan, P., Cousins, G., Dupouy, J., Kelty, E., Muga, R., Nosyk, B., Min, J., Pavarin, R., Farrell, M., & Degenhardt, L. \(2021\). Association of Opioid Agonist Treatment With All-Cause Mortality and Specific Causes of Death Among People With Opioid Dependence: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA psychiatry, e210976. Advance online publication.](#)

[Pavarin, R. M., Bettelli, S., Nostrani, E., Mazzotta, C., Salsano, V., Ulgheri, A. L., ... & Bregli, C. \(2021\). Substance consumption styles during the COVID-19 lockdown for socially integrated people who use drugs. Journal of Substance Use, 1-6.](#)

[Pavarin, R. M., Sanchini, S., Tadonio, L., Domenicali, M., Caputo, F., & Pacetti, M. \(2021\). Suicide mortality risk in a cohort of individuals treated for alcohol, heroin or cocaine abuse: Results of a follow-up study. Psychiatry research, 296, 113639.](#)

[Pavarin, R. M., Sanchini, S., Marani, S., Turino, E., Tadonio, L., & Cantarelli, B. \(2020\). Mortality risk among heroin users accessing treatment: natives and non-natives patients results of a longitudinal study. Journal of psychoactive drugs, 52\(2\), 176-185.](#)

[Pavarin, R. M., Rego, X., Nostrani, E., De Caro, E., Biolcati, R., Canêdo, J., & Sanchini, S. \(2020\). Differences between subjects with socially integrated drug use: a study in Italy and Portugal. Journal of Substance Use, 25\(4\), 449-455.](#)

[Pavarin, R. M., Sanchini, S., Marani, S., Turino, E., Tadonio, L., & Caputo, F. \(2020\). Mortality risk among individuals treated for alcohol use disorders: results of a longitudinal study from 1978 to 2016 in Northern Italy. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci, 24, 1995-2005.](#)

Citazioni

[Pavarin, R. M., Sanchini, S., Marani, S., Turino, E., Tadonio, L., & Cantarelli, B. \(2020\). Mortality Risk among Cocaine Users before and after the Economic Recession: Results of a Longitudinal Study. European addiction research, 26\(1\), 10–19. In UNODC \(2021\). Covid-19 and drugs: impact outlook. World drug Report, 5. Vienna: United Nations publication](#)

[Pavarin, R. M., & Fioritti, A. \(2018\). Mortality Trends among Cocaine Users Treated between 1989 and 2013 in Northern Italy: Results of a Longitudinal Study. Journal of psychoactive drugs, 50\(1\), 72–80. In UNODC \(2021\). Drug market trends: cocaine amphetamine –type stimulants. World drug Report, 4. Vienna: United Nations publication](#)