

50



CONGRESSO NAZIONALE



Sinergie multisetoriali per la salute

TORINO

22-25 Novembre 2017

Centro Congressi Lingotto



ABSTRACT BOOK

C18: Argomenti vari

Abstract 405

ANALISI DELLE DIFFICOLTÀ DI REINSERIMENTO LAVORATIVO NELLE DONNE TRATTATE PER TUMORE DELLA MAMMELLA

Collina N.^[1], Musti M.A.^[1], Stivanello E.^[1], Morelli C.^[1], Bonfiglioli R.^[2], Giordani S.^[3], Pizzi L.^[1], De Lisio S.^[1], Giansante C.^[1], Pandolfi P.^[1]

^[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL di Bologna ~ Bologna ~ Italy, ^[2]Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Bologna ~ Bologna ~ Italy, ^[3]Dipartimento Cure Primarie, AUSL di Bologna ~ Bologna ~ Italy

Parole Chiave: Breast cancer, Return to work, Work disability

INTRODUZIONE:

Il tumore della mammella è il tumore più frequente tra le donne. La diagnosi precoce e il miglioramento delle procedure terapeutiche hanno aumentato la sopravvivenza e di conseguenza il numero di casi prevalenti, e quindi di donne che devono affrontare il problema del ritorno al lavoro dopo il trattamento. Obiettivo del presente studio è valutare la frequenza del non rientro al lavoro e individuare i fattori predittivi di ridotta capacità lavorativa tra le donne trattate per tumore della mammella.

MATERIALI E METODI:

Sono state incluse nello studio le donne di età compresa tra 18 e 65 anni residenti e operate per tumore della mammella nel triennio 2010-12 nel territorio della AUSL di Bologna. Attraverso un questionario sono state raccolte informazioni sulle caratteristiche personali, la storia clinica, il trattamento del tumore, i fattori correlati al lavoro e alla ripresa dell'attività lavorativa. È stata condotta un'analisi di regressione logistica multivariata per identificare i fattori predittivi di ridotta capacità lavorativa.

RISULTATI:

Il questionario è stato inviato a 1.578 donne. Il tasso di risposta è stato del 53,3%. Le donne che non sono rientrate al lavoro rappresentano il 6,9% delle rispondenti. Tra le donne precedentemente occupate e tornate al lavoro (503) il 43,5% ha riferito una riduzione della capacità lavorativa rispetto al periodo pre-diagnosi. La riduzione della capacità lavorativa è stata più frequente nelle donne sole (OR = 1,81, 95% CI 1,10-2,98) rispetto alle conviventi /coniugate e nelle donne trattate con mastectomia (OR = 2,77, 95% CI 1,26-6,11) rispetto a quelle con intervento conservativo. Impiegate e dirigenti hanno riferito una minore riduzione della capacità lavorativa (OR = 0.51, 95% CI 0.30-0.88 e OR = 0.21, 95% CI 0.06-0.76) rispetto alle operaie.

CONCLUSIONI:

La riduzione della capacità lavorativa è frequente nelle donne che ritornano al lavoro dopo il trattamento per il tumore della mammella. Questi risultati suggeriscono di promuovere azioni per facilitare il reinserimento lavorativo migliorando l'informazione durante il percorso diagnostico-terapeutico, coinvolgendo i Medici competenti, garantendo la disponibilità di percorsi riabilitativi e di interventi di promozione della salute mirati a migliorare gli stili di vita.